

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 agosto 2011

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 luglio 2011

**Approvazione delle domande con le relative
risposte per i concorsi per il conferimento delle sedi
farmaceutiche.**






S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 luglio 2011.

Approvazione delle domande con le relative risposte per i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche. (11A10883) Pag. 1





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 luglio 2011.

Approvazione delle domande con le relative risposte per i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, art. 1, commi 2 e 3, recante l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009, di nomina a Ministro della salute del prof. Ferruccio Fazio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 16 dicembre 2009;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico» e, in particolare, l'art. 4 che prevede che «il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico» e successive modificazioni, che disciplina le procedure concorsuali per il conferimento di sedi farmaceutiche;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina la prova attitudinale e demanda al Ministero della salute la predisposizione, ogni due anni, delle domande con le relative risposte formulate da una Commissione nominata dal Ministro;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997 con il quale è stato approvato il testo delle tremila domande con le relative risposte predisposte dalla Commissione;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1998 pubblicato sulla *G.U.* 4ª Serie speciale n. 24 del 27 marzo 1998 con il quale sono state approvate correzioni al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2010 con il quale è stata istituita la Commissione prevista dalla norma regolamentare al fine di predisporre un nuovo elenco delle domande e delle relative risposte da utilizzare per le prove attitudinali nei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2010 di proroga del termine dei lavori della sopracitata Commissione

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2011, n. 81 recante «Regolamento recante modificazioni al D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.»;

Ritenuto di approvare la proposta formulata dalla Commissione al termine dei lavori;

Decreta

Art. 1.

Ai fini della prova attitudinale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive modificazioni, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico» e successive modificazioni, sono approvate le tremila domande con le relative risposte, predisposte dalla Commissione di cui in premessa, riportate nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto si applica ai concorsi banditi successivamente alla sua entrata in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro della salute: FAZIO




N°	1	Domanda	Per quale delle patologie sotto elencate l'utilizzazione del cioramfenicolo può rappresentare una terapia valida?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>dissenteria acuta</div><div>infezioni da streptococco</div><div>tifo e paratifo</div><div>infezioni da candida albicans</div><div>infezioni da herpes</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2	Domanda	Il topotecan è un farmaco	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>ansililico</div><div>antispasico</div><div>antineoplastico</div><div>antipertensivo</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	3	Domanda	La gomma guar, ottenuta dai semi di <i>Cyamopsis tetragonolobus</i> L., è presente in preparazioni utilizzate per la riduzione del peso corporeo. Con quale dei seguenti meccanismi essa agisce?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>inibizione della sintesi degli acidi grassi</div><div>aumento dell'utilizzazione dei carboidrati</div><div>induzione del senso di sazietà</div><div>stimolazione della lipolisi</div><div>più di uno dei meccanismi indicati</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	4	Domanda	In una crema cosmetica per le mani è ammesso l'impiego di idrochinone?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>no, perché la sostanza è proibita per tale uso (allegato III, Legge 713/86).</div><div>sì, se il contenuto è inferiore allo 0,2%</div><div>sì, se non produce effetti sistemici.</div><div>sì, sempre</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta	A




N°	9	Domanda Le elevate quantità di Na ⁺ , frequentemente presenti in formulati utilizzati come antiacido, sono potenzialmente pericolose per pazienti	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>con insufficienza renale</div> <div>con insufficienza epatica</div> <div>con scompenso cardiaco</div> <div>con sanguinamento del tratto gastroenterico</div> <div>affetti da una qualunque delle patologie indicate</div>	Risposta esatta	E
N°	11	Domanda La biotrasformazione dei farmaci ne accelera l'escrezione per via renale perché i metaboliti sono:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>legati alle proteine</div> <div>meno idrosolubili</div> <div>piu' liposolubili</div> <div>meno ossidati</div> <div>piu' idrosolubili</div>	Risposta esatta	E
N°	10	Domanda I polimeri acilici aventi gruppi amminici impiegati nelle formulazioni di forme per il rilascio controllato del farmaco, in generale, sono solubili in mezzi acquosi a:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>pH acido</div> <div>pH basico</div> <div>pH neutro</div> <div>a qualsiasi pH</div> <div>piu' di una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	A
N°	12	Domanda In quale caso è obbligatorio riportare a fine pagina i dati riassuntivi delle operazioni nel registro entrata e uscita stupefacenti?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>ogni volta che finisce una pagina</div> <div>non è necessario riportare dati riassuntivi</div> <div>esclusivamente nelle operazioni di chiusura di fine anno</div> <div>quando la registrazione non prosegue nella pagina successiva</div> <div>esclusivamente quando la registrazione prosegue su di un altro registro</div>	Risposta esatta	D



N°	13	Domanda	Per i farmaci teratogeni, il massimo rischio di malformazioni fetali si ha somministrandoli: U ₅₀ è definita:	N°	15	Domanda	L'attitudine allo scorrimento di una polvere avente un angolo di riposo di 31- 35 gradi ,secondo la F. U ₅₀ è definita:
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>nel secondo trimestre di gravidanza</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>nel terzo trimestre di gravidanza</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>nel primo trimestre di gravidanza</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>durante tutto il periodo della gravidanza</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>eccellente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>buona</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>discreta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sufficiente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>scadente</div></div>	
		Risposta esatta C				Risposta esatta B	
N°	14	Domanda	Le segnalazioni di incidenti con dispositivi medici: vanno inviate secondo tempistiche specifiche e definite vanno inviate in tempi congrui alla trattazione dell'incidente da parte dei soggetti coinvolti non sono soggette a particolari scadenze vanno inviate al Ministero della Salute secondo tempistiche specifiche e definite vanno inviate alla Commissione europea	N°	16	Domanda	L'industria farmaceutica può chiedere direttamente al segnalatore informazioni aggiuntive rispetto a quelle inserite nella Rete Telematica Nazionale di Farmacovigilanza? in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario solo in caso di reazioni avverse gravi solo in caso di reazioni avverse non note mai sempre
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>vanno inviate secondo tempistiche specifiche e definite</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>vanno inviate in tempi congrui alla trattazione dell'incidente da parte dei soggetti coinvolti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>non sono soggette a particolari scadenze</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>vanno inviate al Ministero della Salute secondo tempistiche specifiche e definite</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>vanno inviate alla Commissione europea</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>solo in caso di reazioni avverse gravi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>solo in caso di reazioni avverse non note</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>mai</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sempre</div></div>	
		Risposta esatta D				Risposta esatta D	



Domanda Il naltrexone, avente la struttura indicata, è un farmaco



- A** anti MAO
- B** beta-bloccante
- C** diuretico
- D** antidiuretico
- E** antagonista degli oppiacei

Risposta esatta E

Risposta esatta D

18 Domanda Bloccanti di vari tipi di canali del Na^+ trovano impiego

- A** come antiaritmici
- B** come anticonvulsivanti
- C** come anestetici locali
- D** tutte le indicazioni sono corrette
- E** solo due indicazioni sono corrette


Risposta esatta

Domanda N° 20 Il numero di codice del lotto di un dispositivo medico:

- A** deve essere riportato in etichetta
- B** deve essere riportato nelle istruzioni per l'uso
- C** deve essere riportato sia nell'etichetta che nelle istruzioni per l'uso
- D** deve essere riportato nel manuale
- E** nessuna delle indicazioni è corretta

Risposta esatta A

19 Domanda Quale delle affermazioni riportate e riferite alle due curve dose-effetto indicate in figura è corretta: la curva indicata come "Farmaco B" può essere riferita ad una miscela del "Farmaco A" con un suo



- ☐ **A** antagonista non competitivo

☐ **B** agonista non competitivo

☐ **C** più d'una delle indicazioni fornite è corretta

☐ **D** antagonista competitivo


☐ **E** agonista competitivo

N°	21	Domanda	La terazosina agisce:		N°	23	Domanda	Le monoammino ossidasi (MAO) funzionano da catalizzatori biologici nei processi di ossidazione delle ammine biogene trasformandole nelle corrispondenti aldeidi. A carico di quale specie molecolare avviene il processo globale di ossidazione		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>bloccando selettivamente i recettori adrenergici alfa1</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>bloccando i recettori adrenergici beta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>stimolando i recettori adrenergici alfa2</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>bloccando selettivamente i recettori adrenergici alfa2</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>stimolando i recettori beta3</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>l'anidride carbonica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>l'acqua ossigenata</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>l'acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>l'ossigeno</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>specie diverse da quelle indicate</div></div>			
				Risposta esatta	A				Risposta esatta	D

N°	22	Domanda	Sull'etichetta di un contenitore di una preparazione galenica deve essere riportato		N°	24	Domanda	In un prodotto cosmetico i coloranti:	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il nome della farmacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la scadenza di impiego</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>le precauzioni di impiego</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>più di una risposta è corretta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>il prezzo praticato in maniera analitica</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>devono essere riportati, e possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>non devono essere mai riportati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>non devono essere indicati se in concentrazione inferiore all'1%</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>devono essere riportati all'inizio dell'elenco</div></div>		
				Risposta esatta D					Risposta esatta A



N°	25	Domanda	Quale, tra le seguenti indicazioni, corrisponde maggiormente alla definizione di "farmacodinamica"?	<div><div><div><div><div>A</div><div>nessuna tra le definizioni sotto elencate</div></div><div><div>B</div><div>"l'insieme dei meccanismi che regolano lo spostamento del farmaco nell'organismo"</div></div><div><div>C</div><div>la velocità di eliminazione della molecola di farmaco</div></div><div><div>D</div><div>la velocità con la quale prende avvio l'azione farmacologica</div></div><div><div>E</div><div>l'interazione tra il farmaco ed il recettore e le conseguenze biologiche che ne derivano</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	27	Domanda	L'atropina, avente la struttura indicata, è utile negli avvelenamenti da insetticidi organofosforici in quanto	<div><div><div><div><div>A</div><div>stimola i recettori alfa direttamente</div></div><div><div>B</div><div>stimola i recettori beta direttamente</div></div><div><div>C</div><div>inibisce la trasmissione gangliare</div></div><div><div>D</div><div>blocca l'azione dell'acetilcolina sia nel sistema nervoso centrale che in quello periferico</div></div><div><div>E</div><div>riattiva la acetilcolinesterasi inibita</div></div></div></div><div><chem>CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H](C(=O)C[C@H](O)C3=CC=CC=C3)C2</chem></div></div>	Risposta esatta	D
N°	28	Domanda	La sertralina, avente la struttura indicata, è un antidepressivo che	<div><div><div><div><div>A</div><div>inibisce il reuptake della dopamina</div></div><div><div>B</div><div>favorisce il rilascio della dopamina</div></div><div><div>C</div><div>inibisce il reuptake della serotonina</div></div><div><div>D</div><div>favorisce il rilascio della serotonina</div></div><div><div>E</div><div>favorisce il rilascio del GABA</div></div></div></div><div><chem>CN1Cc2ccccc2C1c3cc(Cl)cc(Cl)cc3</chem></div></div>	Risposta esatta	C



N° 31 Domanda Il vantaggio della funzione di "doppio estere" presente nella pivampicillina rispetto alla funzione di "estere semplice" è rappresentato da


☐ A una più rapida e completa idrolisi dopo l'assorbimento

☐ B una maggiore attività farmacologica del diestere come tale

☐ C una più elevata lipofilia

☐ D una maggiore stabilità alla conservazione del medicinale

☐ E minori effetti collaterali



Risposta esatta A

Domanda Quale dei seguenti principi attivi è un farmaco antitumorale:

A propranololo

B sotalolo

C letrozolo

D sulfadimetossina

E carvedilolo

Risposta esatta C

N° 32 Domanda L'associazione levodopa-carbidopa viene usata per il trattamento

A del morbo di Hodgkin

B del morbo di Parkinson

C dell'immunodeficienza acquisita

D della malattia del sonno

E della tubercolosi

Risposta esatta **B**

Domanda Basi deboli sono meno ionizzate in ambiente:

A ☐ basico



B ☐ acido



C ☐ neutro

D ☐ la ionizzazione non dipende dal pH del mezzo


E ☐ in tutti gli ambienti indicati

Risposta esatta A




N°	33	Domanda	Quale delle seguenti sostanze non si utilizza come anticonvulsivante?	<input type="radio"/> A vigabatrin <input type="radio"/> B acido valproico <input type="radio"/> C acido feniltilbarbiturico <input type="radio"/> D carbamazepina <input type="radio"/> E amitriptilina	Risposta esatta	E
N°	35	Domanda	Un farmaco basico nella sua protonata ha un $pK_a = 6$. Quando esso entra in una cellula dove il valore del pH è superiore rispetto a quello del fluido extracellulare, la concentrazione della forma ionizzata	<input type="radio"/> A aumenta rispetto a quella presente nel fluido extracellulare <input type="radio"/> B diminuisce rispetto a quella presente nel fluido extracellulare <input type="radio"/> C rimane identica rispetto a quella presente nel fluido extracellulare <input type="radio"/> D non si può prevedere in quanto mancano i valori numerici del pH nei due distretti <input type="radio"/> E nessuna delle indicazioni fornite è corretta	Risposta esatta	B
N°	36	Domanda	A quale degli intervalli di pH sotto elencati, il rivestimento delle compresse costituito dal prodotto avente la struttura polimetacrilica riportata (con $m \neq n$) si solubilizza facilmente	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <input type="radio"/> A 2 - 3 <input type="radio"/> B 6 - 7 <input type="radio"/> C 5 - 6 <input type="radio"/> D 5,5 - 6,5 <input type="radio"/> E la solubilizzazione non dipende dal pH	Risposta esatta	E


N°	37	Domanda	Quale dei seguenti antagonisti dei canali del Ca^{2+} ha una azione più specifica sull'attività cardiaca	<div><div><div>A</div><div>nifedipina</div></div><div><div>B</div><div>verapamil</div></div><div><div>C</div><div>lacidipina</div></div><div><div>D</div><div>amlodipina</div></div><div><div>E</div><div>nitrendipina</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	39	Domanda	Quale dei seguenti farmaci non è un antagonista dei recettori alfa adrenergici:	<div><div><div>A</div><div>fenossibenzamina</div></div><div><div>B</div><div>terazosina</div></div><div><div>C</div><div>alfuzosina</div></div><div><div>D</div><div>dobutamina avente la struttura indicata</div></div><div><div>E</div><div>tutti sono alfa antagonisti</div></div></div> <div><chem>CC(C)N(CCc1ccc(O)cc1)Cc2ccc(O)c(O)c2</chem></div>	Risposta esatta	D
N°	40	Domanda	Il sotalolo, avente la struttura indicata, in quale delle seguenti patologie è controindicato	<div><div><div>A</div><div>ipertensione arteriosa</div></div><div><div>B</div><div>tachicardia sinusale da stress emotivo</div></div><div><div>C</div><div>ipertrofia</div></div><div><div>D</div><div>asma bronchiale</div></div><div><div>E</div><div>tachiaritmia sopraventricolare</div></div></div> <div><chem>CC(C)N(CC(O)c1ccc(cc1)NS(=O)(=O)C)Cc2ccc(O)cc2</chem></div>	Risposta esatta	D



— 12 —



N°	45	Domanda	L'iponiastide presenta attività:	<div><div>A</div>antifungina</div> <div><div>B</div>antipertensiva</div> <div><div>C</div>antidepressiva</div> <div><div>D</div>antipiretica</div> <div><div>E</div>analgesica</div>	Risposta esatta	C
N°	47	Domanda	Un dispositivo per test autodiagnostico è:	<div><div>A</div>un dispositivo che può essere utilizzato solo nei laboratori di analisi</div> <div><div>B</div>un dispositivo che può essere utilizzato solo dagli operatori sanitari</div> <div><div>C</div>un dispositivo destinato all'utilizzo da parte di profani</div> <div><div>D</div>un dispositivo "per uso esclusivo di ricerca"</div> <div><div>E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta	C
N°	46	Domanda	Che cosa deve obbligatoriamente annotare il farmacista in calce alle ricette in triplice copia a ricalco per stupefacenti?	<div><div>A</div>nulla</div> <div><div>B</div>gli estremi di un documento d'identità dell'acquirente, solo nel caso in cui non lo conosca</div> <div><div>C</div>gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente</div> <div><div>D</div>gli estremi del buono-acquisto</div> <div><div>E</div>gli estremi di un documento di riconoscimento dell'intestatario della ricetta</div>	Risposta esatta	C
N°	48	Domanda	La pirenzepina inibisce la secrezione gastrica. Quale delle seguenti affermazioni che la riguardano è corretta	<div><div>A</div>è un antagonista dei recettori H2</div> <div><div>B</div>è un agonista dei recettori muscarinici localizzati a livello gastrico</div> <div><div>C</div>è un antagonista dei recettori muscarinici M3 delle cellule parietali gastriche</div> <div><div>D</div>è un antagonista dei recettori M1 dei gangli intramurali della parete gastrica</div> <div><div>E</div>è un antagonista dei recettori della gastrina delle cellule parietali gastriche</div>	Risposta esatta	D




N°	49	Domanda	I lattami sono	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div></div><div><div><div>esteri ciclici</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div></div><div><div><div>ammidi cicliche</div></div></div></div> <div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div></div> <div><div><div>derivati dell'acido lattico</div></div></div>
----	----	---------	----------------	--

☐ D

derivati della lattide

☐ E

proteine presenti nel latte




N°	53	Domanda	Alcuni farmaci possono indurre miopia; indicare quali tra quelli elencati	<div><div><div>A</div><div>beta bloccanti</div></div><div><div>B</div><div>diuretici</div></div><div><div>C</div><div>acido acetilsalicilico</div></div><div><div>D</div><div>digitale</div></div><div><div>E</div><div>statine</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	55	Domanda	I principali farmaci induttori degli enzimi epatici di biotrasformazione sono:	<div><div><div>A</div><div>i diuretici</div></div><div><div>B</div><div>i FANS</div></div><div><div>C</div><div>gli antilubera</div></div><div><div>D</div><div>i glicosidi cardioattivi</div></div><div><div>E</div><div>i barbiturici</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	54	Domanda	Le ispezioni in farmacia per verificare la regolare tenuta della documentazione relativa alla vendita di medicinali veterinari sono effettuate	<div><div><div>A</div><div>dal Ministero della Salute</div></div><div><div>B</div><div>dall'A.S.L.</div></div><div><div>C</div><div>dalla Regione</div></div><div><div>D</div><div>dall'Ordine dei Farmacisti</div></div><div><div>E</div><div>dall'apposito nucleo di Polizia Veterinaria della Polizia Municipale</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	56	Domanda	L'applicazione topica oculare di timolo può essere utilizzata per indurre	<div><div><div>A</div><div>miosi</div></div><div><div>B</div><div>midriasi</div></div><div><div>C</div><div>diminuzione della formazione di umor acqueo</div></div><div><div>D</div><div>aumento della formazione di umore acqueo</div></div><div><div>E</div><div>secrezione delle ghiandole lacrimali</div></div></div> <div><chem>CC(C)N(CCOC1=NC2=NC(=S1)N2)C3OCCN3</chem></div>	Risposta esatta	C



N°	57	Domanda	Le associazioni anticoncezionali sono costituite da:	<div><div>A</div>due estrogeni a diversa durata d'azione</div> <div><div>B</div>due progestinici a diversa durata d'azione</div> <div><div>C</div>un estrogeno ed un progestinico</div> <div><div>D</div>una gonadotropina ed un estrogeno</div> <div><div>E</div>una gonadotropina ed un progestinico</div>	Risposta esatta	C
N°	58	Domanda	In una compressa, quale dei seguenti eccipienti conferisce la proprietà della gastroresistenza?	<div><div>A</div>lattosio</div> <div><div>B</div>silice precipitata</div> <div><div>C</div>cellulosa microcristallina</div> <div><div>D</div>cellulosa aceto filato</div> <div><div>E</div>magnesio stearato</div>	Risposta esatta	D

N°	59	Domanda	In un cosmetico destinato ai bambini di età inferiore ai tre anni è permesso l'impiego di talco?	<div><div>A</div>è consentito purchè riporti l'avvertenza: "tenere lontano dal naso e dalla bocca dei bambini"</div> <div><div>B</div>non è mai consentito</div> <div><div>C</div>è sempre consentito</div> <div><div>D</div>nessuna indicazione è corretta</div> <div><div>E</div>più di una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	A
N°	60	Domanda	La DE50 di un determinato farmaco è riportata essere pari a 2 micromolare. A quale delle concentrazioni molarì sotto elencate si avvicina maggiormente la concentrazione indicata	<div><div>A</div>1x10⁻¹²</div> <div><div>B</div>1x10⁻³</div> <div><div>C</div>1x10⁻⁹</div> <div><div>D</div>1x10⁻¹</div> <div><div>E</div>1x10⁻⁶</div>	Risposta esatta	E







N°	61	Domanda	L'arancio amaro (epicarpo di <i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>amara</i> Engl.) viene utilizzato in preparati ad azione:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>dimagrante</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>ipocolesterolemizzante</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>diuretica</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>immunostimolante</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>antiulcera</div>		
				Risposta esatta	A

N°	63	Domanda	Come si conservano in farmacia le sostanze velenose:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>senza particolari formalità, ma adottando ogni cautela utile ad evitare situazioni pericolose</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>obbligatoriamente in armadio chiuso a chiave insieme agli stupefacenti delle Tabelle F. U.</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>obbligatoriamente in armadio chiuso a chiave ma separati dagli stupefacenti delle Tab F. U.</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>senza alcuna particolare formalità</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>obbligatoriamente in locali separati da quelli in cui avviene la vendita al pubblico</div>		
				Risposta esatta	C



N°	62	Domanda	Il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali per la dispensazione di medicinali durante le ore di chiusura diurna è dovuto quando la farmacia effettua servizio "a battenti aperti"?		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>e' a discrezione del farmacista</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>sì, sempre</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>no, mai</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>sì, ma solo per le farmacie rurali sussidiate</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>sì, tranne che per le ricette rilasciate dal servizio di guardia medica</div>		
				Risposta esatta	C

N°	64	Domanda	Quale, tra gli aminoacidi elencati e riportati in struttura, appartiene alla categoria dei cosiddetti "amminoacidi ramificati" (BCAA)?		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Alanina(I)</div></div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Serina (III)</div></div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Leucina (II)</div></div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Acido aspartico(IV)</div></div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuno di quelli indicati</div>		
				Risposta esatta	C






N°	65	Domanda	I messaggeri chimici si formano da sostanze che vengono immesse nell'organismo con la dieta. Dalla serina, avente la struttura indicata, deriva il neurotrasmettore	<input type="radio"/> A GABA <input type="radio"/> B Serotonina <input type="radio"/> C Dopamina <input type="radio"/> D Acetilcolina <input type="radio"/> E Istamina	Risposta esatta	D
						
N°	67	Domanda	Quale è l'attività farmacologica più rilevante che può essere ipotizzata per la difenidramina, avente la struttura indicata?	<input type="radio"/> A antistaminica - H1 <input type="radio"/> B nicotina <input type="radio"/> C colinergica <input type="radio"/> D antistaminica H2 <input type="radio"/> E analgesica	Risposta esatta	A
						
N°	68	Domanda	L'attivazione recettoriale di una fosfolipasi C porta come primo evento:	<input type="radio"/> A idrolisi del fosfatidilinositolo difosfato ad inositolo trifosfato e diacilglicerolo <input type="radio"/> B aumentata sintesi di adenosin monofosfato ciclico <input type="radio"/> C inibizione della sintesi di adenosin monofosfato ciclico <input type="radio"/> D liberazione di acido arachidonico dai fosfolipidi di membrana <input type="radio"/> E produzione di ossido d'azoto	Risposta esatta	A
N°	66	Domanda	La cimetidina inibisce la biotrasformazione di:	<input type="radio"/> A cronoglicato di sodio <input type="radio"/> B metformina <input type="radio"/> C atenolo <input type="radio"/> D warfarin <input type="radio"/> E esametolio	Risposta esatta	D

N°	69	Domanda	Due soluzioni acquose presentano valori diversi del punto di gelo. Se la prima gela ad una temperatura più bassa rispetto alla seconda vuol dire che nei confronti di quest'ultima è	<div><div>A</div>isotomica</div> <div><div>B</div>isotonica</div> <div><div>C</div>ipertonica</div> <div><div>D</div>ipotonica</div> <div><div>E</div>con identica concentrazione</div>	Risposta esatta	C
N°	71	Domanda	In un cosmetico può essere utilizzato qualsiasi filtro solare?	<div><div>A</div>sì, purché sicuro</div> <div><div>B</div>solo gli ingredienti riportati nell'Allegato V della Legge 713/86</div> <div><div>C</div>sì, solo gli ingredienti riportati in F.U.</div> <div><div>D</div>più di una indicazione è corretta</div> <div><div>E</div>nessuna indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	B
N°	72	Domanda	Per quale dei farmaci anticoagulanti elencati la protamina solfato rappresenta un antidoto?	<div><div>A</div>warfarin</div> <div><div>B</div>dicumarolo</div> <div><div>C</div>fenprocumone (struttura indicata)</div> <div><div>D</div>bivalitudina</div> <div><div>E</div>eparina</div>	Risposta esatta	E




N°	73	Domanda	Nelle tecniche utilizzate per ottenere il controllo del rilascio dei farmaci nell'organismo si utilizzano reazioni che permettono di legare il farmaco (F-arm) ad una resina (Res). Quale delle affermazioni, sotto elencate e riguardanti questa tecnologia è corretta
			$\begin{array}{c} \text{R}_\text{es}-\text{N}^+ \\ \\ \text{R}_\text{es}-\text{COOH} \end{array}$ <p>(I)</p> <p>(II)</p>
		A	con i farmaci aventi carattere acido si deve usare la resina (II)
		B	con i farmaci aventi un gruppo amminico si deve usare la resina (I)
		C	con i farmaci aventi un carbossile libero si deve usare la resina (I)
		D	per i farmaci che non hanno gruppi COOH o NH ₂ si può usare indifferentemente (I) o (II)
		E	tutte le affermazioni riportate, tranne una, sono corrette
		Risposta esatta	C
N°	74	Domanda	Quando si modifica il gruppo fenilacetamidico della penicillina G con il gruppo R sotto indicato, si ottiene la mezlocillina che appartiene alle penicilline
			<p style="text-align: center;">R =</p>
		A	gastroresistenti
		B	ritardo
		C	con carattere di profarmaco ed aventi la stessa attività delle penicilline corrispondenti
		D	anti-Pseudomonas
		E	aventi più di una delle caratteristiche indicate
		Risposta esatta	D
N°	75	Domanda	Le case di cura sprovviste di farmacia interna si approvvigionano di medicinali stupefacenti
		A	presso grossisti e farmacie aperte al pubblico
		B	non è normativamente stabilito
		C	solo presso farmacie aperte al pubblico
		D	solo presso grossisti e produttori
		E	solo presso i produttori
		Risposta esatta	A
N°	76	Domanda	In quale delle seguenti situazioni è utilizzata la tamsulosina?
		A	nei disturbi delle vie urinarie associati a iperplasia prostatica benigna
		B	nell'ipertensione
		C	nell'angina pectoris
		D	come disinfettante urinario
		E	come decongestionante nasale
		Risposta esatta	A



N°	77	Domanda Il Letrozolo ha come indicazione clinica principale: <div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>la terapia antipertensiva</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>il trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce in donne in postmenopausa</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>l'angina pectoris</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>il trattamento di tumori ai testicoli</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni riportate</div></div></div></div>			
N°	79	Domanda Tra le caratteristiche chimiche e/o chimico-fisiche sotto riportate quale è quella che si dovrebbe più frequentemente riscontrare per le molecole dei farmaci classificabili come anestetici generali? <div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>analogia strutturale</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>elevato coefficiente di ripartizione olio-acqua</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alto peso molecolare</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>elevato grado di viscosità</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>pronunciata dissociazione ionica</div></div></div></div>			Risposta esatta B
N°	80	Domanda Tra i farmaci elencati, quello più indicato nella terapia della schizofrenia a prevalenza di sintomi negativi è <div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il clordiazepossido</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>l'aloiperidolo</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>il citalopram</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la clonidina</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>la clozapina</div></div></div></div>			Risposta esatta E



N°	81	Domanda	L'idroclorotiazide, avente la struttura indicata, esercita la sua azione mediante l'inibizione	N°	83	Domanda	La sindrome serotoninergica si può verificare a seguito di assunzione contemporanea di Iperico (<i>Hypericum perforatum</i> L.) e:	
		<div><div><chem>O=C1NC(=O)C2=C(N1)C(=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)N</chem></div></div>	<div><div><div>A</div><div>del cotrasporto 2Cl⁻, Na⁺, K⁺</div></div><div><div>B</div><div>dell'antiporto H⁺, Na⁺</div></div><div><div>C</div><div>dello scambiatore Na⁺, Ca2⁺</div></div><div><div>D</div><div>del cotrasporto Cl⁻, Na⁺</div></div><div><div>E</div><div>dei canali del K⁺</div></div></div>			<div><div><div>A</div><div>diazepam</div></div><div><div>B</div><div>sertralina</div></div><div><div>C</div><div>tacrolimus</div></div><div><div>D</div><div>irinotecan</div></div><div><div>E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	82	Domanda	Nella preparazione delle compresse è possibile impiegare pigmenti colorati. Quale tra le sostanze sotto indicate è uno di questi?	N°	84	Domanda	L'assorbimento per trasporto attivo dipende da:	
		<div><div><div>A</div><div>amido</div></div><div><div>B</div><div>biossido di titanio</div></div><div><div>C</div><div>bentonite</div></div><div><div>D</div><div>talco</div></div><div><div>E</div><div>magnesio stearato</div></div></div>			<div><div><div>A</div><div>un'elevata solubilità del farmaco in acqua</div></div><div><div>B</div><div>un'elevata solubilità del farmaco in olio</div></div><div><div>C</div><div>grado di ionizzazione del farmaco</div></div><div><div>D</div><div>dispendio di energia da parte della cellula</div></div><div><div>E</div><div>gradiente favorevole di concentrazione</div></div></div>	Risposta esatta	D	


N°	85	Domanda	L'antitussivo, derivato del morfina ed avente la struttura indicata, è impiegato sotto forma di:		N°	87	Domanda	Il trasferimento della farmacia in altri locali nell'ambito della stessa sede farmaceutica	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>composto achirale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>isomero destro</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>isomero levo</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>composto racemico</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>disomero</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>è consentito previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Locale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>non è consentito</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>è consentito solo nell'ipotesi di sentenza di sfratto esecutivo del locale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>è consentito solo nell'ipotesi di forza maggiore</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>è consentito previa autorizzazione dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti</div>		
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	A
N°	86	Domanda	Quando nella F.U. viene indicato il termine soluzione senza indicazione del solvente si deve intendere una:		N°	88	Domanda	I farmaci agonisti ed antagonisti adrenergici trovano applicazione nella terapia cardiovascolare. In quale delle seguenti patologie sono utilizzati?	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>soluzione etanolica</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>soluzione acqua etanolo 1:1</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>soluzione acquosa</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>una soluzione tampone</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuna indicazione è corretta</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>aritmie</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>insufficienza venosa cronica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>insufficienza cardiaca</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>tutte le indicazioni sono corrette</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>Soltanto due indicazioni sono corrette</div>		
			Risposta esatta	C				Risposta esatta	E




N°	89	Domanda	Quale delle seguenti sostanze può venire impiegata quale disgregante.
		A	polivinilpirrolidone
		B	cellulosa acetofalato
		C	saccarosio
		D	amido
		E	peg 6000
		Risposta esatta	D



N°	90	Domanda	La posologia di un medicinale omeopatico in campo pediatrico è diversa da quella per l'adulto?
		A	e' generalmente indipendente dall'età del paziente
		B	e' diversa tra bambino e adulto
		C	dipende dal tipo di medicinale utilizzato
		D	dipende dalla patologia trattata
		E	nessuna indicazione è corretta
		Risposta esatta	A

N°	91	Domanda	La carbamazepina è il composto rappresentato dalla struttura indicata. La sua attività farmacologica prevalente è
		A	antidepressiva
		B	ipnotica
		C	antiepilettica
		D	analgesica
		E	tranquillante
		Risposta esatta	C





N°	92	Domanda	La quaternarizzazione dell'atomo di azoto della (+)-S-isclamina porta all'ipratropio, sotto rappresentato. Quale effetto farmacologico produce tale variazione?
		A	riduce l'attività antimuscarinica
		B	confina l'azione antimuscarinica a livello periferico
		C	introduce attività anticolinesterasica
		D	introduce selettività verso i recettori M1
		E	introduce selettività verso i recettori M2
		Risposta esatta	B







N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
93	Un medicinale contiene metoprolanamide e simeticona. Quale delle affermazioni sotto riportate è corretta.	B	A
95	Gli operatori sanitari che rilevano la presenza di difetti o corpi estranei in un medicinale devono:	B	A


N°	Domanda	Risposta esatta
94	Quale è l'attività farmacologica più rilevante che può essere ipotizzata per la struttura indicata riconducibile ad una morfina?	E
96	L'indice terapeutico è espresso	E



N°	97	Domanda	Dopo la consegna, in caso di necessità e urgenza, di un farmaco assoggettato a prescrizione medica senza presentazione di ricetta medica il farmacista deve:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale</div><div>consegnare al cliente una scheda, da inoltrare al medico curante, contenente la specificazione del medicinale</div><div>far sottoscrivere, nei casi previsti, una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto</div><div>annotare la consegna su apposito registro indicando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione che ha dato luogo alla consegna del medicinale</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E
N°	99	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce l'eritromicina, avente la struttura indicata?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div></div><div>sintesi proteica ribosomiale</div><div>membrana citoplasmatica</div><div>unità ribosomiale 50S</div><div>unità ribosomiale 30S</div><div>più di uno</div></div>	Risposta esatta	E
N°	100	Domanda	Il captopril può indurre tutti gli effetti indesiderati elencati, TRANNE	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>albuminuria</div><div>tosse secca</div><div>alterazione del senso del gusto</div><div>perdita di K+</div><div>neutropenia</div></div>	Risposta esatta	D



N°	101	Domanda	Dall'iperattivazione di quale delle seguenti regioni cerebrali dipende, almeno in parte, la sindrome di astinenza da oppioidi?		N°	103	Domanda	Il flumazenil blocca gli effetti di:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div> corteccia cerebrale</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div> Fenobarbital</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div> area mesolimbica</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div> GABA</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div> midollo spinale</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div> Zolpidem</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div> corpo striato</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div> Aldano</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div> ipotalamo</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div> nessuna delle indicazioni è corretta</div>	
				Risposta esatta B					Risposta esatta C
N°	102	Domanda	E' consentito l'impiego di alcool metilico nella preparazione di medicinali?		N°	104	Domanda	La idiosincrasia ai farmaci è:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div> sì, sempre</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div> una reazione allergica</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div> no, mai</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div> una risposta abnorme ai farmaci su base genetica</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div> sì, ma solo per preparazioni su ricetta medica</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div> un fenomeno di tolleranza ai farmaci</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div> sì, ma solo in quantità non superiori allo 0,1%</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div> una reazione dovuta ad interazione farmacologica</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div> sì, ma solo nei limiti fissati dalla F.U.</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div> una reazione su base immunitaria</div>	
				Risposta esatta B					Risposta esatta B



N°	105	Domanda In quale caso la ricetta destinata ad animali da compagnia deve essere redatta su apposito modello ministeriale?	<div><div><div><div><div>A</div><div>in tutti i casi</div></div><div><div>B</div><div>nelle prescrizioni di medicinali veterinari autorizzati (anche o solo) per animali da reddito</div></div><div><div>C</div><div>quando si devono prescrivere ad animali farmaci per uso umano</div></div><div><div>D</div><div>quando si devono prescrivere galenici magistrali</div></div><div><div>E</div><div>quando occorre una ripetibilità nel tempo</div></div></div></div></div>	Risposta esatta B	
N°	107	Domanda La griseofulvina viene commercializzata in forma micronizzata per aumentarne l'estensione superficiale al fine di incrementare	<div><div><div><div><div>A</div><div>più di una delle proprietà indicate</div></div><div><div>B</div><div>nessuna delle proprietà indicate</div></div><div><div>C</div><div>l'affinità per il recettore</div></div><div><div>D</div><div>il coefficiente di ripartizione</div></div><div><div>E</div><div>la velocità di passaggio in soluzione</div></div></div></div></div>	Risposta esatta E	
N°	108	Domanda Il suffisso "triptan" è tipico della classe dei farmaci:	<div><div><div><div><div>A</div><div>agonisti dei recettori serotoninergici 5-HT1</div></div><div><div>B</div><div>antagonisti dei recettori serotoninergici 5-HT1</div></div><div><div>C</div><div>agonisti dei recettori serotoninergici 5-HT3</div></div><div><div>D</div><div>antagonisti dei recettori serotoninergici 5-HT3</div></div><div><div>E</div><div>antagonisti dei recettori muscarinici m3</div></div></div></div></div>	Risposta esatta A	



N°	109	Domanda In quale caso è consentita la pubblicità al pubblico di medicinali vendibili solo su presentazione di ricetta medica?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>in tutti i casi descritti</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>in nessun caso in assoluto</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>nel caso di campagne promozionali di vaccinazione autorizzate dal Ministero della Salute</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>nel caso di farmaci erogabili in regime di SSN a livello ospedaliero</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nelle campagne promozionali di medicinali destinati all'infanzia autorizzate dalla Regione</div>		
N°	111	Domanda La furosemide può aumentare la tossicità di uno dei seguenti farmaci somministrati in concomitanza:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>sali di litio</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>aspirina</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>cefaloridina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>noradrenalina</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>ioduri</div>		Risposta esatta A
N°	112	Domanda L'uso prolungato della nafazolina può provocare:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>rinite iatrogena</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>tossicità per ridotto metabolismo</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>diarrea</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>ipoglicemia</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>ipotiroidismo</div>		Risposta esatta A
N°	110	Domanda Il mifepristone è un farmaco ad attività:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antiprogestinica</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>antiestrogenica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>antiandrogenica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>progestinica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>estrogenica</div>		Risposta esatta A




N°	113	Domanda	Quale dei composti elencati NON è un antinfettivo chinolonico?	<div><div><div>A</div></div><div>acido nalidissico</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>enoxacina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>nitrofurantoina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>lomefloxacin</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>ofloxacin</div></div>	Risposta esatta	C
N°	115	Domanda	Osetamivir agisce come:	<div><div><div>A</div></div><div>anti HIV</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>antierpetico</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>anti HCV</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>antinfluenzale</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>anti RSV</div></div>	Risposta esatta	D
N°	114	Domanda	Gli acidi micoidi sono acidi grassi ad elevato numero di atomi di carbonio che condizionano il comportamento verso i chemioterapici dei	<div><div><div>A</div></div><div>batteri Gram-negativi</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>batteri Gram-positivi</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>funghi</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>micobatteri</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>retrovirus</div></div>	Risposta esatta	D
N°	116	Domanda	Tra i seguenti diuretici scegliere quello che è antagonista competitivo dell'aldosterone:	<div><div><div>A</div></div><div>teofillina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>spironolattone</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>triamterene</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>acetazolamide</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>clortalazide</div></div>	Risposta esatta	B




N°	117	Domanda	Quando la farmacia allestisce un preparato erboristico deve:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>rispettare le NBP</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>riportare le indicazioni terapeutiche</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>calcolare il prezzo secondo la Tariffa Nazionale dei Medicinali</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>riportare il nome previsto dalla nomenclatura internazionale INCI</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	119	Domanda	In quale delle condizioni elencate il titolare di farmacia può essere direttore responsabile della farmacia succursale assegnatagli?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>In nessuna delle condizioni indicate</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>Se nomina un direttore nella farmacia di cui è titolare</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>Solo nel periodo in cui la farmacia di cui è titolare è chiusa per ferie</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>In più di una delle condizioni elencate</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>Se ottiene apposita autorizzazione dall'Azienda Sanitaria Locale</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	A

N°	118	Domanda	Il colesano è l'idrocarburo di riferimento per gli steroli. Il numero di atomi di carbonio del suo scheletro è	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>15</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>21</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>24</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>18</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>27</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	120	Domanda	Tra le false inetilabili delle sostanze seguenti, quale ha necessità di un veicolo oleoso?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>glucosio</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>vitamina A</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>suxametionio cloruro</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>penicillina G sale di potassio</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>morfin cloridrato</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	B



N°	Domanda	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
121	Il consumo di succo di pompelmo può potenziare gli effetti di quale dei seguenti farmaci?	123	Domanda I diuretici osmotici			
	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Cromoglicato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Nifedipina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Omeprazolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Ampicillina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Glibenclamide</div></div>		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>aumentano la secrezione tubulare di K⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>diminuiscono il riassorbimento tubulare di H₂O</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>una sola delle indicazioni non è corretta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>aumentano l'escrezione di H₂O rispetto a quella di sodio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sono indicati nell'ipertensione endocranica</div></div>			Risposta esatta C

N°	Domanda	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
122	Quali dei seguenti composti sono presenti nel prodotto noto con il nome di "piretine" e ne determinano l'attività:	124	Domanda Il <i>Citrus aurantium</i> L. può indurre tutti i seguenti effetti avversi tranne:			
	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>esteri del piretalone</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>esteri del cinerolone</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>esteri dell'acido piretrico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>esteri dell'acido crisantemico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le risposte sono corrette</div></div>		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>tachicardia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>aumento pressione arteriosa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tremori</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>insonnia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>broncoostrizione</div></div>			Risposta esatta E




N°	125	Domanda	Gli Organismi Notificati sono:		N°	127	Domanda	Le immunossine contengono	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>enti pubblici o privati autorizzati dalle Autorità competenti dei singoli paesi dell'Unione Europea;</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>solo enti pubblici;</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>autorizzati dalla Commissione europea;</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>enti privati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>enti pubblici o privati autorizzati dalla Commissione europea</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>acidi nucleici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>anticorpi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>glicosaminoglicani</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>oligopeptidi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>liposaccaridi</div></div>	
				Risposta esatta A					Risposta esatta B


N°	126	Domanda	Quale delle affermazioni riguardanti i saponi è ERRATA? I saponi		N°	128	Domanda	Il voriconazolo, un farmaco antifungino, può dare:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>anionici e cationici sono tra loro incompatibili</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>di calcio sono molto solubili in acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>molli, in presenza di acque dure (contenenti ioni Ca e Mg), fanno poca schiuma</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>duri sono saponi contenenti magnesio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>anionici formano un precipitato quando si trovano in presenza di saponi cationici</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un metabolita con elevata tossicità renale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>interazione con numerosi altri farmaci per inibizione dell'attività di alcuni enzimi del CYP</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>diarrea</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>vomito</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuno degli effetti indicati</div></div>	
				Risposta esatta B					Risposta esatta B

N°	129	Domanda	Tra gli effetti collaterali degli antidepressivi triciclici, quelli a carico del cuore (disturbi della conduzione, aritmie) sono essenzialmente dovuti a	N°	131	Domanda	La rotazione del magazzino di una farmacia rappresenta:
		<div><div><div>A</div><div>stimolo dei recettori muscarinici</div></div><div><div>B</div><div>inibizione del reuptake neuronale di noradrenalina</div></div><div><div>C</div><div>inibizione del reuptake neuronale di dopamina</div></div><div><div>D</div><div>stimolo diretto dei recettori beta1 adrenergici</div></div><div><div>E</div><div>liberazione di serotonina dalla presinapsi</div></div></div>				<div><div><div>A</div><div>il parametro più importante per valutare la qualità della gestione commerciale</div></div><div><div>B</div><div>una prima misura dell'efficacia delle politiche di acquisto</div></div><div><div>C</div><div>un indice importante per operare dei correttivi sui settori merceologici presenti in farmacia</div></div><div><div>D</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div><div><div>E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div>	
		Risposta esatta	B			Risposta esatta	D




N°	130	Domanda	Il beclometasone ha:	N°	132	Domanda	Quale, tra i seguenti enzimi, partecipa alla formazione della dopamina nell'organismo?
		<div><div><div>A</div><div>effetti sistemici marcati</div></div><div><div>B</div><div>effetti sistemici ridotti</div></div><div><div>C</div><div>tossicità elevata</div></div><div><div>D</div><div>emivita molto lunga</div></div><div><div>E</div><div>elevata potenza sodio-ritentiva</div></div></div>				<div><div><div>A</div><div>più di uno di quelli indicati</div></div><div><div>B</div><div>COMT</div></div><div><div>C</div><div>listidin decarbossilasi</div></div><div><div>D</div><div>DOPA decarbossilasi</div></div><div><div>E</div><div>O-acetiltransferasi</div></div></div>	
		Risposta esatta	B			Risposta esatta	D



N°	133	Domanda L'insulina glargine e l'insulina isofano NPH (Neutral Protamin Hagedom) nelle formulazioni dispensabili al pubblico si presentano, rispettivamente:		N°	135	Domanda La DE50 di un determinato farmaco è riportata essere pari a 5 nanomolare. A quale delle concentrazioni molari sotto elencate essa si avvicina maggiormente		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>la prima in forma di sospensione e la seconda in forma di soluzione</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>la prima in forma di soluzione e la seconda in forma di sospensione</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>entrambe in forma di sospensione</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>entrambe in forma di soluzione</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>entrambe in forma di polvere cristallina</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>1</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>1x10⁻³</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>1x10⁻⁶</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>1x10⁻⁹</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>1x10⁻¹²</div>	Risposta esatta	D
N°	134	Domanda Indicare quale delle azioni ricordate NON costituisce un possibile effetto collaterale dei farmaci antagonisti dei recettori H1 dell'istamina		N°	136	Domanda La decozione consiste nel		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>secchezza delle fauci</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>stipsi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>sedazione</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>disturbi dell'accomodazione</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>tremori</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>trattare la droga con acqua bollente</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>trattare la droga con acqua e successivamente portare all'ebollizione</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>estrazione della droga con alcool a caldo</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>estrazione per percolazione della droga</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>estrazione della droga in corrente di vapore</div>	Risposta esatta	B




N°	137	Domanda	Quale obbligo ha il farmacista per rendere noto al pubblico il prezzo dei medicinali SOP e OTC?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>nessuno, in quanto il prezzo è pubblicato nell'apposito listino dell'AIFA</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>nessuno, in quanto il prezzo è pubblicato nell'apposito listino del produttore</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ha l'obbligo di apporre il prezzo su ogni singola confezione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>deve adottare un listino o altra equivalente modalità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuno, in quanto il prezzo è liberamente stabilito dalla farmacia</div></div>	Risposta esatta	D
N°	139	Domanda	La blemicina ha una tossicità selettiva a livello:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>cardiaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>polmonare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>neuromuscolare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>oculare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>gastrico</div></div>	Risposta esatta	B
N°	140	Domanda	La scopolamina è un principio attivo corrispondente alla formula indicata. Quale delle affermazioni che riguardano tale composto è corretta?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>differisce dall'atropina per il tipo di acido che esterifica la funzione alcoolica tropanolica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si utilizza come antichinetosico solo per via transdermica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>nell'uso transdermico è associata con antistaminici per evitare le allergie da cerotto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>più di una</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte</div></div>	Risposta esatta	B




N°	141	Domanda	Quale tra i seguenti effetti collaterali può essere indotto dall'acido valproico	<div><div><div>A</div><div>epatite fulminante</div></div><div><div>B</div><div>insufficienza renale acuta</div></div><div><div>C</div><div>insufficienza cardiaca congestizia</div></div><div><div>D</div><div>piastrinopenia</div></div><div><div>E</div><div>insufficienza surrenalica acuta</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	143	Domanda	Nella variabilità della risposta ai farmaci sono coinvolti tutti i fattori endogeni indicati tranne:	<div><div><div>A</div><div>l'età</div></div><div><div>B</div><div>la gravidanza</div></div><div><div>C</div><div>i fattori genetici</div></div><div><div>D</div><div>l'allattamento</div></div><div><div>E</div><div>il sesso</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	142	Domanda	Le statine sono i farmaci più efficaci e meglio tollerati per la cura della dislipidemia, esse agiscono inibendo l'enzima:	<div><div><div>A</div><div>3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) riduttasi</div></div><div><div>B</div><div>la topoisomerasi</div></div><div><div>C</div><div>la lipasi</div></div><div><div>D</div><div>la transaminidasi</div></div><div><div>E</div><div>nessuno di questi enzimi</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	144	Domanda	I fluorochinoloni sono CONTROINDICATI	<div><div><div>A</div><div>in età pediatrica</div></div><div><div>B</div><div>in età senile e presenile</div></div><div><div>C</div><div>nei cardiopazienti</div></div><div><div>D</div><div>nei soggetti ipertesi</div></div><div><div>E</div><div>negli asmatici</div></div></div>	Risposta esatta	A




N°	145	Domanda Nel caso in cui il quantitativo di un farmaco sciolto in acqua è espresso come numero di moli per litro di solvente, la concentrazione risulta espressa in	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>nessuno dei termini indicati</div><div>osmolalità</div><div>osmolarità</div><div>molalità</div><div>normalità</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	147	Domanda Il guaranà (semi di <i>Paullinia cupana</i> H.B.K.) è utilizzato in preparati ad azione:	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>sedativa</div><div>lassativa</div><div>dimagrante</div><div>bechica</div><div>antilucera</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	146	Domanda Ai sensi del DL 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 405/2001, il farmacista, sulla base di direttive regionali, può sostituire medicinali che oltre alla composizione in principi attivi e forma farmaceutica, abbiano uguale:	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie</div><div>via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie</div><div>via di somministrazione, modalità di rilascio e dosi unitarie</div><div>modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie</div><div>via di somministrazione, modalità di rilascio e numero di unità posologiche</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	148	Domanda Si procede all'invio della segnalazione di incidente con dispositivo medico in presenza di alterazioni delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo nonché di qualsiasi inadeguatezza nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso, ove vi sia:	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>presenza di corpi estranei</div><div>potenziale rischio di decesso o grave peggioramento della condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore</div><div>potenziale rischio di decesso o grave peggioramento della condizioni di salute di un paziente</div><div>reclami di qualsiasi natura</div><div>alterazioni del confezionamento primario</div></div></div>	Risposta esatta	B





N°	149	Domanda	Quale dei seguenti meccanismi d'azione è ascrivibile al warfarin?		N°	151	Domanda	I corticosteroidi legandosi a recettori presenti nel citosol esercitano effetti:		
		<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div><div>attivazione tissutale del plasminogeno</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div><div>inibizione della sintesi del trombossano</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div><div>alterazione della sintesi dei fattori della coagulazione II, VII, IX, X</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div><div>attivazione dell'antitrombina III</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div><div>inibizione delle fosfodiesterasi</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div><div>metabolici</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div><div>immunodepressivi</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div><div>antinfiammatori</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div><div>tutti quelli indicati</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div><div>nessuno di quelli indicati</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	C			Risposta esatta	D
N°	150	Domanda	La ricetta ministeriale in triplice copia a ricalco per la prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope ha la validità di:		N°	152	Domanda	Il sodio alginato è utile come antiacido:		
		<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div><div>dieci giorni compreso il giorno di rilascio</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div><div>otto giorni escluso il giorno di rilascio</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div><div>trenta giorni escluso il giorno di rilascio</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div><div>un mese</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div><div>tre mesi</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div><div>in quanto la sua struttura molecolare molto complessa libera lentamente i cationi</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div><div>per salificare il magnesio che deve svolgere azione di antiacido</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div><div>per salificare l'alluminio che deve svolgere azione di antiacido</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div><div>in ambiente acido forma un denso gel gastroprotettivo</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div><div>per ragioni diverse da quelle indicate</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	C			Risposta esatta	D



N°	157	<div>Domanda</div> <div>I messaggeri chimici si formano da sostanze che vengono immesse nell'organismo con la dieta. Da quale precursore deriva l'istamina?</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>tirosina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>acido glutammico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>collina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dai triptofano</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>dalla istidina avente la struttura indicata</div></div>	<div><chem>NC(Cc1c[nH]cn1)C(=O)O</chem></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>aumento del rilascio di ammine biogene</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>inibizione dei reuptake di adrenalina e noradrenalina a livello presinaptico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>inibizione delle monoammino ossidasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>incremento della sintesi di noradrenalina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>azione alfa-agonista</div></div>	Risposta esatta E
N°	159	<div>Domanda</div> <div>Gli effetti dell'amfetamina sono dovuti ad</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>riceita da rinnovarsi di volta in volta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>riceita ministeriale in triplice copia a ricalco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>riceita ripetibile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>riceita limitativa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>senza obbligo di ricetta medica</div></div>	<div><chem>CC(N)Cc1ccccc1</chem></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>aumento del rilascio di ammine biogene</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>inibizione dei reuptake di adrenalina e noradrenalina a livello presinaptico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>inibizione delle monoammino ossidasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>incremento della sintesi di noradrenalina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>azione alfa-agonista</div></div>	Risposta esatta A
N°	160	<div>Domanda</div> <div>Un medicinale in compresse a base di flunitrazepam deve essere dispensato con:</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>riceita da rinnovarsi di volta in volta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>riceita ministeriale in triplice copia a ricalco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>riceita ripetibile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>riceita limitativa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>senza obbligo di ricetta medica</div></div>		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>riceita da rinnovarsi di volta in volta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>riceita ministeriale in triplice copia a ricalco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>riceita ripetibile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>riceita limitativa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>senza obbligo di ricetta medica</div></div>	Risposta esatta B
N°	158	<div>Domanda</div> <div>L'importazione di medicinali veterinari è consentita solo nei casi in cui</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>viene preventivamente notificata al Ministero della Salute</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>in nessun caso</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è stata ottenuta l'autorizzazione ministeriale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è stata ottenuta l'autorizzazione regionale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>è stato ottenuto il nulla osta del servizio veterinario della USL</div></div>		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>viene preventivamente notificata al Ministero della Salute</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>in nessun caso</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è stata ottenuta l'autorizzazione ministeriale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è stata ottenuta l'autorizzazione regionale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>è stato ottenuto il nulla osta del servizio veterinario della USL</div></div>	Risposta esatta C




N°	161	Domanda	Quale tra i farmaci elencati si può utilizzare nel trattamento dell'ipercalcemia:
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="radio"/> A Sartani <input type="radio"/> B Inibitori dell'anidrasi carbonica <input type="radio"/> C Diuretici dell'ansa <input type="radio"/> D Tiazidici <input type="radio"/> E Diuretici osmotici </div> <div>Risposta esatta D</div> </div>	
N°	162	Domanda	Il bacioferone, avente la struttura indicata, esercita azione miorilassante
		<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <input type="radio"/> A antagonizzando i recettori per la rianodina nel muscolo scheletrico <input type="radio"/> B antagonizzando i recettori alfa2 adrenergici <input type="radio"/> C inibendo la sintesi centrale di prostaglandine <input type="radio"/> D attivando i recettori GABA-B <input type="radio"/> E antagonizzando i recettori della placca neuromuscolare </div> </div>	
N°	163	Domanda	La difela deve essere controllata con maggiore rigore quando si assumono
		<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <input type="radio"/> A bloccanti dei canali del Na+ <input type="radio"/> B ACE-inibitori <input type="radio"/> C purganti ad azione di massa <input type="radio"/> D inibitori delle monoammino ossidasi <input type="radio"/> E composti triciclici 6-7-6 (struttura indicata a lato) </div> </div>	Risposta esatta D
N°	164	Domanda	Quale degli aggettivi sotto riportati definisce nella maniera più corretta un farmaco che impedisce la crescita batterica
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="radio"/> A antimicrobico <input type="radio"/> B batteriostatico <input type="radio"/> C chemioterapico <input type="radio"/> D battericida <input type="radio"/> E antibiotico </div> <div>Risposta esatta B</div> </div>	


N°	165	Domanda Nell'attribuzione della data limite di utilizzazione di una preparazione galenica magistrale, il farmacista deve tenere in considerazione tutte le informazioni concernenti:	<div><div><div><div><div>A</div><div>la natura delle sostanze ed i loro possibili processi di degradazione</div></div><div><div>B</div><div>la natura del contenitore e le possibili interazioni con il contenuto</div></div><div><div>C</div><div>le possibili degradazioni degli eccipienti</div></div><div><div>D</div><div>le condizioni di conservazione del preparato</div></div><div><div>E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>il potenziale di ionizzazione</div></div><div><div>B</div><div>il pH a cui la molecola ha una carica netta positiva</div></div><div><div>C</div><div>il pH a cui la molecola ha una carica netta negativa</div></div><div><div>D</div><div>il pH a cui la carica netta della molecola è zero</div></div><div><div>E</div><div>il pH a cui la molecola manifesta la massima solubilità</div></div></div></div></div>	167	Domanda Il punto isoelettrico di un aminoacido è	
N°	166	Domanda Le soluzioni isotoniche hanno la stessa osmolarità. Esse devono necessariamente presentare anche	<div><div><div><div><div>A</div><div>la stessa temperatura di congelamento</div></div><div><div>B</div><div>lo stesso colore</div></div><div><div>C</div><div>lo stesso pH</div></div><div><div>D</div><div>la stessa densità</div></div><div><div>E</div><div>la stessa conducibilità</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>Metotrexato</div></div><div><div>B</div><div>Ciclofosfamide</div></div><div><div>C</div><div>Carbamazepina</div></div><div><div>D</div><div>Melidopa</div></div><div><div>E</div><div>Cloramfenicolo</div></div></div></div></div>	168	Domanda Tutte le seguenti sostanze possono avere effetti teratogeni tranne una, indicare quale:	



N°	169	Domanda	Gli agonisti alfa-1 adrenergici hanno azione	<div><div><div>A</div><div>antipertensiva</div></div><div><div>B</div><div>vasocostrittore</div></div><div><div>C</div><div>decongestionante delle mucose</div></div><div><div>D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div><div><div>E</div><div>solo una indicazione è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	171	Domanda	L'utilizzazione terapeutica di numerose sostanze è correlata alla loro capacità di bloccare particolari sistemi enzimatici. Quale, tra le coppie farmaco - enzima sotto elencate, rappresenta l'enzima ed il corrispondente inibitore?	<div><div><div>A</div><div>(captopril) - (tirosina idrossilasi)</div></div><div><div>B</div><div>(cefalosporina) - (transpeptidasi)</div></div><div><div>C</div><div>(selegilina) - (aldeide deidrogenasi mitocondriale)</div></div><div><div>D</div><div>(malathion) - (acetilcolinesterasi)</div></div><div><div>E</div><div>più di una tra quelle indicate</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	170	Domanda	Quale dei seguenti ioni non è incompatibile con le soluzioni acquose di acido alginico?	<div><div><div>A</div><div>Ca²⁺</div></div><div><div>B</div><div>Mg²⁺</div></div><div><div>C</div><div>Ba²⁺</div></div><div><div>D</div><div>Fe³⁺</div></div><div><div>E</div><div>Al³⁺</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	172	Domanda	Una tetraciclina è maggiormente assorbita per os se somministrata :	<div><div><div>A</div><div>a digiuno</div></div><div><div>B</div><div>con latte</div></div><div><div>C</div><div>con sali di calcio</div></div><div><div>D</div><div>con sali di ferro</div></div><div><div>E</div><div>con cefalino</div></div></div>	Risposta esatta	A



N°	173	Domanda	Se una sostanza si scioglie in esano e NON in acqua, essa sarà verosimilmente	<div><div><div>A</div><div>non polare</div></div><div><div>B</div><div>polare</div></div><div><div>C</div><div>ionica</div></div><div><div>D</div><div>disociata</div></div><div><div>E</div><div>solvataa</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	175	Domanda	Gli antidepressivi triciclici di prima generazione:	<div><div><div>A</div><div>si comportano da antagonisti dei recettori dopaminergici</div></div><div><div>B</div><div>esibiscono una latenza clinica di almeno 2-3 settimane</div></div><div><div>C</div><div>inibiscono la sintesi di acetilcolina</div></div><div><div>D</div><div>modulano positivamente i recettori GABA-A</div></div><div><div>E</div><div>inibiscono l'aggregazione piastrinica</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	174	Domanda	Un farmaco basico nella sua forma protonata ha un $pK_a = 7$. Quando esso entra in una cellula dove il valore del pH è uguale rispetto a quello del fluido extracellulare, la concentrazione della specie ionizzata	<div><div><div>A</div><div>rimane identica rispetto a quella presente nel fluido extracellulare</div></div><div><div>B</div><div>diminuisce rispetto a quella presente nel fluido extracellulare</div></div><div><div>C</div><div>aumenta rispetto a quella presente nel fluido extracellulare</div></div><div><div>D</div><div>non si può prevedere in quanto mancano i valori numerici del pH nei due distretti</div></div><div><div>E</div><div>nessuna delle indicazioni fornite è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	176	Domanda	Quale dei seguenti effetti è indotto dalla scopolamina?	<div><div><div>A</div><div>salivazione</div></div><div><div>B</div><div>miosi</div></div><div><div>C</div><div>amnesia</div></div><div><div>D</div><div>broncocostrizione</div></div><div><div>E</div><div>acalasia</div></div></div>	Risposta esatta	C



N°	Domanda	Risposta esatta
177	Domanda A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "azepam" nella Denominazione Comune	<input type="radio"/> A Antinfiammatori di tipo antilinfocitico <input type="radio"/> B Antiepilettici di tipo idantionico <input type="radio"/> C Ansioolitici di tipo benzodiazepinico <input type="radio"/> D Ansioolitici di tipo carbammico <input type="radio"/> E Antistaminici H2
178	Domanda L'atropina (I) e la pralidossina (II) sono farmaci utilizzati terapeuticamente nell'avvelenamento da esteri fosforici in quanto entrambi	<input type="radio"/> A agiscono inibendo l'enzima acetilcolinesterasi <input type="radio"/> B possono influenzare, pur con meccanismi diversi, il sistema colinergico <input type="radio"/> C sono antagonisti competitivi dell'acetilcolina <input type="radio"/> D agiscono sui recettori nicotinici <input type="radio"/> E agiscono sui recettori muscarinici
179	Domanda Quali è l'elminta che si trasmette per via percutanea anche agli uomini?	<input type="radio"/> A Toxocara canis <input type="radio"/> B Echinococco <input type="radio"/> C Dipylidium caninum <input type="radio"/> D Ancylostoma duodenale <input type="radio"/> E Nessuna indicazione è corretta
180	Domanda I farmaci A e B hanno caratteristiche neutre. Quando vengono solubilizzati in una soluzione tampone avente pH = 7,5 mostrano un coefficiente di ripartizione acqua:olio pari a 1×10^{-2} e 1×10^2 rispettivamente. Il tempo di eliminazione dall'organismo	<input type="radio"/> A è più lungo quello di A rispetto a quello di B <input type="radio"/> B è più breve quello di A rispetto a quello di B <input type="radio"/> C è uguale per i farmaci A e B <input type="radio"/> D non si può predire sulla base dei dati forniti <input type="radio"/> E non dipende dalla solubilità a pH = 7,5 in quanto A e B sono neutri



N°	181	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di provitamine?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>sostanze simili alle vitamine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>precursori delle vitamine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>coadiuvanti delle vitamine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antagonisti delle vitamine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>prodotti di trasformazione delle vitamine</div></div>	Risposta esatta	B
----	-----	---------	--	--	-----------------	---


N°	182	Domanda	Se ricorrono le condizioni previste dalla normativa per la consegna da parte del farmacista di medicinali assoggettati a prescrizione medica, in caso di necessità e urgenza, senza presentazione di ricetta medica, è consentito al farmacista di dispensare medicinali con oneri a carico del SSN?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si, sempre</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no, mai</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, solo se il cliente produce la ricetta entro i due giorni successivi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>no, se il medicinale è assoggettato a nota limitativa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si, ma solo se il medicinale rientra nell'elenco dei prodotti del PHT (Prontuario della distribuzione diretta)</div></div>	Risposta esatta	B
----	-----	---------	--	--	-----------------	---

N°	183	Domanda	L'impregnazione è una tecnica che consiste nel fissare una diluizione omeopatica su supporti inerti, quali:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>lattosio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>saccarosio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>più di uno tra quelli indicati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>glicerina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutti quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	C
----	-----	---------	---	---	-----------------	---

N°	184	Domanda	Chi effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione alle disposizioni vigenti è soggetto a:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>sanzioni amministrative</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sanzioni penali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sanzioni penali e sanzioni amministrative</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nessuna sanzione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>arresto</div></div>	Risposta esatta	A
----	-----	---------	---	---	-----------------	---




N°	185	Domanda	Mexiletina e lidocaina sono farmaci accomunati per:		N°	187	Domanda	Quali è la durata di validità di una ricetta non ripetibile a carico del Servizio Sanitario Nazionale?	
			<div><div>A</div>il loro meccanismo d'azione come farmaci antidolorifici</div>	<div><div>A</div>dieci giorni compreso quello di emissione</div>					
			<div><div>B</div>il blocco frequenza-dipendente dei canali del sodio cardiaci</div>	<div><div>B</div>trenta giorni escluso quello di emissione</div>					
			<div><div>C</div>il loro uso come anestetici locali</div>	<div><div>C</div>quindici giorni</div>					
			<div><div>D</div>il trattamento per os delle aritmie ventricolari</div>	<div><div>D</div>tre mesi</div>					
			<div><div>E</div>il potenziamento dell'attività muscarinica del cuore</div>	<div><div>E</div>novanta giorni</div>					Risposta esatta B
N°	186	Domanda	Gli analoghi del GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormon) (leuprorelin, goserelin, triptorelin, busarelin) impiegati nella terapia di malattie ormono-dipendenti sono:		N°	188	Domanda	Le indagini diagnostiche attraverso la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) utilizzano radiazioni elettromagnetiche che, rispetto a quelle che rientrano nel campo del visibile, presentano	
			<div><div>A</div>antagonisti non competitivi sul recettore del GnRH</div>	<div><div>A</div>energia molto più bassa</div>					
			<div><div>B</div>antagonisti competitivi sul recettore del GnRH</div>	<div><div>B</div>valori di lunghezza d'onda molto più elevati</div>					
			<div><div>C</div>degli agonisti sul recettore del GnRH</div>	<div><div>C</div>lunghezza d'onda ed energia molto più basse</div>					
			<div><div>D</div>inattivi sul recettore GnRH ma agonisti non competitivi sui recettori per gli estrogeni</div>	<div><div>D</div>valori di frequenza molto più elevati</div>					
			<div><div>E</div>dotati di elevata attività antagonista sui recettori per gli androgeni</div>	<div><div>E</div>valori di lunghezza d'onda comparabili</div>					Risposta esatta D



N°	Domanda	189	Domanda	191	Domanda
N°	Quale dei principi attivi sotto indicati conferisce ai medicinali che lo contengono l'attività terapeutica di antiacido		Indicare quale delle seguenti attività farmacologiche esplica il propranololo:		
	<div><div>A</div>magaldrato</div>		<div><div>A</div>stimolazione dei recettori α adrenergici</div>		
	<div><div>B</div>dimeticone</div>		<div><div>B</div>blocco dei recettori β adrenergici</div>		
	<div><div>C</div>acido alginico</div>		<div><div>C</div>stimolazione dei recettori β adrenergici + azione anestetica locale</div>		
	<div><div>D</div>più di uno tra quelli indicati</div>		<div><div>D</div>blocco dei recettori α adrenergici</div>		
	<div><div>E</div>nessuno tra quelli indicati</div>		<div><div>E</div>stimolazione dei recettori α adrenergici + azione anestetica locale</div>		
					Risposta esatta B

N°	Domanda	190	Domanda	192	Domanda
N°	Quale, tra le seguenti azioni, NON si osserva con l'uso dei diuretici dell'ansa?		La coniugazione di un biofarmaco con polietilenglicole (PEG) :		
	<div><div>A</div>aumentata eliminazione di Mg^{2+}</div>		<div><div>A</div>aumenta la proteolisi</div>		
	<div><div>B</div>diminuita eliminazione di Ca^{2+}</div>		<div><div>B</div>diminuisce l'immunogenicità</div>		
	<div><div>C</div>aumentata eliminazione di cloruri</div>		<div><div>C</div>incrementa la clearance renale</div>		
	<div><div>D</div>kaliuresi</div>		<div><div>D</div>riduce la presenza a livello ematico</div>		
	<div><div>E</div>alcalosi metabolica</div>		<div><div>E</div>peggiora la solubilità</div>		
					Risposta esatta B



N°	193	Domanda Preparazioni galeniche di capsule contenenti prodotti utilizzati per la dieta di soggetti che praticano lo sport sono attualmente molto frequenti in farmacia. Tra i prodotti utilizzati spesso sono inclusi i così detti "amminocidi ramificati" (BCAA). Quale, tra quelli elencati, appartiene a tale categoria?	N°	195	Domanda Le preparazioni semisolide per applicazione cutanea si suddividono in:
		<div><div><div><div><div><div></div></div><div>Ser</div></div></div><div><div><div></div></div><div>Ala</div></div><div><div><div></div></div><div>Ileu</div></div><div><div><div></div></div><div>Phe</div></div><div><div><div></div></div><div>più di uno di quelli indicati</div></div></div></div>			<div><div><div><div><div><div></div></div><div>ponate, creme, gel, paste, cataplasmi, impiastri medicati</div></div></div><div><div><div></div></div><div>unguenti, creme, gel, paste, cataplasmi, impiastri medicati</div></div><div><div><div></div></div><div>unguenti, creme, gel, paste</div></div><div><div><div></div></div><div>unguenti, creme, gel, paste, schiume medicate</div></div><div><div><div></div></div><div>ponate, creme, gel, paste, schiume medicate</div></div></div></div>
Risposta esatta C			Risposta esatta B		
N°	194	Domanda Il subaciam avente la struttura indicata	N°	196	Domanda E' consentita la vendita di medicinali OTC tramite distributori automatici?
		<div><div><div><div><div><div></div></div><div>O</div></div><div><div><div></div></div><div>O</div></div><div><div><div></div></div><div>H</div></div></div><div><div><div></div></div><div>S</div></div><div><div><div></div></div><div>N</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>O</div></div><div><div><div></div></div><div>COOH</div></div></div></div>			<div><div><div><div><div><div></div></div><div>no, mai</div></div></div><div><div><div></div></div><div>si, sempre</div></div><div><div><div></div></div><div>si, purché la vendita avvenga sotto la responsabilità di un farmacista</div></div><div><div><div></div></div><div>si, ma solo nell'ambito di sperimentazioni sulla fornitura dei medicinali autorizzate dal Ministero della Salute</div></div><div><div><div></div></div><div>si, ma solo nell'ambito di porti, aeroporti e aree di servizio autostradali</div></div></div></div>
Risposta esatta C			Risposta esatta D		



N°	201	Domanda	Tra gli antipsicotici elencati, quello che produce i minori disturbi extrapiramidali è:		N°	203	Domanda	Le fenotiazine risultano efficaci nella	
			<div><input type="checkbox"/> A</div> l'aloپریدولو	<div><input type="checkbox"/> A</div> narcolessia					
			<div><input type="checkbox"/> B</div> la clozapina					<div><input type="checkbox"/> B</div> nevralgia del trigemino	
			<div><input type="checkbox"/> C</div> la flufenazina	<div><input type="checkbox"/> C</div> epilessia					
			<div><input type="checkbox"/> D</div> la trifluoperazina	<div><input type="checkbox"/> D</div> schizofrenia					
			<div><input type="checkbox"/> E</div> la pimozide	<div><input type="checkbox"/> E</div> parkinsonismo					
									Risposta esatta D


N°	202	Domanda	Quale dei seguenti farmaci antiulcera inibisce la secrezione acida bloccando irreversibilmente la pompa protonica delle cellule parietali?		N°	204	Domanda	La dose di cloroquina fosfato usata nella profilassi contro la malaria da Plasmodium falciparum è:	
			<div><input type="checkbox"/> A</div> famotidina	<div><input type="checkbox"/> A</div> 1000 mg/settimana					
			<div><input type="checkbox"/> B</div> sucralfato	<div><input type="checkbox"/> B</div> 1000 mg/die					
			<div><input type="checkbox"/> C</div> magaldrato	<div><input type="checkbox"/> C</div> 500 mg/settimana					
			<div><input type="checkbox"/> D</div> omeprazolo	<div><input type="checkbox"/> D</div> 500 mg/die					
			<div><input type="checkbox"/> E</div> cimetidina	<div><input type="checkbox"/> E</div> nessuna delle indicazioni					
									Risposta esatta C

N°	205	Domanda	E' consentita la consegna a domicilio di medicinali?	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	206	Domanda	Quale delle seguenti piante medicinali è utilizzata nell'insufficienza verosa?	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	207	Domanda	L'anestetico generale metossiflurano, chimicamente è:	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	208	Domanda	Quando il gruppo carbossilico delle aminopenicilline viene esterificato come nella bacampicillina avente la struttura sotto indicata, si ottengono penicilline	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>	Risposta esatta	B



N°	209	Domanda	NON volendo modificare il contenuto qualitativo dei cationi presenti in un formulato antiacido, con quale delle sostanze sotto indicate si può sostituire l'algedrato
		A	carbonato di calcio
		B	ossido di magnesio
		C	idrossido di alluminio
		D	magnaldrato
		E	trisilicato di magnesio
		Risposta esatta	C

N°	210	Domanda	L'ormone della crescita (GH) si somministra per
		A	os
		B	via endovenosa
		C	via intranasale
		D	via sottocutanea
		E	via intrachideea
		Risposta esatta	D

N°	211	Domanda	La nifedipina, avente la struttura indicata, è un farmaco usato nel trattamento
			
		A	dell'ulcera duodenale
		B	dell'angina pectoris
		C	della leucemia
		D	della cirrosi epatica
		E	della tubercolosi
		Risposta esatta	B

N°	212	Domanda	L'acqua da utilizzare per preparazioni semisolidi ad uso cutaneo non sterili secondo F.U. è:
		A	acqua conforme alla normativa prevista per l'acqua destinata al consumo umano
		B	acqua depurata ottenuta mediante distillazione, scambio ionico, osmosi inversa o qualsiasi altro metodo adeguato, a partire da acqua conforme al consumo umano
		C	acqua deionizzata ottenuta mediante distillazione a partire da acqua conforme al consumo umano
		D	acqua distillata ottenuta mediante scambio ionico a partire da acqua conforme al consumo umano
		E	tutte le indicazioni sono corrette
		Risposta esatta	B




N°	Domanda	213	Domanda	215	Domanda
N°	La preparazione di unguenti può avvenire per incorporazione meccanica a condizione che:		Quale delle seguenti proprietà, secondo la F.U., non è riferibile a compresse dispersibili:		
	<div><div>A</div>la base sia costituita da eccipienti tutti nel medesimo stato fisico</div>		<div><div>A</div>compresse non rivestite</div>		
	<div><div>B</div>la base sia costituita da eccipienti tutti a carattere lipofilo</div>		<div><div>B</div>compresse rivestite con film</div>		
	<div><div>C</div>la base presenti una struttura gelificata precostituita</div>		<div><div>C</div>destinate ad essere disperse in acqua prima della somministrazione dando una dispersione omogenea</div>		
	<div><div>D</div>la base sia costituita da eccipienti di origine vegetale</div>		<div><div>D</div>destinate ad essere disperse in acqua prima della somministrazione dando una soluzione limpida</div>		
	<div><div>E</div>il principio attivo si presenti allo stato solido</div>		<div><div>E</div>nessuna indicazione è corretta</div>		
	Risposta esatta C		Risposta esatta D		

N°	Domanda	214	Domanda	216	Domanda
N°	L'effetto inotropo positivo della digitale è principalmente dovuto a:		Una confezione di acido acetilsalilico 24 compresse da 500 mg copre 4 giorni di terapia. Qual è la DDD (Defined Daily Dose) dell'acido acetilsalilico?		
	<div><div>A</div>attivazione del rilascio di Ca2+ dai siti di deposito intracellulare</div>		<div><div>A</div>500 milligrammi</div>		
	<div><div>B</div>inibizione diretta dell'enzima di membrana Na+, K+-ATPasi</div>		<div><div>B</div>300 milligrammi</div>		
	<div><div>C</div>attivazione di canali di membrana per il Ca2+</div>		<div><div>C</div>12 grammi</div>		
	<div><div>D</div>blocco dello scambiatore Na+, Ca2+ di membrana</div>		<div><div>D</div>3 grammi</div>		
	<div><div>E</div>interazione del farmaco con le proteine contrattili citoplasmatiche</div>		<div><div>E</div>2 grammi</div>		
	Risposta esatta B		Risposta esatta D		




N°	217	Domanda	Il mannitolo è impiegato in terapia come	<div><div><input type="checkbox"/> A disinfectante urinario</div><div><input type="checkbox"/> B sostituto lacrimale</div><div><input type="checkbox"/> C sostituto del plasma</div><div><input type="checkbox"/> D diuretico osmotico</div><div><input type="checkbox"/> E antiossidante</div></div>	Risposta esatta	D
N°	219	Domanda	Il peso molecolare del solfato ferrico, avente la struttura indicata, è 400 mentre quello dell'acido solforico è 98. In quale degli intervalli indicati è compresa la percentuale di ferro elementare contenuta nel solfato ferrico?	<div><div><input type="checkbox"/> A 20 - 25</div><div><input type="checkbox"/> B 25 - 30</div><div><div>$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$</div><div><input type="checkbox"/> C 30 - 35</div><div><input type="checkbox"/> D 35 - 40</div><div><input type="checkbox"/> E 40 - 45</div></div></div>	Risposta esatta	B


N°	218	Domanda	La presenza di patologie può influenzare la sensibilità individuale agli effetti tossici di uno xenobiotico?	<div><div><input type="checkbox"/> A sì</div><div><input type="checkbox"/> B sì, ma solo nel caso in cui la patologia influenzi la cinetica dello xenobiotico</div><div><input type="checkbox"/> C sì, ma solo in soggetti anziani</div><div><input type="checkbox"/> D sì, ma solo nei bambini</div><div><input type="checkbox"/> E mai</div></div>	Risposta esatta	A
N°	220	Domanda	Il farmacista è tenuto ad annotare, sull'etichetta che appone sui recipienti dei medicinali galenici allestiti in farmacia la completa composizione?	<div><div><input type="checkbox"/> A sì, sempre</div><div><input type="checkbox"/> B no, solo sull'etichetta che appone sugli involucri</div><div><input type="checkbox"/> C sì, ma solo per le preparazioni contenenti medicinali ad azione stupefacente</div><div><input type="checkbox"/> D sì, ma solo se si tratta di medicinali vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica</div><div><input type="checkbox"/> E sì, ma solo se si tratta di medicinali vendibili solo dietro presentazione di RNR</div></div>	Risposta esatta	A



— 57 —

N°	225	Domanda Dovendo confrontare sali diversi di una medesima sostanza allo scopo di valutare la corrispondenza con le dosi massime stabilite dalla Farmacopea Ufficiale, quale delle seguenti Tabelle conviene consultare:	<div><div><div><div>A</div></div><div>le Tabelle N° 1 e 8</div></div><div><div>B</div><div>le Tabelle N° 3 e 8</div></div><div><div>C</div><div>le Tabelle N° 3 e 7</div></div><div><div>D</div><div>le Tabelle N° 2 e 4</div></div><div><div>E</div><div>nessuna delle combinazioni indicate</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	226	Domanda NON volendo modificare il contenuto qualitativo dei cationi presenti in un preparato antiacido, quale dei prodotti sotto indicati può costituire una possibile alternativa all'algedrato?	<div><div><div><div>A</div></div><div>MgO</div></div><div><div>B</div><div>Al(OH)₃</div></div><div><div>C</div><div>CaCO₃</div></div><div><div>D</div><div>Mg₂Si₃O₈</div></div><div><div>E</div><div>Al₂Mg₄(OH)₁₄</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	227	Domanda Possono essere venduti al pubblico medicinali per i quali sia intervenuto un provvedimento di sequestro?	<div><div><div><div>A</div></div><div>no, mai</div></div><div><div>B</div><div>sì, sempre</div></div><div><div>C</div><div>sì, purchè sia stato consentito lo smaltimento delle scorte</div></div><div><div>D</div><div>sì, purchè non sia stato contemporaneamente disposto anche il divieto di vendita</div></div><div><div>E</div><div>sì, purchè non sia stato contemporaneamente disposto anche il ritiro dal commercio</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	228	Domanda Quale delle seguenti affermazioni riguardanti medicinali di automedicazione prescritti dal medico è corretta? Il medico	<div><div><div><div>A</div></div><div>non può prescrivere in quanto può consigliare il farmacista</div></div><div><div>B</div><div>deve prescrivere nel caso in cui la prescrizione superi gli otto giorni di terapia</div></div><div><div>C</div><div>può prescrivere ogni volta che lo ritenga opportuno</div></div><div><div>D</div><div>è costretto a prescrivere ogni volta che lo richiede il paziente</div></div><div><div>E</div><div>non può prescrivere in quanto il paziente può sceglierli da solo</div></div></div>	Risposta esatta	C




N°	229	Domanda	Il minoxidil, farmaco vasodilatatore usato nel trattamento dell'ipertensione, agisce sulle cellule muscolari lisce inducendo	<div><div></div><div><div><input type="checkbox"/> A blocco dei canali del Ca2+ dipendenti dalla differenza di potenziale (VOC)</div><div><input type="checkbox"/> B attivazione dei canali del K+ modulati da ATP</div><div><input type="checkbox"/> C rilascio di ossido d'azoto dalle cellule endoteliali</div><div><input type="checkbox"/> D blocco del rilascio di Ca2+ dal reticolo endoplasmatico</div><div><input type="checkbox"/> E blocco dello scambiatore Na+, Ca2+ di membrana</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	230	Domanda	A chi competono i provvedimenti di autorizzazione al commercio dei medicinali ad uso umano?	<div><div><input type="checkbox"/> A al Ministero della Salute</div><div><input type="checkbox"/> B al Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze</div><div><input type="checkbox"/> C all'Agenzia Italiana del Farmaco</div><div><input type="checkbox"/> D alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</div><div><input type="checkbox"/> E sono disposizioni normative con atto finale del Presidente della Repubblica</div></div>	Risposta esatta	C
N°	231	Domanda	Quale dei seguenti prodotti viene impiegato per il trattamento delle pediculosi?	<div><div><input type="checkbox"/> A piretrine con piperonilbutoossido</div><div><input type="checkbox"/> B malathion</div><div><input type="checkbox"/> C lindano</div><div><input type="checkbox"/> D tutti i composti indicati</div><div><input type="checkbox"/> E soltanto due dei composti indicati</div></div>	Risposta esatta	D
N°	232	Domanda	Un medicinale contiene il destrometorfano associato alla doxilamina. Quale, tra le affermazioni riportate, è esatta?	<div><div><input type="checkbox"/> A il medicinale non contiene principi attivi analoghi alla codeina</div><div><input type="checkbox"/> B la doxilamina ha proprietà antistaminiche</div><div><input type="checkbox"/> C la doxilamina è un eccipiente che favorisce la formulazione</div><div><input type="checkbox"/> D il medicinale può essere dispensato in farmacia esclusivamente con ricetta non ripetibile</div><div><input type="checkbox"/> E più di una delle affermazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	B



N°	233	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni relative al butilidrossianisolo NON è corretta:		N°	235	Domanda	La vendita al pubblico di medicinali veterinari è consentita ai fabbricanti?	
			<div><div>A</div>è un antiossidante</div>					<div><div>A</div>no, mai</div>	
			<div><div>B</div>ha attività antimicrobica</div>					<div><div>B</div>sì, sempre</div>	
			<div><div>C</div>è stabile alla luce</div>					<div><div>C</div>sì, ma previa autorizzazione ministeriale</div>	
			<div><div>D</div>può essere impiegato in associazione con esteri dell'acido gallico</div>					<div><div>D</div>sì, solo solo a quelli di premiscela per alimenti medicamentosi, nei casi previsti dalla legge e previa autorizzazione della regione e della provincia autonoma o dagli organi da esse individuati</div>	
			<div><div>E</div>è incompatibile con ferro trivalente</div>					<div><div>E</div>no, salvo i casi di epidemie</div>	
				Risposta esatta C					Risposta esatta D
N°	234	Domanda	Preparati a base di soia (semi di <i>Glycine max</i> L.) e di trifoglio rosso (fiori di <i>Trifolium pratense</i> L.) sono utilizzati come fonti di fitoestrogeni. Tali principi chimicamente sono:		N°	236	Domanda	Gli impieghi di capitale vengono divisi essenzialmente in due gruppi. Quali sono?	
			<div><div>A</div>oli essenziali</div>					<div><div>A</div>attivo circolante e immobilizzazione</div>	
			<div><div>B</div>polisaccaridi</div>					<div><div>B</div>merci e attrezzature</div>	
			<div><div>C</div>alcaloidi</div>					<div><div>C</div>immobilizzazioni e merci</div>	
			<div><div>D</div>isoflavoni</div>					<div><div>D</div>immobilizzazioni e attrezzature</div>	
			<div><div>E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>					<div><div>E</div>nessuna indicazione è corretta</div>	
				Risposta esatta D					Risposta esatta A

N°	237	Domanda La vinblastina è un antitumorale che agisce:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>per alchilazione del DNA</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>interferendo con la formazione del fuso mitotico</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>inibendo la aromatasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>inibendo una topoisomerasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>con nessuno di questi meccanismi</div>	Risposta esatta	B
N°	239	Domanda Lo studio dei fattori che determinano le variazioni della concentrazione plasmatica di un farmaco nel tempo è definito:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>farmacodinamica</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>farmacologia</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>farmacogenetica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>farmacocinetica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta	D
N°	240	Domanda La tariffa nazionale dei medicinali prevede onorari per i consigli del farmacista sui medicinali?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>sì, per tutti i medicinali</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>sì, ma solo per i medicinali non assoggettati a ricetta medica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>sì, ma solo per i medicinali preparati dal farmacista in farmacia</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>no, ma il farmacista può comunque richiederli</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>no, e il farmacista non può comunque richiederli</div>	Risposta esatta	E
N°	238	Domanda Secondo la Farmacopea Ufficiale la droga "Psilico seme" è costituita dai semi di:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><i>passiflora incarnata</i> L.</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><i>myroxylon balsamum</i> L.</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><i>plantago afra</i> L. o <i>plantago indica</i> L.</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><i>polygala senega</i> L.</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuna delle specie indicate</div>	Risposta esatta	C




N°	241	Domanda	Il polimero PEG 400, usato come eccipiente, appartiene alla classe		N°	243	Domanda	Nel glaucoma ad angolo aperto è indicata	
			<div><div>A</div>dei pollesteri</div>					<div><div>A</div>atropina</div>	
			<div><div>B</div>dei poliadi</div>					<div><div>B</div>pilocarpina</div>	
			<div><div>C</div>delle poliammidi</div>					<div><div>C</div>fenilefrina</div>	
			<div><div>D</div>dei polieteri</div>					<div><div>D</div>scopolamina</div>	
			<div><div>E</div>degli idrocarburi</div>					<div><div>E</div>nessuna delle sostanze elencate</div>	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	B


N°	242	Domanda	La segnalazione spontanea di reazione avversa da farmaci deve essere inviata al Responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza:		N°	244	Domanda	Quale delle seguenti classi di farmaci può indurre un sindrome extrapiramidale di tipo parkinsoniano	
			<div><div>A</div>entro 3 giorni</div>					<div><div>A</div>inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina</div>	
			<div><div>B</div>entro 6 giorni</div>					<div><div>B</div>antipsicotici tipici</div>	
			<div><div>C</div>entro 15 giorni</div>					<div><div>C</div>beta-bloccanti</div>	
			<div><div>D</div>entro 30 giorni</div>					<div><div>D</div>benzodiazepine</div>	
			<div><div>E</div>tempestivamente</div>					<div><div>E</div>sali di litio</div>	
			Risposta esatta	E				Risposta esatta	B






N°	245	Domanda	La prierzepina, avente la struttura indicata, è un antagonista, relativamente selettivo, dei recettori muscarinici		
		<chem>CN1CCN(C1)CC(=O)N2C(=O)c3ccccc3N2c4cccnc4</chem>	<div><div>A</div>M1</div> <div><div>B</div>m2</div> <div><div>C</div>m3</div> <div><div>D</div>m4</div> <div><div>E</div>m5</div>		
				Risposta esatta	A
N°	247	Domanda	Il prefisso "nor" nel nome della noradrenalina sta ad indicare che questo composto, a confronto con l'adrenalina,		
		<div><div>A</div>contiene un gruppo ossidrilico in meno nella catena laterale</div> <div><div>B</div>contiene una unità carboniosa in meno nel nucleo aromatico</div> <div><div>C</div>ne rappresenta l'antipodo ottico</div> <div><div>D</div>non contiene il gruppo metilico sull'atomo di azoto</div> <div><div>E</div>contiene una unità carboniosa in più nel nucleo aromatico</div>		Risposta esatta	D
N°	248	Domanda	L'associazione eroina-cocaina viene indicata in gergo come		
		<div><div>A</div>"crack"</div> <div><div>B</div>pillola della pace</div> <div><div>C</div>"speed ball"</div> <div><div>D</div>droga dei ricchi</div> <div><div>E</div>panacea universale</div>		Risposta esatta	C
N°	246	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce la lincomicina, avente la struttura indicata?		
		<chem>CC[C@H]1CC[C@@H](C(=O)N[C@@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2OS(=O)(=O)C)[C@H]1N</chem>	<div><div>A</div>acidi nucleici della cellula batterica</div> <div><div>B</div>parete cellulare batterica</div> <div><div>C</div>metabolismo energetico della cellula batterica</div> <div><div>D</div>sintesi proteica ribosomiale</div> <div><div>E</div>membrana citoplasmatica</div>		
				Risposta esatta	D




N°	249	Domanda	Il principio attivo Lorazepam è:	<div><div><div>A</div></div><div>un tobarbiturico</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>un barbiturico</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>una benzozazepina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>una benzodiazepina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>una dibenzozazepina</div></div>	Risposta esatta	D
N°	250	Domanda	Un cittadino dell'Unione Europea chiede informazione in farmacia per conoscere quale specialità medicinale italiana è equivalente a quella in commercio nel suo Paese e che contiene un lassativo indicato nella classificazione ATC come A06AB04. Quale tra i principi attivi sotto riportati è più simile a quello richiesto?	<div><div><div>A</div></div><div>A06AA04</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>A06AB57</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>A06AB02</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>A07AA04</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>A07BA01</div></div>	Risposta esatta	C
N°	251	Domanda	Degli accoppiamenti sotto indicati qual è quello corretto?	<div><div><div>A</div></div><div>nifedipina - alfa-bloccante - antipertensivo</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>doxazosina - ACE-inibitore - antipertensivo</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>enalapril - beta-bloccante - antipertensivo</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>acebutololo - Diuretico - antipertensivo</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>amlodipina - Ca2+-antagonista - antipertensivo</div></div>	Risposta esatta	E
N°	252	Domanda	Quale, tra quelle seguenti, corrisponde in maniera più precisa alla definizione di tolleranza	<div><div><div>A</div></div><div>una diminuzione progressiva della risposta a un farmaco</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>un aumento rapido della risposta a un farmaco</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>un aumento della concentrazione del farmaco nel sito d'azione</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>una diminuita clearance del farmaco</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle definizioni indicate</div></div>	Risposta esatta	A

N°	253	<div>Domanda</div> <div>Il suxametonio, corrispondente alla struttura rappresentata, </div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>inibisce l'acetilcolinesterasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>stimola il rilascio di acetilcolina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si lega ai recettori nicotinici della placca motrice determinando depolarizzazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>compete come l'Acetilcolina sui recettori nicotinici della placca motrice senza depolarizzazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>stimola il rilascio di Ca++ dai depositi intracellulari innescando la contrazione</div></div>	<div>Risposta esatta</div> <div>C</div>
N°	255	<div>Domanda</div> <div>I farmaci possono essere somministrati attraverso molteplici vie. Quale di quelle sotto indicate presenta i maggiori inconvenienti nelle terapie con farmaci di natura peptidica</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>parenterale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>nasale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>rettale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>orale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>endovena</div></div>	<div>Risposta esatta</div> <div>D</div>
N°	254	<div>Domanda</div> <div>Quale delle affermazioni sottoriportate è corretta per la cimetidina?</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>rallenta il metabolismo epatico di alcuni farmaci</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>causa ginecomastia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>due delle risposte fornite sono corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>gli effetti collaterali sono irreversibili</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>presenta raramente effetti collaterali</div></div>	<div>Risposta esatta</div> <div>C</div>
N°	256	<div>Domanda</div> <div>Il fenomeno dell' "efflorescenza" è collegato</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>alla sublimazione dell'acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>all'evaporazione dell'acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>all'ebollizione dell'acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>alla formazione di miscele eutettiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>alla formazione di miscele azeotropiche</div></div>	<div>Risposta esatta</div> <div>B</div>




N°	257	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce l'aztreonam, avente la struttura indicata?
			
		<input type="radio"/> A acidi nucleici della cellula batterica <input type="radio"/> B membrana citoplasmatica <input type="radio"/> C parete cellulare batterica <input type="radio"/> D sintesi proteica ribosomiale <input type="radio"/> E metabolismo energetico della cellula batterica	Risposta esatta C
N°	258	Domanda	La terapia con estrogeni non deve essere associata alla somministrazione di:
		<input type="radio"/> A Solatolo <input type="radio"/> B Carvedilolo <input type="radio"/> C Pindolo <input type="radio"/> D Anastrozolo <input type="radio"/> E Melopridolo	Risposta esatta D
N°	259	Domanda	Quale dei seguenti farmaci agisce come agonista sui recettori alfa2 adrenergici?
		<input type="radio"/> A più di uno di quelli indicati <input type="radio"/> B clonidina <input type="radio"/> C prazosina <input type="radio"/> D cocaina <input type="radio"/> E propranololo	Risposta esatta B
N°	260	Domanda	La desipramina è una sostanza avente la formula indicata. La sua attività farmacologica principale è classificabile come
		 <input type="radio"/> A neurolettica <input type="radio"/> B antistaminica <input type="radio"/> C antidepressiva <input type="radio"/> D anoressante <input type="radio"/> E stimolatrice dell'appetito	Risposta esatta C


N°	261	Domanda	Il principio attivo captopril, riportato in struttura, è:
			
		A	un ACE inibitore
		B	appartiene alla classe delle diidropiridine
		C	è un bloccante dei canali del Ca ²⁺
		D	nessuna delle affermazioni riportate è corretta
		E	più di una delle affermazioni riportate è corretta
		Risposta esatta	A

N°	262	Domanda	Quale dei seguenti agenti può essere usato nel trattamento di infezioni micotiche sistemiche?
		A	Ampicillina sale di sodio
		B	Amfotericina B
		C	Ciclopross
		D	Tiosolfato di sodio
		E	Tetraciclina
		Risposta esatta	B


N°	263	Domanda	A quale principio attivo viene riferito il suffisso "cillina" nella Denominazione Comune? A quello a cui appartiene il principio attivo.
		A	ceftriaxone
		B	ottenibile dall'acido 6-amminopenicillanico
		C	avente la struttura indicata a lato
		D	cefalexina
		E	due delle indicazioni sono corrette
		Risposta esatta	B



N°	264	Domanda	L'adrenoam è attivo nei confronti di
		A	gram positivi aerobi
		B	gram positivi anaerobi
		C	gram negativi aerobi
		D	gram negativi anaerobi
		E	amebe
		Risposta esatta	C



N°	265	Domanda	La stimolazione dei recettori muscarinici determina	<div><div><div>A</div><div>tachicardia</div></div><div><div>B</div><div>sechezza delle fauci</div></div><div><div>C</div><div>miosi</div></div><div><div>D</div><div>difficoltà alla minzione</div></div><div><div>E</div><div>costipazione</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	267	Domanda	Quale tra i farmaci ricordati è il più efficace dilatatore dei vasi di resistenza e dei vasi di capacitance	<div><div><div>A</div><div>nifedipina</div></div><div><div>B</div><div>nitrati</div></div><div><div>C</div><div>enalapril</div></div><div><div>D</div><div>nitroprusiato di sodio</div></div><div><div>E</div><div>minoxidil</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	266	Domanda	L'esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera per la prosecuzione della terapia consente al farmacista la consegna di medicinali assoggettati a prescrizione medica senza presentazione di ricetta medica, in caso di necessità e urgenza, se la documentazione è stata emessa:	<div><div><div>A</div><div>da non più di una settimana</div></div><div><div>B</div><div>il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti</div></div><div><div>C</div><div>da non più di trenta giorni</div></div><div><div>D</div><div>il giorno di acquisto o nei tre giorni immediatamente precedenti</div></div><div><div>E</div><div>da non più di quindici giorni</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	268	Domanda	Gli antidepressivi tricyclici provocano nell'individuo sano:	<div><div><div>A</div><div>sensazione soggettiva piacevole</div></div><div><div>B</div><div>miglioramento dell'umore</div></div><div><div>C</div><div>sedazione soggettiva sgradevole</div></div><div><div>D</div><div>euforia</div></div><div><div>E</div><div>vivacità e interesse per l'ambiente</div></div></div>	Risposta esatta	C




N°	269	Domanda	Quattro in una preparazione galenica verusè prescritta la desossiedrina la cui struttura è riportata a lato, l'etichetta da apporre sul contenitore deve
		<chem>CN(C)Cc1ccccc1</chem>	
		A	riportare l'indicazione veleno
		B	riportare le proprietà farmacologiche della desossiedrina
		C	riportare che la preparazione possiede proprietà antistaminiche
		D	essere di opportuno colorei
		E	riportare la corretta indicazione della normativa a cui è soggetta la preparazione
		Risposta esatta	E
N°	270	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il suxametonio è corretta:
		A	interagisce con i recettori nicotinici del SNC
		B	interagisce con il recettore muscarinico
		C	è soggetto a veloce metabolismo ossidativo
		D	viene escreto immutato dall'organismo
		E	induce blocco neuromuscolare
		Risposta esatta	E
N°	271	Domanda	Gli inibitori selettivi dei reuptake neuronale della serotonina sono indicati nella terapia di
		A	parkinsonismo
		B	schizofrenia
		C	epllessia
		D	depressione
		E	fase maniacale della malattia bipolare
		Risposta esatta	D
N°	272	Domanda	I farmaci beta bloccanti possono essere usati come
		A	antipertensivi
		B	antileanginosi
		C	antiaritmici
		D	per tutte le attività indicate
		E	per una sola delle attività indicate
		Risposta esatta	D

N°	273	Domanda	Esiste l'obbligo per l'operatore sanitario di comunicare al Ministero della Salute gli incidenti che abbiano coinvolto dispositivi medico-diagnostici in vitro muniti di marcatura CE?	N°	275	Domanda	L'azione inotropica positiva della digossina deriva da
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>si, solo per gli operatori sanitari pubblici</div><div>si, solo per gli operatori sanitari privati</div><div>si, per gli operatori sanitari pubblici e privati</div><div>si, solo per i farmacisti</div><div>no, non esiste alcun obbligo</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>stimolo dell'ATPasi Na⁺, K⁺-dipendente</div><div>aumento dell'AMP ciclico</div><div>aumento della conduttanza al K⁺</div><div>stimolo dei recettori beta adrenergici</div><div>aumento della concentrazione di Ca²⁺ citosolico</div></div>
Risposta esatta C				Risposta esatta E			


N°	274	Domanda	Zanamivir agisce come:	N°	276	Domanda	Quale delle seguenti classi di sostanze non induce effetti lassativi?
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>anti HIV</div><div>antierpetico</div><div>anti HCV</div><div>antinfluenzale</div><div>anti RSV</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>antirachinoni</div><div>fibre solubili</div><div>tannini</div><div>fibre insolubili</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>
Risposta esatta D				Risposta esatta C			



N°	277	Domanda	Per tisana si intende una soluzione estrattiva ottenuta:	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>solo per decozione di una o più droghe</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>solo per infusione di una o più droghe</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>per decozione o infusione di una o più droghe</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>trattando una o più droghe con acqua fredda</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>per azione di etanolo a varie gradazioni su droghe</div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	279	Domanda	In un paziente affetto da glaucoma cui si manifesta un episodio di depressione grave, quale dei seguenti antidepressivi deve essere evitato?	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>Anifriptilina</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>Sertralina</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>Bupropione</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>Mirtazapina</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>Fluoxamina</div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	280	Domanda	Il buspirone, avente la struttura indicata, è un ansiolitico che agisce principalmente come	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>agonista parziale al sito per le benzodiazepine</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>agonista muscarinico</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>attivatore della mediazione GABA-ergica</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>agonista dei recettori 5-HT1A</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>bloccante dei recettori beta adrenergici</div></div></div></div></div><div><chem>C1CN(CCN(CCN1CCN2CCN(CCN2)CCN3CCCC3)CC(=O)N4CCCC4)CC(=O)N5CCCC5</chem></div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	278	Domanda	Molti sali di calcio trovano applicazione in terapia. Tra le sequenze di sali sotto indicate aventi i PM indicati quale è quella che esprime un contenuto crescente di calcio quando si somministrano quantità equiponderali dei sali indicati?	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>(II) - (I) - (III)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>(III) - (II) - (I)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>(I) - (II) - (III)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>(II) - (III) - (I)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>più di una di quelle indicate</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>(I)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>CaHPO₄</div></div><div>Fosfato dibasico PM= 136</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>(II)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>Ca(H₂PO₄)₂</div></div><div>Fosfato monobasico PM= 234</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>(III)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>Ca₃(PO₄)₂</div></div><div>Fosfato tribasico PM= 310</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	A




N°	281	Domanda	Cosa si intende per compliance?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>il grado di condiscendenza del paziente nei confronti della terapia prescrittagli</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div><div>la correttezza della posologia</div><div>la correttezza della via di somministrazione</div><div>la risposta del paziente alla terapia</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	283	Domanda	In quali forme farmaceutiche sono prodotti i medicinali oncopatici ?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>gocce, fiale orali, sciroppi</div><div>colliri</div><div>ponate e supposte</div><div>compresse</div><div>tutte quelle indicate</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	282	Domanda	La neostigmina è classificabile come farmaco	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>simpaticomimetico</div><div>simpaticolitico</div><div>parasimpaticomimetico</div><div>parasimpaticolitico</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	284	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi viene usato come immunosoppressore dopo un trapianto renale?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>Imatinib</div><div>carboplatino</div><div>ciclosporina</div><div>ifosfamide</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div>	Risposta esatta	C






N°	285	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi è un inibitore delle MAO?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>Noripipilina</div><div>Selegilina</div><div>Aloperidolo</div><div>Carbamazepina</div><div>Clorpromazina</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	286	Domanda	La cera bianca può essere utilizzata per:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>gellificare la fase continua di una crema idrofila</div><div>gellificare la fase continua di una crema idrofoba</div><div>emulsionare una fase acquosa per la costituzione di una base bifasica O/A</div><div>emulsionare una fase acquosa per la costituzione di una base bifasica A/O</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	287	Domanda	Può la farmacia detenere medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>no, mai</div><div>si, purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalla Regione</div><div>si, purché non il venda al pubblico</div><div>si, purché riceva specifica richiesta dallo specialista</div><div>si, purché sia stato prevista da apposita convenzione regionale</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	288	Domanda	I plasmi della malaria sono	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>batteri</div><div>virus</div><div>funghi</div><div>elminti</div><div>protozoi</div></div></div></div>	Risposta esatta	E




N°	289	Domanda Le criticità possibili che possono influenzare una corretta gestione commerciale di un magazzino di farmacia sono:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>eccessivo numero di pezzi scaduti</div><div>eccessivo numero di pezzi in resa</div><div>un numero consistente di materie prime scadute</div><div>presenza di eccessivi pezzi obsoleti</div><div>più di una risposta è corretta</div></div>	Risposta esatta	E
N°	291	Domanda Per quanto tempo il farmacista è tenuto a conservare gli originali delle ricette non ripetibili spedite in regime di Servizio Sanitario Nazionale?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>cinque anni</div><div>tre anni</div><div>non c'è obbligo di conservazione per queste ricette</div><div>sei mesi</div><div>tre mesi</div></div>	Risposta esatta	C
N°	292	Domanda Il mifepristone è utilizzato per porre termine a una gravidanza iniziale. Indicare quale dei seguenti effetti sfavorevoli è proprio di questo farmaco.	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>sanguinamento prolungato</div><div>vomitò</div><div>diarrea</div><div>tutti quelli indicati</div><div>tutti quelli indicati tranne uno</div></div>	Risposta esatta	D
N°	290	Domanda L'impiego dei farmaci antagonisti dei recettori beta adrenergici nell'angina pectoris è giustificato in quanto	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>risolvono la sintomatologia dolorosa durante l'attacco</div><div>risolvono gli spasmi dei vasi coronarici</div><div>hanno azione cronotropa e inotropia negativa</div><div>diminuiscono il tempo di perfusione coronarica</div><div>diminuiscono il ritorno venoso</div></div>	Risposta esatta	C



293	N°	Domanda	I messaggeri chimici si formano da sostanze che vengono immesse nell'organismo con la dieta. Dal triptofano, avente la struttura indicata, quale metabolita si forma?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div>Melatonina</div><div>Serotonina</div><div>Dopamina</div><div>Istamina</div><div>più di uno tra quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	E
294	N°	Domanda	Un pacemaker implantabile è:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div>un dispositivo medico implantabile non attivo;</div><div>un dispositivo medico in vitro;</div><div>un dispositivo medico implantabile attivo;</div><div>un dispositivo per indagini cliniche</div><div>un dispositivo su misura</div></div>	Risposta esatta	C
295	N°	Domanda	Nell'annotare il prezzo in etichetta apposta sul recipiente dei medicinali generici magistrali allestiti in farmacia, il farmacista è tenuto a specificare l'importo di ciascuna sostanza?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div>si, sempre</div><div>no, mai</div><div>si, ma solo se tra le sostanze è presente un veleno</div><div>no, è obbligatorio indicare solo l'importo complessivo del medicinale</div><div>nessuna delle indicazioni fornite</div></div>	Risposta esatta	B
296	N°	Domanda	La velocità di rilascio del farmaco da matrici rigonfiabili è controllato da:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div>velocità di penetrazione del liquido acquoso esterno al sistema</div><div>la velocità di rilassamento della matrice</div><div>le risposte A e B sono corrette</div><div>la velocità di dissoluzione della matrice</div><div>la velocità di disaggregazione della matrice</div></div>	Risposta esatta	C




N°	297	Domanda	Il principio attivo benserazide, indicato nella struttura, è utilizzato nella terapia antiparkinson in quanto è in grado di bloccare un particolare sistema enzimatico. Quale, tra quelli sotto elencati?		
					
		<input type="checkbox"/> A aldeide deidrogenasi	<input type="checkbox"/> B alcool deidrogenasi	<input type="checkbox"/> C MAO-B	<input type="checkbox"/> D nessuno di quelli indicati
		<input type="checkbox"/> E acetilcolinesterasi			
		Risposta esatta	D		

N°	298	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sulla clearance è FALSA?		
		<input type="checkbox"/> A consente di calcolare la concentrazione allo stato stazionario	<input type="checkbox"/> B e' un indice della capacità di eliminazione	<input type="checkbox"/> C misura la massa di xenobiotico eliminato	<input type="checkbox"/> D e' indipendente dalla concentrazione plasmatica
		<input type="checkbox"/> E e' inversamente proporzionale all'emivita			
		Risposta esatta	C		

N°	299	Domanda	Sono neuroletici:		
		<input type="checkbox"/> A le idantoine	<input type="checkbox"/> B le benzodiazepine	<input type="checkbox"/> C i butirfenoni	<input type="checkbox"/> D le melikantline
		<input type="checkbox"/> E le amfetamine			
		Risposta esatta	C		

N°	300	Domanda	Il termine "compliance", comunemente indicato nella pratica terapeutica, riguarda principalmente il comportamento		
		<input type="checkbox"/> A del medico	<input type="checkbox"/> B dell'infermiere	<input type="checkbox"/> C del farmacista	<input type="checkbox"/> D del paziente
		<input type="checkbox"/> E dei parenti del paziente			
		Risposta esatta	D		



N°	301	Domanda	Le benzodiazepine interagiscono a livello della neurotrasmissione
		A	dopaminergica
		B	adrenergica
		C	gabaergica
		D	serotoninergica
		E	istaminergica
		Risposta esatta	C

N°	302	Domanda	La diclofenina, avente la struttura chimica indicata, svolge azione adiuvante di natura:
		A	lassativa
		B	anestetica locale
		C	procinetica
		D	spasmolitica
		E	antimetetorica
		Risposta esatta	D

N°	303	Domanda	La carbidopa, avente la struttura indicata, è usata nella terapia del Parkinson in quanto
		A	riduce il catabolismo della dopamina cerebrale
		B	inibisce a livello periferico la trasformazione della levodopa in dopamina
		C	inibisce il reuptake neuronale della dopamina cerebrale
		D	attiva i recettori dopaminergici D2
		E	aumenta la liberazione di dopamina
		Risposta esatta	B

N°	304	Domanda	Le curve dose-risposta il cui tratto "lineare" viene a costituire un insieme di rette parallele sul piano x-y sono maggiormente probabili quando i farmaci hanno
		A	struttura diversa
		B	diversa disponibilità farmaceutica
		C	uguale biodisponibilità
		D	solubilità diversa
		E	lo stesso meccanismo d'azione
		Risposta esatta	E


N°	305	Domanda	Può il farmacista associare altro sanitario agli utili della farmacia?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>si, sempre</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>no, mai</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>si, purchè non al fine di agevolare la diffusione di medicinali</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>si, purchè ciò non danneggi altre farmacie</div></div>
----	-----	---------	--	---


☐


E

☐


si, purchè si tratti di altro farmacista




N°	309	Domanda	Una miscela ana partes di alcol cellico e alcol stearilico può essere utilizzata per:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>garantire la qualità microbiologica della fase acquosa di una crema idrofila</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>garantire la gelificazione della fase continua di una crema idrofila</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>garantire la qualità microbiologica della fase acquosa di una crema idrofoba</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>garantire la gelificazione di un gelo idrofilo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>		Risposta esatta	B
N°	310	Domanda	Il perossido di benzole idrato deve essere conservato:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>in contenitore senza essiccante, con rilascio di sovrappressione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>in contenitore a tenuta d'aria, protetto dalla luce</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>in contenitore ben chiuso, protetto dalla luce</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sotto azoto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>in contenitore con essiccante</div></div>		Risposta esatta	A
N°	311	Domanda	Indicare a quale delle seguenti categorie di farmaci appartengono la nafazolina e la xilometazolina avente la struttura indicata	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antipertensivi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>decongestionanti nasali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>uricosurici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tocolici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>anoressizzanti centrali</div></div>		Risposta esatta	B
N°	312	Domanda	Ogni quanti anni viene rinnovata un'autorizzazione all'immissione in commercio?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ogni 5 anni indipendentemente da quante volte è stata rinnovata</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dopo 5 anni dalla prima autorizzazione e poi l'autorizzazione ha validità illimitata, salvo che l'AIFA decida di procedere a un ulteriore rinnovo di durata quinquennale,</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ogni dieci anni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ogni 5 anni per due volte e poi l'autorizzazione ha validità illimitata.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>		Risposta esatta	B



N°	313	Domanda	Il processo di "levigazione" è fondamentale per	<div><div><div>A</div></div><div>le pomate di medicinali liposolubili</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>le emulsioni di oli insolubili in acqua</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>le soluzioni acquose</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>le pomate di medicinali insolubili nel veicolo</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>più di uno dei casi indicati</div></div>	Risposta esatta	D
N°	315	Domanda	Quale, tra le sostanze sotto indicate, presenta come effetto farmacologico collaterale l'insulismo?	<div><div><div>A</div></div><div>minoxidil</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>fenobarbital</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>fenitoina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>nessuna tra quelle indicate</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>più di una tra quelle indicate</div></div>	Risposta esatta	E
N°	314	Domanda	Quanti sono i principi del sistema HACCP?	<div><div><div>A</div></div><div>cinque</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>sei</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>sette</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>quattro</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>otto</div></div>	Risposta esatta	C
N°	316	Domanda	L'acidificazione dell'urina diminuisce l'eliminazione dei farmaci a carattere acido	<div><div><div>A</div></div><div>diminuendone la lipofilia</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>inibendone la secrezione tubulare attiva</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>diminuendo il riassorbimento tubulare per diffusione passiva</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>aumentandone il riassorbimento tubulare attivo</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>diminuendone la ionizzazione</div></div>	Risposta esatta	E



N°	317	Domanda Gli occhiali premontati per la correzione della presbiopia di 2 diottrie, in vendita presso farmacie, supermercati, ottici ed altri esercizi commerciali, normalmente sono:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>dispositivi medici su misura</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dispositivi medici di classe I</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>dispositivi di protezione individuale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dispositivi medici attivi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>dispositivi diagnostici in vitro</div></div>	Risposta esatta B
N°	319	Domanda L'assorbimento di levodopa, somministrata per os, avviene per	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>flusso di massa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>diffusione semplice</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>trasporto mediato da carrier</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>pincilosi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>coppia ionica</div></div>	Risposta esatta C
N°	320	Domanda Quale delle seguenti famiglie di principi attivi riconducibili agli oppioidi può essere ricollegata strutturalmente alla morfina?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>benzomorfini</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>morfina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>fenilpiperidine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>fenilpropilammine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte quelle indicate</div></div>	Risposta esatta E




N°	321	Domanda	Qual è la corretta definizione degli omeopati?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>rimedi omeopatici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>medicinali omeopatici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>preparazioni vegetali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>fitoterapici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le definizioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	B
N°	322	Domanda	Qual è l'impiego terapeutico del ciclopiptoloato avente la struttura indicata?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antimuscarinico per uso oftalmico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antipertensivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>miorellassante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antipsicotico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di una delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	A
N°	323	Domanda	La flecainide, avente la struttura indicata, è un principio attivo utilizzato come	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antianginoso</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antiaritmico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>anestetico locale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>stimolante del SNC</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>deprimente del SNC</div></div>	Risposta esatta	B
N°	324	Domanda	Il meccanismo d'azione dei clofibrati prevede il loro legame	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>alle proteine che legano le penicilline (PBP)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>alla 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) riduttasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>all'acido urico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ai recettori attivati dall'enzima di proliferazione del perossisoma (PPARs)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ai recettori istaminergici H2</div></div>	Risposta esatta	D



N°	325	Domanda	Quale dei seguenti agenti chemioterapici può produrre citite emorragica?	<div><div><div>A</div></div><div>clorochina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>bleomicina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>doxorubicina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>ciclofosfamide</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>tutti i composti citati</div></div>	Risposta esatta	D
N°	327	Domanda	A quale tipo di antibiotici potrebbe essere attribuito un composto avente la struttura indicata?	<div><div><div>A</div></div><div>Tetraciclina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Macrolidici</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Ansamiche</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Pollerici</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Cefalosporine</div></div>	Risposta esatta	D
N°	328	Domanda	E' inclusa nei Livelli Essenziali d'Assistenza l'erogazione di prodotti dietetici destinati a soggetti affetti da:	<div><div><div>A</div></div><div>celiachia</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>fibrosi cistica</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>malattie metaboliche congenite</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>nessuna delle patologie indicate</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni fornite</div></div>	Risposta esatta	E


N°	329	Domanda	Nella formulazione di un cosmetico è ammesso l'impiego di qualsiasi colorante?		N°	331	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la vendita in farmacia degli occhiali premontati è corretta?	
			<div><div>A</div> sì, purché sicuro</div>					<div><div>A</div> non potrebbero essere venduti</div>	
			<div><div>B</div> no, solo quelli riportati nell'Aliv della Legge 713/86 e successive modifiche</div>					<div><div>B</div> possono essere venduti solo quelli per la correzione del difetto semplice della presbiopia</div>	
			<div><div>C</div> Solo quelli alimentari</div>					<div><div>C</div> possono essere venduti solo quelli per la correzione del difetto semplice della miopia</div>	
			<div><div>D</div> Solo quelli utilizzati nei farmaci</div>					<div><div>D</div> possono essere venduti solo quelli per la correzione del difetto semplice dell'ipermetropia</div>	
			<div><div>E</div> nessuna delle indicazioni è corretta</div>					<div><div>E</div> e' possibile venderli solo in presenza di un ottico diplomato</div>	
									Risposta esatta B

N°	330	Domanda	La ciclosporina, quando destinata alle preparazioni farmaceutiche per somministrazione parenterale, dovrà soddisfare		N°	332	Domanda	La dizione della F.U. "a bagnomaria", in assenza di altre indicazioni, si riferisce alla temperatura:	
			<div><div>A</div> a un più basso limite di impurezze</div>					<div><div>A</div> ambiente</div>	
			<div><div>B</div> a un più basso limite di metalli pesanti</div>					<div><div>B</div> di 37°</div>	
			<div><div>C</div> al saggio di sterilità e a un più basso limite di metalli pesanti</div>					<div><div>C</div> nell'intervallo di 25°-45°</div>	
			<div><div>D</div> al saggio di sterilità ed al limite per le endotossine batteriche</div>					<div><div>D</div> di 80°</div>	
			<div><div>E</div> ad altri saggi</div>					<div><div>E</div> dell' acqua bollente</div>	
									Risposta esatta D



N°	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
333	I principi attivi di un medicinale sono: paracetamolo, fenilpropanolamina e clorfenamina. Tra i vari principi attivi sono presenti	335	Le creme sono definite dalla F.U. come	A preparazioni semisolide multifase costituite da una fase acquosa e da una fase lipofila	A
	<input type="checkbox"/> A antipiretici			B preparazioni semisolide che contengono disperse polveri in grandi proporzioni	B
	<input type="checkbox"/> B nootropici			C preparazioni costituite da liquidi gelificati per mezzo di opportuni gelificanti	C
	<input type="checkbox"/> C antibatterici			D preparazioni semisolide costituite da una base monofasica in cui possono essere disperse sostanze solide o liquide	D
	<input type="checkbox"/> D antimuscarinici			E più di una definizione è corretta	E
	<input type="checkbox"/> E antivirali				

N°	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
334	Quale tra le sostanze elencate non è una fibra alimentare?	336	Indicare quale dei seguenti gruppi di farmaci diuretici appartiene alla categoria degli inibitori del simporto Na ⁺ , K ⁺ , 2Cl ⁻ (diuretici dell'ansa)	A acetazolamide, diclofenamide, metazolamide	B
	<input type="checkbox"/> A inulina			B furosemide, acido etacrinico, torasemide	C
	<input type="checkbox"/> B cellulosa			C glicerolo, isosorbide, mannitolo, urea	D
	<input type="checkbox"/> C galattomannano			D benzotiazide, clortalidone, idroclorotiazide	E
	<input type="checkbox"/> D amido			E amiloride, triamterene, spironolattone, canrenone	
	<input type="checkbox"/> E glucomannano				






N°	337	Domanda	Quale dei farmaci sotto riportati è più indicato nell'avvelenamento da esteri fosforici
		A	fisostigmina
		B	propranololo
		C	pilocarpina
		D	atropina
		E	galantamina
		Risposta esatta	D

N°	338	Domanda	La nicotina, avente la struttura indicata, induce
		A	stimolo della trasmissione gangliare
		B	stimolo diretto dei recettori beta adrenergici cardiaci
		C	antagonismo dei recettori muscarinici
		D	stimolo dei recettori α adrenergici
		E	azione atropinosimile
		Risposta esatta	A

N°	339	Domanda	La neostigmina, corrispondente alla struttura riportata, interviene nella trasmissione neuromuscolare
		A	inibendo l'acetilcolinesterasi irreversibilmente
		B	stimolando il rilascio di acetilcolina
		C	agendo sui recettori nicotinici
		D	inibendo l'acetilcolinesterasi reversibilmente
		E	agendo sui recettori muscarinici
		Risposta esatta	D


N°	340	Domanda	Quale tra quelli elencati può essere il farmaco di elezione nella terapia della gonorrea
		A	streptomicina
		B	kanamicina
		C	neomicina
		D	ceftriaxone
		E	gentamicina
		Risposta esatta	D



N°	341	Domanda	Quale delle coppie indicate di aminoacidi, riportati in struttura, appartiene alla categoria dei così detti "aminoacidi ramificati" (BCAA)?		
		<div><div></div><div></div></div> <div><div>(I) ALANINA</div><div>(II) VALINA</div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div>(III) LEUCINA</div><div>(IV) LEUCINA</div></div>	<div><input type="radio"/> A alanina(I) e valina (II)</div> <div><input type="radio"/> B alanina (I) e leucina (III)</div> <div><input type="radio"/> C leucina (III) e prolina (IV)</div> <div><input type="radio"/> D valina (II) e prolina (IV)</div> <div><input type="radio"/> E nessuna delle coppie indicate</div>	Risposta esatta	C
N°	342	Domanda	Il Letrozolo è un farmaco che agisce:		
		<div><input type="radio"/> A inibendo i recettori alfa adrenergici</div> <div><input type="radio"/> B inibendo i recettori beta adrenergici</div> <div><input type="radio"/> C inibendo la aromatasi</div> <div><input type="radio"/> D inibendo le chinas</div> <div><input type="radio"/> E nessuno di questi meccanismi è vero</div>	Risposta esatta	A	
N°	343	Domanda	Il sucralfato viene utilizzato come antiulcera. Volendo mantenere inalterato il meccanismo d'azione con quale delle sostanze sotto indicate potrebbe essere sostituito?		
		<div><input type="radio"/> A misoprostolo</div> <div><input type="radio"/> B nizatidina</div> <div><input type="radio"/> C magaldrato</div> <div><input type="radio"/> D omeprazolo</div> <div><input type="radio"/> E nessuna di quelle indicate</div>	Risposta esatta	E	
N°	344	Domanda	Si definisce eliminazione pre-sistemica:		
		<div><input type="radio"/> A il processo di eliminazione del farmaco dopo la sua somministrazione ma prima dell'entrata nella circolazione sistemica</div> <div><input type="radio"/> B l'eliminazione del farmaco secondo una cinetica di primo ordine</div> <div><input type="radio"/> C l'eliminazione del farmaco secondo una cinetica di ordine zero</div> <div><input type="radio"/> D la biotrasformazione del farmaco</div> <div><input type="radio"/> E l'escrezione biliare del farmaco</div>	Risposta esatta	A	



N°	345	Domanda	L'assunzione contemporanea di statine e fibrati aumenta il rischio di:
		<input type="radio"/> A	cefalea
		<input type="radio"/> B	miopia
		<input type="radio"/> C	reazioni d'ipersensibilità
		<input type="radio"/> D	eczema
		<input type="radio"/> E	tachicardia
		Risposta esatta B	

N°	346	Domanda	Quale, tra gli aminoacidi elencati e riportati in struttura, appartiene alla categoria dei cosiddetti "amminoacidi ramificati" (BCAA)
		 <p>(I) HISTIDINA (II) GLICINA (III) CISTEINA (IV) ISOLEUCINA</p>	
		<input type="radio"/> A	isoleucina (IV)
		<input type="radio"/> B	istidina (I)
		<input type="radio"/> C	glicina (II)
		<input type="radio"/> D	cisteina (III)
		<input type="radio"/> E	nessuno di quelli indicati
		Risposta esatta A	

N°	347	Domanda	Un antagonista funzionale è un farmaco che
		<input type="radio"/> A	si lega al recettore in un sito di legame diverso da quello dell'agonista
		<input type="radio"/> B	possiede un effetto biologico opposto a quello dell' agonista e ne riduce l'effetto agendo su un recettore diverso su cui si comporta da agonista
		<input type="radio"/> C	si lega al recettore nello stesso sito di legame dell'agonista
		<input type="radio"/> D	pur legandosi al recettore, è incapace di produrre un effetto
		<input type="radio"/> E	è in grado di produrre un effetto
		Risposta esatta B	


N°	348	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti NON è correlata con la somministrazione di diuretici inibitori dell'anidrasi carbonica?
		<input type="radio"/> A	glaucoma ad angolo aperto
		<input type="radio"/> B	alcalosi metaboliche
		<input type="radio"/> C	malattia da alta quota
		<input type="radio"/> D	possibile coadiuvante nel trattamento di epilessie
		<input type="radio"/> E	cirrosi epatica
		Risposta esatta E	



349	N°	Domanda	Un paziente in terapia con eparina deve fare particolare attenzione quando assume	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>propranololo</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>pindololo</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>cloramfenicolo</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>acenocumarolo</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>allopurinolo</div></div>	Risposta esatta	D
-----	----	---------	---	--	-----------------	---


350	N°	Domanda	Il certificato di analisi, di una materia prima, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore, deve riportare:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>il simbolo di pericolo della sostanza</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>la rispondenza ai requisiti di farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e manipolazione</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>solo il titolo e le modalità di conservazione</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>solo le specifiche di qualità riportate nelle monografie della FU</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>le modalità di smaltimento</div></div>	Risposta esatta	B
-----	----	---------	--	--	-----------------	---

351	N°	Domanda	Tra gli antipsicotici atipici vi è il principio attivo risperidone, avente la struttura indicata. Gli scarsi effetti extrapiramidali di tale sostanza possono trovare una giustificazione nella sua	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>azione di blocco dei recettori D2 dell'area limbica</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>scarsa attività parasimpaticomimetica</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>disinibizione della trasmissione dopaminergica nello striato</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>incapacità di inibire il reuptake della noradrenalina</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>bassa affinità per i recettori 5-HT2</div></div>	Risposta esatta	C
-----	----	---------	---	---	-----------------	---





352	N°	Domanda	può il farmacista in farmacia importare medicinali provenienti da Paesi membri dell'Unione Europea, non autorizzati all'immissione in commercio in Italia?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>sì, purché sia fornito di autorizzazione ministeriale</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>sì, sempre</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>no, mai</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>sì, purché si tratti di medicinali destinati a malati determinati, clienti della farmacia</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>sì, purché manchi il corrispondente medicinale autorizzato in Italia</div></div>	Risposta esatta	C
-----	----	---------	--	---	-----------------	---

N°	353	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sulle Tinture Madri (TM) è corretta:				
			<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><div>contengono concentrazioni omeopatiche di droga di partenza</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><div>sono sempre ottenute da droga secca</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><div>la loro concentrazione è di 1 parte di droga, calcolata disidratata, in 10 parti di TM</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><div>si ottengono solo da droghe di origine vegetale</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div><div><div>hanno grado alcolico inferiore a 45°</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
						Risposta esatta	C
N°	354	Domanda	La lidocaina, che corrisponde alla struttura indicata, ha azione anestetica locale in quanto				
			<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><div>agisce sui canali K⁺</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><div>blocca i canali del Ca²⁺</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><div>blocca i canali del Na⁺ nello stato di attivazione</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><div>attiva i canali del Na⁺ nello stato di inattivazione</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div><div><div>attiva i canali del Na⁺ nello stato di riposo</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
						Risposta esatta	C
N°	355	Domanda	L'acido 5-amminosalicilico, avente la struttura indicata, si usa esclusivamente				
			<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><div>per i suoi effetti locali nel trattamento delle malattie infiammatorie intestinali</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><div>per applicazioni locali come cheratolitico</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><div>come profarmaco nella terapia antinfiammatoria intestinale</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><div>per la sua azione sulla flora batterica del colon</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div><div><div>per via sistemica, nella profilassi della trombosi</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
						Risposta esatta	A
N°	356	Domanda	A quale principio attivo si riferisce la struttura riportata della p-idrossiacetanilide?				
			<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><div>paracetamolo</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><div>ketorolac</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><div>acido acetilsalilico</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><div>ibuprofen</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div><div><div>indometacina</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
						Risposta esatta	A



N°	357	Domanda	Che cosa indica la tabella n.6 della Farmacopea Ufficiale?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>le sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave</div><div>gli stupefacenti</div><div>i medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente</div><div>i medicinali da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica</div><div>gli apparecchi e gli utensili obbligatori in farmacia</div></div>	Risposta esatta	E
N°	359	Domanda	Il tiamfenicolo oltre ad un gruppo dicloroacetamidico, presenta sull'anello aromatico un gruppo:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>-NO</div><div>-OH</div><div>-SO₂CH₃</div><div>-CH₃</div><div>-NH₂</div></div>	Risposta esatta	C
N°	360	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le relazioni struttura-attività nel campo delle 4-amminochinoline come la clorochina NON è corretta?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>la clorochina viene utilizzato solo l'enantiomero R</div><div>la catena in posizione 4 può contenere anche anelli aromatici</div><div>l'azoto terminale della catena in 4 deve essere preferibilmente dietil sostituito</div><div>la clorochina viene utilizzata come miscela racemica</div><div>la presenza in posizione 7 del cloro aumenta l'attività</div></div>	Risposta esatta	A





N°	365	Domanda	Farmaci come l'eritromicina e l'azitromicina prolungano l'intervallo QT con il rischio di sviluppare:	<div><div>A</div>flutter atriale</div> <div><div>B</div>fibrillazione atriale</div> <div><div>C</div>aritmie ventricolari</div> <div><div>D</div>tachicardia parossistica sopraventricolare</div> <div><div>E</div>nessuna delle indicazioni</div>	Risposta esatta	C
N°	367	Domanda	L'uso di nalazolina in pazienti pediatrici è controindicato per il rischio di effetti avversi:	<div><div>A</div>gastrointestinali</div> <div><div>B</div>a carico del sistema nervoso centrale</div> <div><div>C</div>a livello renale</div> <div><div>D</div>a livello epatico</div> <div><div>E</div>a livello ematico</div>	Risposta esatta	B
N°	366	Domanda	Degli accoppiamenti sotto indicati, qual è quello corretto riguardante l'enalapril	<div><div>A</div>alfa2-bloccante - Antipertensivo</div> <div><div>B</div>antipertensivo - ACE-inibitore</div> <div><div>C</div>tiazide - Diuretico</div> <div><div>D</div>diuretico - ACE-inibitore</div> <div><div>E</div>antipertensivo - Ca2-bloccante</div>	Risposta esatta	B
N°	368	Domanda	Qual è l'indicazione terapeutica del sistema transdermico contenente scopolamina?	<div><div>A</div>antianginoso</div> <div><div>B</div>estrogeno</div> <div><div>C</div>anticinetico</div> <div><div>D</div>antipertensivo</div> <div><div>E</div>ipoglicemico</div>	Risposta esatta	C




N°	369	Domanda	La carbossimetilcellulosa sodica viene impiegata in numerose preparazioni per uso orale o topico. Quale, tra quelle indicate, è una affermazione errata?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ha impiego come legante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ha impiego come viscosizzante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>non assorbe acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ha impiego come sospendente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ha impiego come disaggregante</div></div>	Risposta esatta	C
N°	371	Domanda	Quale tra i farmaci elencati è impiegato per la sua azione fibrinolitica	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>acido aminocaprolico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dipiridamolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>attivatore tissutale del plasminogeno</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>acido acetilsalicilico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ticlopidina</div></div>	Risposta esatta	C

N°	370	Domanda	Il farmacista è tenuto a segnalare reazioni avverse da farmaci, mediante la scheda Ministeriale di segnalazione spontanea degli eventi avversi	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>quando si tratti di medicinali non soggetti a prescrizione medica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>quando si tratti di vaccini</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>quando si tratti di medicinali da banco (OTC)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>in tutti i casi di cui venga a conoscenza</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>quando si tratti di farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP)</div></div>	Risposta esatta	D
N°	372	Domanda	Il principio attivo ketoprofen, avente la struttura indicata, presenta	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un atomo di carbonio asimmetrico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>due atomi di carbonio asimmetrici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tre atomi di carbonio asimmetrici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nessun atomo di carbonio asimmetrico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>isomeria cis-trans</div></div>	Risposta esatta	A



N°	373	Domanda	Di quale colore deve essere il camice che i farmacisti sono obbligati a indossare nell'attività professionale al pubblico?	<div><div>A</div><div>non è obbligatorio indossare un camice</div></div> <div><div>B</div><div>il colore è liberamente scelto dal titolare della farmacia, purché adeguato al decoro professionale</div></div> <div><div>C</div><div>dipende dall'ambito in cui il farmacista opera</div></div> <div><div>D</div><div>di qualsiasi colore, purché recchi ben visibile l'indicazione della qualifica di farmacista</div></div> <div><div>E</div><div>sempre bianco</div></div>	Risposta esatta	E
N°	375	Domanda	L'Autorità Competente in materia di dispositivi medico-diagnostici in vitro è:	<div><div>A</div><div>il Ministero della Salute</div></div> <div><div>B</div><div>il Ministero della Salute, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico</div></div> <div><div>C</div><div>l'Istituto Superiore di Sanità</div></div> <div><div>D</div><div>il Ministero dello Sviluppo Economico</div></div> <div><div>E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	B
N°	376	Domanda	L'amiodarone, un antiaritmico avente la struttura indicata può produrre gli effetti indesiderati riportati ad ECCEZIONE di	<div><div>A</div><div>insulsismo</div></div> <div><div>B</div><div>fibrosi polmonare</div></div> <div><div>C</div><div>tremore</div></div> <div><div>D</div><div>alterata funzione tiroidea</div></div> <div><div>E</div><div>depositi corneali</div></div>	Risposta esatta	A

L'amiodarone, un antiaritmico avente la struttura indicata può produrre gli effetti indesiderati riportati ad ECCEZIONE di



Una delle classificazioni molto utilizzate nel settore delle cefalosporine è quella che si riferisce alle successive "generazioni" degli antibiotici appartenenti alla classe. Quale delle indicazioni sotto riportate è corretta? Le cefalosporine

- A

di prima generazione sono attive principalmente sui batteri Gram-negativi
- B

di seconda generazione sono attive principalmente sui batteri Gram-positivi
- C


di terza generazione presentano una buona resistenza alle beta-lattamasi
- D


di seconda generazione sono attive contro la Pseudomonas
- E

le indicazioni fornite sono tutte errate

Risposta esatta C






N°	377	Domanda Quale tra i farmaci antimicrobici seguenti riesce a provocare modificazioni del metabolismo energetico della cellula batterica.	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>trimetoprim</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dapsone</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>nitroimidazoli</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>penicilline</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di uno tra quelli indicati</div></div>	Risposta esatta E
N°	379	Domanda Quali elementi strutturali idrolizzabili impartiscono al bitolterolo, avente la struttura indicata, la funzione di profarmaco	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>la funzione alcolica secondaria libera</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>il gruppo amminico secondario</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>la contemporanea presenza di tre residui benzenici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>le funzioni esteree nelle posizioni 3 e 4 della struttura catecolica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le caratteristiche indicate</div></div>	<div></div> Risposta esatta D
N°	380	Domanda Come deve compiersi la chiusura quinquennale del registro entrata e uscita stupefacenti?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>annullando tutti gli spazi vuoti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>annunciando i dati riassuntivi di entrate, uscite e giacenze</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>annotando le sole giacenze</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la chiusura non è quinquennale, ma trimestrale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>la chiusura non è quinquennale, ma annuale</div></div>	Risposta esatta E
N°	378	Domanda Cosa deve obbligatoriamente fare, entro 24 ore, il farmacista in caso di perdita, smarrimento o sottrazione del registro di entrata e uscita stupefacenti?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Avvertire la A.S.L. di competenza, che provvederà a fare denuncia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>procurarsi un nuovo registro senza preoccuparsi di altre formalità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Fare denuncia alla Procura della Repubblica e darne comunicazione alla A.S.L.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>richiedere apposito accertamento ispettivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>fare denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e darne comunicazione all'Autorità sanitaria locale di competenza</div></div>	Risposta esatta E




N°	381	Domanda	I nucleosidi fosfonati agiscono come:	<div><div>A</div>antibatterici</div> <div><div>B</div>antivirali</div> <div><div>C</div>anticancro</div> <div><div>D</div>antipertensivi</div> <div><div>E</div>antitussivi</div>	Risposta esatta	B
N°	383	Domanda	Quale, tra i farmaci antimicrobici seguenti, agisce a livello ribosomiale inibendo la sintesi proteica ?	<div><div>A</div>cefalosporine</div> <div><div>B</div>polimixine</div> <div><div>C</div>macrolidi</div> <div><div>D</div>dapsone</div> <div><div>E</div>nessuno di quelli indicati</div>	Risposta esatta	C

N°	382	Domanda	Quale è l'attività farmacologica più rilevante che può essere ipotizzata per il ketofene, avente la struttura indicata?	<div><div>A</div>anticonvulsivante</div> <div><div>B</div>antimicotica</div> <div><div>C</div>colinergica</div> <div><div>D</div>antistaminica - H1</div> <div><div>E</div>antimuscarinica</div>	Risposta esatta	D
N°	384	Domanda	L'uso di preparati a base di ibuprofene in associazione a farmaci come il clopidogrel può esporre a rischio di:	<div><div>A</div>insufficienza renale</div> <div><div>B</div>crisi convulsive</div> <div><div>C</div>perdita dell'efficacia dell'ibuprofene</div> <div><div>D</div>sanguinamento</div> <div><div>E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta	D




N°	385	Domanda	Le due strutture sotto riportate rappresentano					
								
			<div><div>A</div>due isomeri geometrici</div> <div><div>B</div>due enantiomeri</div> <div><div>C</div>due diastereoisomeri</div> <div><div>D</div>due bolsotteri</div> <div><div>E</div>lo stesso composto</div>					
				Risposta esatta	B			
N°	386	Domanda	La maggior parte dei recettori alfa2, adrenergici, 5-HT1 serotoninergici e D2 dopaminergici hanno in comune					
			<div><div>A</div>la localizzazione nel nodo atrioventricolare</div> <div><div>B</div>l'accoppiamento negativo nei confronti dell'adenilato ciclasì</div> <div><div>C</div>una struttura caratterizzata dalla presenza di un canale ionoforo</div> <div><div>D</div>il ruolo nella regolazione della glicemia</div> <div><div>E</div>la struttura caratterizzata dalla presenza di quattro domini transmembrana</div>					
				Risposta esatta	B			

N°	387	Domanda	E' ammessa la gestione di una farmacia privata mediante società di capitali?					
			<div><div>A</div>si, sempre</div> <div><div>B</div>no</div> <div><div>C</div>si, purchè i soci siano farmacisti</div> <div><div>D</div>si, purchè il capitale sociale non sia inferiore a cinquantamila euro</div> <div><div>E</div>si, purchè i soci abbiano svolto la pratica professionale biennale</div>					
				Risposta esatta	B			



N°	388	Domanda	Nell'avvelenamento da atropina, avente la struttura indicata, si ha					
								
			<div><div>A</div>tachicardia</div> <div><div>B</div>secchezza delle fauci con difficoltà alla deglutizione</div> <div><div>C</div>cute calda e asciutta</div> <div><div>D</div>midriasi spiccata</div> <div><div>E</div>tutti gli effetti indicati</div>					
				Risposta esatta	E			

N°	386	Domanda	La maggior parte dei recettori alfa2 adrenergici, 5-HT1 serotoninergici e D2 dopaminergici hanno in comune			
				<div><div>A</div>la localizzazione nel nodo atrioventricolare</div> <div><div>B</div>l'accoppiamento negativo nei confronti dell'adenilato ciclasi</div> <div><div>C</div>una struttura caratterizzata dalla presenza di un canale ionoforo</div> <div><div>D</div>il ruolo nella regolazione della glicemia</div> <div><div>E</div>la struttura caratterizzata dalla presenza di quattro domini transmembrana</div>		
				Risposta esatta	B	




N°	389	Domanda	Quale, tra le benzodiazepine sottoelencate, ha emivita più breve?
		A	diazepam
		B	bromazepam
		C	flurazepam
		D	triazolam
		E	clordiazepossido
		Risposta esatta	D
N°	391	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il dimetilcone è corretta
		A	si usa anche come eccipiente (con la silice) per diminuire il volume apparente di MgO
		B	viene facilmente metabolizzato
		C	non contiene silicio nella molecola
		D	è diverso dal simelicone
		E	sono riportate più affermazioni corrette
		Risposta esatta	A

N°	Domanda	Risposta esatta
390	Domanda L'efedra (parti aeree di <i>Ephedra sinica</i> Stapf.) può indurre tutti i seguenti effetti tranne:	E
	<div> <input type="radio"/> A stimolazione del SNC </div> <div> <input type="radio"/> B ictus </div> <div> <input type="radio"/> C tachicardia </div> <div> <input type="radio"/> D ipertensione </div> <div> <input type="radio"/> E broncospasmo </div>	
392	Domanda Quale tra le sostanze indicate si definisce diluente per polveri?	C
	<div> <input type="radio"/> A talco </div> <div> <input type="radio"/> B fenolo </div> <div> <input type="radio"/> C lattosio </div> <div> <input type="radio"/> D acido benzoico </div> <div> <input type="radio"/> E acido ascorbico </div>	




N°	393	Domanda	Il monossido d'azoto (NO) viene prodotto nell'organismo		
			<div><div>A</div>dalla conversione dell'arginina in citrullina ad opera delle ossido nitrico sintetasi (NOS)</div> <div><div>B</div>attraverso il ciclo dell'urea</div> <div><div>C</div>per intervento del citocromo P-450</div> <div><div>D</div>per ossidazione dei leucotrieni</div> <div><div>E</div>per autoossidazione della dopamina</div>	Risposta esatta	A
N°	395	Domanda	L'anandamide è:		
			<div><div>A</div>un antagonista competitivo dei recettori cannabinoidi</div> <div><div>B</div>un agonista endogeno dei recettori cannabinoidi</div> <div><div>C</div>un agonista indiretto dei recettori cannabinoidi</div> <div><div>D</div>sia agonista diretto che agonista inverso dei recettori per i cannabinoidi</div> <div><div>E</div>più di una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	B
N°	396	Domanda	Alcune specialità medicinali sono utilizzabili come sistemi terapeutici transdermici. Qual è l'indicazione terapeutica principale del sistema transdermico contenente estrogeni		
			<div><div>A</div>anticinetosico</div> <div><div>B</div>ipoglicemizzante</div> <div><div>C</div>antianginoso</div> <div><div>D</div>antipertensivo</div> <div><div>E</div>trattamento dei sintomi della menopausa</div>	Risposta esatta	E





N°	397	Domanda	Quale, tra le sostanze elencate, agisce come ipotensivo in quanto viene metabolizzato a livello delle cellule endoteliali per dare monossido di azoto?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>niroxiidi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>diazossido</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>labetalolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sodio nitroprusiato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>idralazina</div></div>	Risposta esatta	D
N°	399	Domanda	L'anticorpo monoclonale infliximab è indicato:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>nel trattamento dell'asma grave-moderato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>nel trattamento della malattia di Crohn</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>nel trattamento dell'angina instabile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nella prevenzione del rigetto acuto di trapianto renale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nel trattamento dell'artrite psoriasica</div></div>	Risposta esatta	B
N°	400	Domanda	Quale è l'attività farmacologica più rilevante che può essere ipotizzata per la struttura indicata (propionilcolina)	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antistaminica - H2</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>agonista adrenergica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ansiolitica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>colinergica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>antimuscarinica</div></div>	Risposta esatta	D

N°	401	Domanda Su quale parte del nefrone agiscono prevalentemente i diuretici risparmiatori di K+?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>sulla parte distale del tubulo contorto distale</div><div>sulla parte prossimale del tubulo contorto distale</div><div>sul ramo ascendente dell'ansa di Henle</div><div>sul ramo discendente dell'ansa di Henle</div><div>sul tubulo convoluto prossimale</div></div></div></div>	Risposta esatta A	
N°	403	Domanda Il farmacista è tenuto ad accertarsi dell'identità dell'acquirente dei medicinali stupefacenti prescritti su ricetta a ricalco	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>e' tenuto a trascrivere gli estremi di un suo documento di riconoscimento</div><div>solo se l'acquirente ha un'età inferiore ai 18 anni</div><div>si qualora l'acquirente sia persona diversa dall'interessatario della ricetta</div><div>solo nel caso l'acquirente non sia conosciuto</div><div>si, sempre</div></div></div></div>	Risposta esatta A	
N°	402	Domanda Secondo la F.U. , su quante unità si esegue il saggio dell'uniformità di massa delle forme farmaceutiche a dose unica?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>5</div><div>10</div><div>20</div><div>50</div><div>100</div></div></div></div>	Risposta esatta C	
N°	404	Domanda I farmaci antagonisti adrenergici trovano applicazione nella terapia cardiovascolare. In quale delle seguenti categorie terapeutiche si collocano?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>Fibrinolitici</div><div>Anticoagulanti</div><div>Coagulanti</div><div>Antipertensivi</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta D	



N°	405	Domanda Ai sensi della Legge 71/1986 quando a causa delle dimensioni o della forma dell'etichetta di un prodotto cosmetico sia impossibile riportare le precauzioni particolari per l'impiego e l'elenco degli ingredienti	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>sostanza volatile che provoca infiammazione</div><div>contaminante costituito dai prodotti secondari provenienti dalla sintesi del farmaco</div><div>tracce di prodotti anticrittogamici presenti nel veicolo acquoso delle fiale</div><div>prodotti di decomposizione del farmaco favorita dall'esposizione alla luce</div><div>prodotti derivanti dal processo di crescita batterica e/o di demolizione della struttura batterica</div></div>	Risposta esatta	A
N°	407	Domanda Quale delle indicazioni seguenti corrisponde maggiormente alla definizione di "pirogeno"	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>sostanza volatile che provoca infiammazione</div><div>contaminante costituito dai prodotti secondari provenienti dalla sintesi del farmaco</div><div>tracce di prodotti anticrittogamici presenti nel veicolo acquoso delle fiale</div><div>prodotti di decomposizione del farmaco favorita dall'esposizione alla luce</div><div>prodotti derivanti dal processo di crescita batterica e/o di demolizione della struttura batterica</div></div>	Risposta esatta	E
N°	408	Domanda L'azatioprina, riportata nella struttura indicata, è un profarmaco della mercaptopurina progettato con lo scopo principale di	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>facilitare l'assorbimento</div><div>diminuire la tossicità</div><div>aumentare l'attività</div><div>proteggere la 6-mercaptopurina da una rapida ossidazione</div><div>indirizzare l'attività a livello del sistema linfatico</div></div>	Risposta esatta	D




N°	409	Domanda	Un trattamento cronico con propranololo NON va interrotto bruscamente in quanto si può avere	N°	411	Domanda	Per probiotici si intende:
		<div><div><div><div>A</div></div><div>intensa vasodilatazione</div></div><div><div><div>B</div></div><div>inotropismo negativo</div></div><div><div><div>C</div></div><div>tachicardia</div></div><div><div><div>D</div></div><div>blocco atrioventricolare</div></div><div><div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div>				<div><div><div><div>A</div></div><div>sostanze organiche non digeribili capaci di stimolare selettivamente la crescita o l'attività di batteri utili nel colon</div></div><div><div><div>B</div></div><div>organismi vivi che apportano beneficio alla salute rafforzando l'ecosistema intestinale</div></div><div><div><div>C</div></div><div>amminoacidi essenziali</div></div><div><div><div>D</div></div><div>precursori di mediatori chimici</div></div><div><div><div>E</div></div><div>provitamine</div></div></div>	
		Risposta esatta	C			Risposta esatta	A

N°	410	Domanda	Può essere effettuata da parte degli informatori scientifici pubblicità presso i farmacisti di medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica?	N°	412	Domanda	Gli antidepressivi triciclici causano frequentemente:
		<div><div><div><div>A</div></div><div>no, mai</div></div><div><div><div>B</div></div><div>no, senza autorizzazione ministeriale</div></div><div><div><div>C</div></div><div>si, solo per le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto</div></div><div><div><div>D</div></div><div>si</div></div><div><div><div>E</div></div><div>no, a meno che non si tratti di farmacisti ospedalieri</div></div></div>				<div><div><div><div>A</div></div><div>tolleranza</div></div><div><div><div>B</div></div><div>secchezza delle fauci</div></div><div><div><div>C</div></div><div>dipendenza</div></div><div><div><div>D</div></div><div>diarrea</div></div><div><div><div>E</div></div><div>allergia</div></div></div>	
		Risposta esatta	D			Risposta esatta	B

N°	Domanda	Risposta esatta
413	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	E
414	Domanda	E
415	Domanda	D
416	Domanda	A

N°	417	Domanda	Quale delle seguenti vie di somministrazione può essere soggetta parzialmente al metabolismo epatico di primo passaggio?	<div><div><div>A</div></div><div>via rettale</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>via intramuscolare</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>via sottocutanea</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>via orale</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>via sublinguale</div></div>	Risposta esatta	A
N°	419	Domanda	Quale, tra i farmaci antimicrobici seguenti, agisce sulla parete cellulare batterica?	<div><div><div>A</div></div><div>Trimetoprim</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Monobattami</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Bacitracina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Aminoglicosidi</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Più di uno</div></div>	Risposta esatta	E
N°	418	Domanda	Una formula per lattanti sostitutiva del latte materno è erogabile a carico del SSN:	<div><div><div>A</div></div><div>mai</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>se la mamma non allatta al seno</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>solo per lattanti nati da mamme HIV positive</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>per tutte le patologie che rendono controindicato l'allattamento materno</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>in base al reddito delle famiglie</div></div>	Risposta esatta	C
N°	420	Domanda	Il metabolismo è una forma di eliminazione perché:	<div><div><div>A</div></div><div>comporta generalmente la perdita dell'attività biologica</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>avviene principalmente nel rene</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>avviene principalmente nel fegato</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>comporta variazioni della frazione assorbita</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>comporta variazioni del volume di distribuzione</div></div>	Risposta esatta	A

N°	421	Domanda	Il meccanismo d'azione dei pesticidi organofosforici del tipo di quello indicato è:		N°	423	Domanda	Per quale delle seguenti droghe vegetali non ha senso il saggio del potere amarificante:			
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>riduzione della liberazione di acetilcolina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>inibizione dell'attività dell'acetilcolinesterasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>aumento della liberazione di acetilcolina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>inibizione della sintesi di acetilcolina</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>aumento dell'attività dell'acetilcolinesterasi</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>Assenzio</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>China corteccia</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>Noce vomica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>Genziana radice</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>Liquerizia</div>	Risposta esatta	B	Risposta esatta	E
N°	422	Domanda	I fluorochinoloni sono farmaci di prima scelta nel trattamento di		N°	424	Domanda	Il principio attivo tacrolimus:			
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>meningiti</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>salmonellosi con sintomi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>infezioni delle vie urinarie</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>tubercolosi</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>infezioni sostenute da Gram positivi</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>è prodotto da un fungo del genere Streptomyces</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>presenta azione immunosoppressiva</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>è un macrolide</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>tutte le indicazioni sono corrette</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>solo una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	C	Risposta esatta	D



N°	Domanda	Al sensi della Legge 71386 la realizzazione di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti è:
425		
	<div><div>A</div>vietata</div>	
	<div><div>B</div>consentita</div>	
	<div><div>C</div>consentita se non esiste un metodo alternativo convalidato e adottato a livello comunitario</div>	
	<div><div>D</div>consentita solo per alcuni tipi di prodotti cosmetici che figurano nell'Allegato I</div>	
	<div><div>E</div>vietata solo per alcuni tipi di prodotti cosmetici che figurano nell'Allegato I</div>	
	Risposta esatta	A

N°	Domanda	Tra i farmaci antiemetici ricordati quali è il più efficace nel controllo del vomito conseguente alla chemioterapia anti tumorale?
427		
	<div><div>A</div>domperidone</div>	
	<div><div>B</div>ondansetron</div>	
	<div><div>C</div>metoclopramide</div>	
	<div><div>D</div>difenidramina</div>	
	<div><div>E</div>prometazina</div>	
	Risposta esatta	B

N°	Domanda	Con quale degli accorgimenti sotto riportati si può prolungare l'effetto di un farmaco? Aggiungendo al principio attivo una sostanza che
426		
	A lo renda meno solubile nei grassi	
	B lo renda più solubile in acqua	
	C inibisca gli enzimi che lo catabolizzano	
	D ne faciliti l'escrezione renale	
	E più di una delle definizioni riportate è corretta	
	Risposta esatta	C

N°	Domanda	La stabilità fisica di una crema idrofila è affidata principalmente:
428		
	<div><div>A</div>all'impiego di un tensioattivo con HLB compreso tra 2-6</div>	
	<div><div>B</div>all'impiego di un tensioattivo con HLB compreso tra 12-18</div>	
	<div><div>C</div>all'impiego di metile p-idrossibenzoato</div>	
	<div><div>D</div>all'impiego di un olio minerale</div>	
	<div><div>E</div>all'impiego di un agente polico</div>	
	Risposta esatta	B

N°	429	Domanda	Quale dei seguenti anestetici generali è liquido a temperatura ambiente ed a pressione atmosferica?	<div><div><div>A</div><div>enflurano</div></div><div><div>B</div><div>fluroxene</div></div><div><div>C</div><div>metossiflurano</div></div><div><div>D</div><div>clorofornio</div></div><div><div>E</div><div>tutti</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	431	Domanda	La vaselina ha una densità pari a 0,9 g/ml. Quale delle affermazioni seguenti è corretta? La vaselina dopo agitazione con acqua	<div><div><div>A</div><div>galleggia</div></div><div><div>B</div><div>va a fondo</div></div><div><div>C</div><div>reagisce</div></div><div><div>D</div><div>si scioglie</div></div><div><div>E</div><div>non ha nessuno dei comportamenti indicati</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	430	Domanda	Molti sali di calcio trovano applicazione in terapia. Tra le sequenze di sali sotto indicate, aventi il PM riportato, quale è quella che esprime un contenuto DECRESCENTE di calcio quando si somministrano quantità equiponderali dei sali contenenti gli anioni indicati?	<div><div><div>A</div><div>nessuna di quelle indicate</div></div><div><div>B</div><div>cloruro-bromuro-ioduro</div></div><div><div>C</div><div>ioduro-bromuro-cloruro</div></div><div><div>D</div><div>bromuro-carbonato-ioduro</div></div><div><div>E</div><div>carbonato-bromuro-cloruro</div></div></div> <div><div>cloruro PM = 111</div><div>carbonato PM = 100</div><div>bromuro PM = 200</div><div>ioduro PM = 294</div></div>	Risposta esatta	B
N°	432	Domanda	Quale dei seguenti sali di calcio è impiegato come antiaderente o lubrificante nella preparazione di compresse:	<div><div><div>A</div><div>carbonato di calcio</div></div><div><div>B</div><div>fosfato bibasico di calcio diidrato</div></div><div><div>C</div><div>stearato di calcio</div></div><div><div>D</div><div>fosfato tribasico di calcio</div></div><div><div>E</div><div>solfato di calcio</div></div></div>	Risposta esatta	C



N°	433	Domanda	Quale, tra gli aminoacidi elencati e riportati in struttura, appartiene alla categoria dei cosiddetti "amminoacidi ramificati" (BCAA)?	<div> <input type="radio"/> A Valina (I) <input type="radio"/> B Serina (II) <input type="radio"/> C Metionina (III) <input type="radio"/> D Prolina (IV) <input type="radio"/> E nessuno di quelli indicati </div>	Risposta esatta	A
N°	434	Domanda	Indicare quale tra le seguenti sostanze può essere impiegata come rivestimento gastro-solubile di compresse	<div> <input type="radio"/> A cheratina <input type="radio"/> B copolimeri dell'acido metacrilico con piridina sostituite <input type="radio"/> C copolimeri dell'acido metacrilico e suoi esteri <input type="radio"/> D copolimeri dell'acido maleico con l'etilene <input type="radio"/> E acetilato di cellulosa </div>	Risposta esatta	B
N°	435	Domanda	Gli ACE-inibitori agiscono inibendo	<div> <input type="radio"/> A la sintesi delle catecolammine <input type="radio"/> B la sintesi dell'acetilcolina <input type="radio"/> C la conversione ad angiotensina II <input type="radio"/> D la conversione ad angiotensina I <input type="radio"/> E il legame dell'angiotensina II al recettore </div>	Risposta esatta	C
N°	436	Domanda	Quale è l'attività farmacologica più rilevante della meperidina, avente la struttura indicata	<div> <input type="radio"/> A nessuna di quelle indicate <input type="radio"/> B neurolettica <input type="radio"/> C antipiretica <input type="radio"/> D antimuscarinica <input type="radio"/> E anticonvulsivante </div>	Risposta esatta	A

N°	437	Domanda Tenendo presente l'azione farmacologica e quindi la principale utilizzazione terapeutica indicare, tra quelli sotto riportati, i presidi sanitari nei quali, razionalmente, la presenza di "sodio cloruro soluzione isotonica" sarà obbligatoriamente presente	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>nessuno dei presidi indicati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>tutti i presidi indicati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>farmacia rurale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>farmacia urbana</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>farmacia ospedaliera</div></div>	Risposta esatta B
N°	439	Domanda Di quante società per la gestione di farmacie private può essere socio un farmacista?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>una soltanto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>non più di quattro nella provincia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>non vi è limite</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tante quante sono le farmacie di cui ciascuna società è titolare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>non più di una per provincia</div></div>	Risposta esatta C
N°	440	Domanda Quale farmaco è utilizzato nella terapia dell'intossicazione da esteri organofosforici?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Atropina e pralidossima</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>inibitori delle MAO</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>triciclici e amfetamina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antistaminici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Metacolina</div></div>	Risposta esatta A

N°	441	Domanda Quali delle seguenti sostanze sono ritenute importanti per le proprietà benefiche attribuite al tè verde (foglie di <i>Carnellia sinensis</i> L.) ?	<div><div><div><div><div>A</div><div>linaiolo</div></div><div><div>B</div><div>teflavine</div></div><div><div>C</div><div>catechine (epigallocatechina ed epigallocatechina gallato)</div></div><div><div>D</div><div>alfa-terpineolo</div></div><div><div>E</div><div>nessuno dei componenti descritti</div></div></div></div></div> <td>Risposta esatta</td> <td>C</td>	Risposta esatta	C
N°	443	Domanda I termini "eutomero" e "distomero" vengono usati nella letteratura specializzata con riferimento agli antipodi ottici di un farmaco chirale. Tali termini sono riferiti	<div><div><div><div><div>A</div><div>alla deviazione verso sinistra e verso destra del piano della luce polarizzata</div></div><div><div>B</div><div>alla maggiore o minore capacità di interagire con un particolare recettore biologico</div></div><div><div>C</div><div>alla correlazione chimica alla gliceraleide otticamente attiva</div></div><div><div>D</div><div>ad un indice di priorità collegato al peso atomico degli atomi legati al centro chirale</div></div><div><div>E</div><div>all'ingombro sterico dei sostituenti sul centro chirale</div></div></div></div></div> <td>Risposta esatta</td> <td>B</td>	Risposta esatta	B
N°	442	Domanda I diuretici attivi sull'ansa di Henle, in particolare la furosemide, esercitano un'immediata azione benefica nei pazienti con edema polmonare. Ciò avviene in quanto	<div><div><div><div><div>A</div><div>hanno una potente e rapida azione diuretica</div></div><div><div>B</div><div>aumentano rapidamente la capacità del sistema venoso</div></div><div><div>C</div><div>incrementano rapidamente la pressione di riempimento del ventricolo sinistro</div></div><div><div>D</div><div>inibiscono la Na⁺, K⁺-ATPasi e la respirazione mitocondriale</div></div><div><div>E</div><div>inibiscono l'adenilicidasi e la fosfodiesterasi</div></div></div></div></div> <td>Risposta esatta</td> <td>B</td>	Risposta esatta	B
N°	444	Domanda Quale delle seguenti è una indicazione all'impiego dei farmaci antagonisti dei recettori alfa1 adrenergici:	<div><div><div><div><div>A</div><div>ipotensione posturale</div></div><div><div>B</div><div>aumentato transito intestinale</div></div><div><div>C</div><div>disturbi della minzione da iperplasia prostatica benigna</div></div><div><div>D</div><div>ipotensione arteriosa</div></div><div><div>E</div><div>enuresi notturna</div></div></div></div></div> <td>Risposta esatta</td> <td>C</td>	Risposta esatta	C




N°	445	Domanda	Quando è obbligatorio per il laboratorio galenico il sistema di aspirazione per polveri?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>quando vengano allestite preparazioni semisolide per applicazione cutanea</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sempre</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>quando vengano allestite preparazioni sterili</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>quando vengano allestite compresse, capsule, tisane o bustine ("cartine")</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>quando vengano allestite preparazioni magistrali</div></div></div></div>			
						Risposta esatta	D

N°	447	Domanda	Tra i nuovi servizi che le farmacie potranno erogare nell'ambito del SSN in base al DLgs 153/2009, è prevista la presenza di medici in farmacia?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si, ma solo se convenzionati con il SSN</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, ma non possono effettuare prescrizioni di medicinali</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, ma possono effettuare esclusivamente prestazioni di primo livello</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si, ma possono effettuare esclusivamente prestazioni di secondo livello</div></div></div></div>			Risposta esatta	B
----	-----	---------	--	--	--	--	-----------------	---

N°	448	Domanda	Quale dei seguenti diuretici NON interferisce con la capacità del rene di diluire le urine?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>furosemide</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>indapamide</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>dorlandone</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>acido etacrinico</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>spironolattone</div></div></div></div>			Risposta esatta	E
----	-----	---------	---	---	--	--	-----------------	---

N°	449	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti, riguardanti la cascata dell'acido arachidonico, è corretta		N°	451	Domanda	In quale caso è consentito che la pubblicità di un medicinale possa contenere elementi che potrebbero indurre il cittadino che volesse assumere il medicinale stesso a ritenere superflua la consultazione di un medico?	
		<input type="checkbox"/> A	i glucocorticoidi inibiscono la formazione di prostaglandine ma non quella dei leucotrieni				<input type="checkbox"/> A	per farmaci vendibili senza obbligo di ricetta (SOP)	
		<input type="checkbox"/> B	i glucocorticoidi inibiscono sia la formazione di prostaglandine che quella dei leucotrieni				<input type="checkbox"/> B	per i soli farmaci OTC	
		<input type="checkbox"/> C	i FANS inibiscono sia la formazione di prostaglandine che quella dei leucotrieni				<input type="checkbox"/> C	in nessun caso	
		<input type="checkbox"/> D	i FANS inibiscono la formazione dei leucotrieni ma non quella delle prostaglandine				<input type="checkbox"/> D	per i soli farmaci riportati dalla Farmacopea europea	
		<input type="checkbox"/> E	nessuna delle indicazioni date è corretta				<input type="checkbox"/> E	per i farmaci generici	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	C

N°	450	Domanda	L'assunzione di cibi ricchi in tiramina, avente la struttura indicata, durante trattamento con gli inibitori non selettivi delle monoammino ossidasi può risultare pericolosa perché:		N°	452	Domanda	La teofyllina è utilizzata nella terapia di:	
							<input type="checkbox"/> A	asma	
		<input type="checkbox"/> B	provoca collasso cardiocircolatorio				<input type="checkbox"/> B	ulcera peptica	
		<input type="checkbox"/> C	induce crisi ipertensive				<input type="checkbox"/> C	insonnia	
		<input type="checkbox"/> D	deprime l'attività cardiaca				<input type="checkbox"/> D	extrasistoli ventricolari	
		<input type="checkbox"/> E	inibisce la peristalsi intestinale				<input type="checkbox"/> E	diabete insipido	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	A



N°	453	Domanda	Le infusioni da composti contenenti rame si trattano con	<div><div><div>A</div></div><div>o-fenantrolina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>desferrioxamina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>8-metossichinolina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>penicillamina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>2,3-dimercaproporpanolo</div></div>	Risposta esatta	D
N°	455	Domanda	I farmaci ossidici sono farmaci che	<div><div><div>A</div></div><div>inibiscono la motilità dell'intestino</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>stimolano la motilità dell'intestino</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>inibiscono la motilità dell'utero</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>stimolano la motilità dell'utero</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>stimolano la contrazione della vescica</div></div>	Risposta esatta	D
N°	454	Domanda	Quale delle seguenti sostanze viene impiegata nel rivestimento delle compresse come agente filmogeno gastroresistente?	<div><div><div>A</div></div><div>metilidrossietilcellulosa</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>sodio carbossimetilcellulosa</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>polivinilpirrolidone</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>cellulosa aceto ftalato</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>polietilenglicoli</div></div>	Risposta esatta	D
N°	456	Domanda	Quale tra i seguenti antibiotici presenta ototoxicità?	<div><div><div>A</div></div><div>Kanamicina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Amoxicillina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Cloramfenicolo</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Lincomicina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Ciprofloxacina</div></div>	Risposta esatta	A

459 **Domanda** Quali tra gli incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro indicati devono essere comunicati dall'operatore sanitario al Ministero della Salute ?

☐ **A** solo quelli relativi ai dispositivi medico-diagnostici in vitro per test autodiagnostici

☐ **B** solo quelli relativi ai dispositivi medico-diagnostici in vitro appartenenti all'Allegato II del D.Lgs. 332/2000

☐ **C** quelli relativi a tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro marcati CE ai sensi del D.Lgs. 332/2000

☐ **D** quelli relativi a tutti i prodotti utilizzati in laboratorio

☐ **E** quelli relativi ai soli dispositivi medico-diagnostici in vitro notificati all'Autorità Competente ai sensi dell'Art. 10 della Direttiva 98/79

Domanda Con quale dei seguenti nomi viene anche indicata la vitamina PP ?

457

A acido retinico

B ascorbico

C piridossina

D biotina

E nicotinammide

Risposta esatta E

Domanda La principale causa di gastrolesività degli antinfiammatori non steroidei è rappresentata

☐ A dalla stimolazione della liberazione di colecistochina

☐ B dalla stimolazione del sistema colinergico a livello gastroenterico

☐ C dalla stimolazione del sistema istaminergico a livello gastroenterico

☐ D dal blocco del sistema peptidergico

☐ E dal blocco della sintesi di prostaglandine ad azione citoprotettiva a livello gastrico

458 **Domanda** L'amlidipina, avente la struttura indicata, è utilizzata come antipertensivo. Quale delle affermazioni che lo riguardano è corretta?

A

ha attività Ca^{2+} antagonista

B

provoca un consistente aumento della frequenza cardiaca

C

più di una delle affermazioni riportate è corretta





D

riduce la resistenza vascolari periferiche

E


ha un'azione antipertensiva più spiccata nei confronti dei valori massimi

Risposta esatta C


N°	Domanda	Risposta esatta
461	<p>Domanda Delle combinazioni sotto riportate, riguardanti le quattro strutture A, B, C e D che rappresentano due farmaci ed i corrispondenti metaboliti, individuare quella che si riferisce ai metaboliti</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>(A)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(B)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(C)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(D)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <input type="radio"/> A-C <input type="radio"/> A-D <input type="radio"/> C-B <input type="radio"/> B-D <input type="radio"/> C-D </div>	<p>Risposta esatta D</p>
462	<p>Domanda Per un farmaco biotecnologico è importante:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <input type="radio"/> A la conformazione nativa <input type="radio"/> B la conformazione denaturata <input type="radio"/> C una conformazione intermedia <input type="radio"/> D la conformazione meno stabile <input type="radio"/> E una conformazione ad elevata energia </div>	<p>Risposta esatta A</p>
463	<p>Domanda Una ricetta ripetibile in cui sia indicato un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della dispensazione?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <input type="radio"/> A sì, ma non esclude la dispensazione frazionata <input type="radio"/> B no, la ripetibilità è consentita 5 volte in 3 mesi, per il numero di confezioni indicato <input type="radio"/> C sì, ed esclude anche la dispensazione frazionata <input type="radio"/> D no, e la ripetibilità del numero di confezioni indicato è consentita per 6 mesi <input type="radio"/> E no, e la ripetibilità del numero di confezioni indicato è consentita per un mese </div>	<p>Risposta esatta A</p>
464	<p>Domanda Nella profilassi antimalarica l'atovaquone si associa con:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <input type="radio"/> A Cloroquina <input type="radio"/> B Meflochina <input type="radio"/> C Proguanile <input type="radio"/> D Doxiciclina <input type="radio"/> E Tetraciclina </div>	<p>Risposta esatta C</p>

N°	465	Domanda	Quale tra queste forme farmaceutiche è più occlusiva?	<div><div><div>A</div></div><div>gel idrofilo</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>emulsione O/A</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>sia emulsione A/O che O/A</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>emulsione A/O</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>crema anifilia</div></div>	Risposta esatta	D
N°	466	Domanda	Il metimazolo riduce i livelli di T3 principalmente:	<div><div><div>A</div></div><div>accelerando il metabolismo periferico del T4</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>inibendo la proteolisi della globulina legante la tiroxina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>inibendo la secrezione di tireotropina (TSH)</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>inibendo la captazione di ioduro nelle cellule tiroidee</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>inibendo l'incorporazione dello ioduro nei residui di tiroxina</div></div>	Risposta esatta	E
N°	467	Domanda	Il farmacista può svolgere attività di farmaco vigilanza?	<div><div><div>A</div></div><div>sì, deve</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>no, è riservata ai medici ed ai veterinari</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>sì, ma deve ottenere apposita autorizzazione da parte dell'ASL.</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>sì, ma soltanto quello ospedaliero</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>no, è compito degli organi di vigilanza sulle farmacie</div></div>	Risposta esatta	A
N°	468	Domanda	Quando il gruppo amminico del G-APA viene acilato con il gruppo R sotto indicato, si ottiene l'amoxicillina, appartenente alla classe delle penicilline	<div><div><div>A</div></div><div>ritardo</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>gastroresistenti</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>con carattere di profarmaco ed aventi la stessa attività delle penicilline corrispondenti</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>antipseudomonas</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>aventi più di una delle caratteristiche indicate</div></div>	Risposta esatta	B



N°	469	Domanda	Quale problema comporta l'uso del farmaco antifungino itraconazolo?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>instabilità chimica del principio attivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>formazione di un metabolita molto tossico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>interazione con numerosi altri farmaci per inibizione dell'attività del CYP 3A4</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>eruzioni cutanee molto serie</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	C
N°	471	Domanda	Da chi può essere promosso ricorso avverso la proclamazione dei risultati delle elezioni per il consiglio direttivo dell'Ordine dei Farmacisti?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>dal semplice iscritto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dal Ministro della Salute</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>dal Prefetto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dal procuratore della Repubblica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>dall'iscritto che abbia un'anzianità di iscrizione superiore a cinque anni</div></div>	Risposta esatta	A
N°	472	Domanda	Il tresfenidile, avente la struttura indicata, è utilizzato nella terapia del morbo di Parkinson. Esso agisce:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>come antagonista colinergico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>come agonista colinergico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>come antagonista dopaminergico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>come agonista dopaminergico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>con altro meccanismo</div></div>	Risposta esatta	A



N°	473	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi appartiene alla classe dei tiazolidindioni ipoglicemizzanti?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>lisuride</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>glimepiride</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>metformina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>pioglitazone</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>sulpiride</div>	Risposta esatta D
N°	475	Domanda	La nicotina, avente la struttura indicata, mima gli effetti dell'acetilcolina a livello di:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>cellule muscolari lisce del tratto gastroenterico</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>cellule muscolari lisce della vescica urinaria</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>muscolo circolare (costrittore) dell'iride</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>cellule cardiache pacemaker del nodo senoatriale</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>cellule cromaffini della midollare del surrene</div>	Risposta esatta E




N°	474	Domanda	L'indometacina ha la struttura indicata. Quale delle indicazioni sotto riportate e ad essa riferite è corretta	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>presenta effetti collaterali</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>costituisce un valido antipiretico</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>nei medicinali in commercio si trova spesso in associazione con l'aspirina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>viene assorbita molto bene a livello gastrico a seguito di somministrazione per os</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>più di una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta E
N°	476	Domanda	L'uso prolungato di cranberry o mirtillo rosso americano (succo di <i>Vaccinium macrocarpon</i> Ait.), può esporre al rischio di interazioni farmacologiche con farmaci:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>ipoglicemizzanti</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>ipocolesterolemizzanti</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>anticoagulanti</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>diuretici</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>antipertensivi</div>	Risposta esatta C




N°	477	Domanda	Quale citocromo è coinvolto nei meccanismi di biotrasformazione di un farmaco:		N°	479	Domanda	Il metronidazolo NON è indicato in caso di:	
		<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>citocromo p 25</div></div><div><div>citocromo P 50</div></div><div><div>citocromo T 36</div></div><div><div>citocromo P 450</div></div><div><div>citocromo B 150</div></div></div>				<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>vaginite da Trichomonas</div></div><div><div>colite pseudomembranosa (da antibiotici)</div></div><div><div>infezioni gravi da anaerobi</div></div><div><div>amebiasi intestinale</div></div><div><div>malaria</div></div></div>	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	E

N°	478	Domanda	Gli importi degli onorari professionali indicati nella tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali sono		N°	480	Domanda	Un cosmetico può contenere spironolattone?	
		<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>fissi ma indicano soltanto il minimo</div></div><div><div>fissi</div></div><div><div>meramente indicativi</div></div><div><div>fissi ma solo per le farmacie urbane</div></div><div><div>fissi ma indicano soltanto il massimo</div></div></div>				<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>no, perché presente nell'elenco delle sostanze non ammesse</div></div><div><div>sì, se il contenuto è inferiore allo 0,2%</div></div><div><div>sì, se non produce effetti sistemici.</div></div><div><div>sì, se il contenuto è inferiore allo 0,1%</div></div><div><div>più di una delle indicazioni è corretta</div></div></div>	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	A




N°	481	Domanda	L'eloposide è un antineoplastico semisintetico derivato da:	<div><div><div>A</div></div><div>Emetina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Vinblastina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Vincristina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Colchicina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Podofilotossina</div></div>	Risposta esatta	E
N°	483	Domanda	L'insulina ricombinante si ottiene da cellule di:	<div><div><div>A</div></div><div>baculovirus</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>batteri</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>orinato</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>uomo</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>specie vegetali</div></div>	Risposta esatta	B
N°	484	Domanda	Cosa si intende per "rintracciabilità" degli alimenti e dei mangimi?	<div><div><div>A</div></div><div>la possibilità di rintracciare un alimento a rischio</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>la possibilità di rintracciare un prodotto di origine animale nei depositi e magazzini di stoccaggio</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>la possibilità di seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>la possibilità di rintracciare un prodotto alimentare nella ditta di produzione</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>la possibilità di rintracciare un alimento o mangime nella fase di distribuzione</div></div>	Risposta esatta	C
N°	482	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sulla gomma guar è corretta?	<div><div><div>A</div></div><div>non interferisce con il metabolismo glucidico</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>è una fibra solubile ottenuta dai semi di <i>Cyamopsis tetragonolobus</i> L.</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>è un essudato gommoso di alcune specie del genere <i>Astragalus</i></div></div> <div><div><div>D</div></div><div>è una resina ottenuta dai semi di <i>Ceratonia siliqua</i> L.</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>può aumentare l'assorbimento di farmaci somministrati contemporaneamente</div></div>	Risposta esatta	B



N°	485	Domanda	Il principale bersaglio della tossicità cronica delle aflatoxine è:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>il sistema cardiovascolare</div><div>l'apparato renale</div><div>il sistema immunitario</div><div>l'apparato uditivo</div><div>il fegato</div></div>	Risposta esatta	E
N°	487	Domanda	La serotonina contiene nella sua struttura il nucleo	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>benzofuranico</div><div>chinolinico</div><div>isochinolinico</div><div>indolico</div><div>benzimidazolico</div></div>	Risposta esatta	D

N°	486	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "dipina" nella Denominazione Comune?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>più di una indicazione è corretta</div><div>Ca2+-antagonisti della classe delle diidropiridine</div><div>antinfiammatori derivati dall'indometacina</div><div>antibiotici derivati dalla rifamicina</div><div>antistaminici H2</div></div>	Risposta esatta	B
----	-----	---------	---	--	--	-----------------	---




N°	488	Domanda	Il conto economico del bilancio di una farmacia si può definire come:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>il principale indicatore aziendale</div><div>il rivelatore dinamico dell'esercizio annuale</div><div>l'insieme dei costi e dei ricavi</div><div>più di una indicazione è corretta</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	D
----	-----	---------	---	--	--	-----------------	---



N°	489	Domanda Tra i nuovi servizi che le farmacie potranno erogare nell'ambito del SSN in base al DLgs 153/2009, è prevista l'effettuazione di vaccinazioni ad animali da compagnia?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si, e possono essere effettuate dal farmacista</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si, ma devono essere effettuate da infermieri</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, ma devono essere effettuate da medici veterinari</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>no</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>solo se previste da apposite convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dai Piani socio-sanitari regionali</div></div></div></div>	N°	491	Domanda Il saggio di uniformità di massa di un lotto di capsule si esegue sulla base:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>del peso della capsula chiusa</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>del peso del contenuto della capsula ricavato per differenza fra il peso della capsula integra e il peso dell'involucro</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>del peso del contenuto della capsula ricavato per pesata diretta</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>del peso dell'involucro</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	490	Domanda Le piante medicinali elencate possono essere tutte impiegate in preparazioni ad azione analgesica-antinfiammatoria tranne:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Boswellia (<i>Boswellia serrata</i> Roxb.)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Uncaria (<i>Uncaria tomentosa</i> L.)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Arpagofito (<i>Hapagophytum procumbens</i> DC.)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Belladonna (<i>Atropa belladonna</i> L.)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Salice (<i>Salix alba</i> L.)</div></div></div></div>	N°	492	Domanda L'azione antipiretica degli antinfiammatori non steroidei è prevalentemente riconducibile a	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>una dispersione di calore per vasodilatazione cutanea</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>un'inibizione della sintesi delle prostaglandine in alcune regioni cerebrali</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>una ridotta sintesi dell'interleuchina-1beta</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>un effetto stabilizzante sulle membrane neuronali</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>un blocco dei recettori 5-HT2 nell'ipotalamo</div></div></div></div>	Risposta esatta	B




N°	493	Domanda	Lo stimolo dei recettori nicotinici ad opera della acetilcolina determina a livello postsinaptico	<div><div><div>A</div></div><div>apertura dei canali del Na⁺</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>chiusura dei canali del Na⁺</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>chiusura dei canali del K⁺</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>chiusura dei canali del Ca²⁺</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>apertura dei canali del Cl⁻</div></div>	Risposta esatta	A
N°	495	Domanda	La consistenza di una crema idrofila dipende principalmente	<div><div><div>A</div></div><div>dalla concentrazione di agente coemulsionante-gelificante</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>dai tipo di agente coemulsionante-gelificante</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>da tutti i fattori indicati</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>dai tipo di tensioattivo emulsionante</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>dalla concentrazione di tensioattivo emulsionante</div></div>	Risposta esatta	C
N°	496	Domanda	Quale dei seguenti farmaci non ha azione antimalarica?	<div><div><div>A</div></div><div>Doxiciclina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Sulfadoxina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Proguanil</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Imipenem</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Primetamina</div></div>	Risposta esatta	D



N°	497	Domanda	A quale classe farmacologica potrebbe essere attribuito un composto avente la struttura parziale indicata ed eventuali suoi analoghi?
			<div><div><input type="radio"/> A</div><div>antibiotici - tetraciclina</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>antibatterici - chinolonici</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>antibatterici - sulfamidici</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>antibiotici - penicilline</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>antibiotici - cefalosporine</div></div>
		Risposta esatta	E
N°	498	Domanda	Quale tra le affermazioni seguenti riguardanti le sostanze polimorfe è ERRATA:
			<div><div><input type="radio"/> A</div><div>il polimorfismo si può individuare attraverso misure di solubilità</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>il polimorfismo si può individuare attraverso l'analisi infrarossa</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>il polimorfismo si può individuare attraverso l'analisi diffrattometrica</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>il polimorfismo si può individuare attraverso l'analisi elementare</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>il polimorfismo si può individuare attraverso il punto di fusione al microscopio</div></div>
		Risposta esatta	D
N°	499	Domanda	La tossicità del cloramfenicolo nei neonati si manifesta con:
			<div><div><input type="radio"/> A</div><div>insufficienza epatica</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>sindrome grigia</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>insufficienza renale</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>cardiossicità</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>difetti dell'accrescimento</div></div>
		Risposta esatta	B
N°	500	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi è un profarmaco
			<div><div><input type="radio"/> A</div><div>enalapril</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>tetraciclina cloridrato</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>ampicillina pivalato</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>nabumetone</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>più di uno tra quelli indicati</div></div>
		Risposta esatta	E

N° 501 Domanda La fisostigmina, avente la struttura indicata, è classificabile come farmaco

- ☐ A simpaticomimico
- ☐ B simpaticolico
- ☐ C parasimpaticomimico
- ☐ D parasimpaticolico
- ☐ E nessuno di quelli indicati



Risposta esatta C

N° 502 Domanda L'acenocumarolo è un farmaco

- ☐ A alfa-bloccante
- ☐ B beta-bloccante
- ☐ C anticoagulante
- ☐ D antiasmatico
- ☐ E antinfiammatorio


Risposta esatta C

N° 503 Domanda Cos'è un farmaco locotico?

- ☐ A un rilassante della muscolatura uterina
- ☐ B un rilassante della muscolatura gastrointestinale
- ☐ C un farmaco che provoca la lisi di particolari batteri
- ☐ D un farmaco che provoca la lisi di particolari virus
- ☐ E nessuna delle indicazioni è corretta

Risposta esatta A

N° 504 Domanda I due farmaci A e B mostrano le curve dose-effetto in figura. Quale delle affermazioni sotto elencate è corretta? Il farmaco A, rispetto al farmaco B




- ☐ A ha la stessa potenza e la stessa efficacia di B
- ☐ B ha la stessa potenza e diversa efficacia rispetto a B
- ☐ C ha la stessa efficacia e diversa potenza
- ☐ D provoca lo stesso effetto di B solo quando è a concentrazioni più elevate rispetto a B
- ☐ E nessuna delle indicazioni, è corretta


Risposta esatta C



N°	505	Domanda	L'enzima citoplasmatico responsabile dell'ossidazione di dosi medio-basse di etanolo è:		N°	507	Domanda	Quale delle seguenti sostanze viene impiegata come antidoto in caso di sovradosaggio da metotrexato?	
			<div><div>A</div>aldeide deidrogenasi</div>					<div><div>A</div>acido p-aminobenzoico</div>	
			<div><div>B</div>acetilcolinesterasi</div>					<div><div>B</div>cotrimossazolo</div>	
			<div><div>C</div>alcol deidrogenasi</div>					<div><div>C</div>folinato di calcio</div>	
			<div><div>D</div>monossimino ossidasi</div>					<div><div>D</div>lievito di birra</div>	
			<div><div>E</div>endopeptidasi</div>					<div><div>E</div>trimetoprim</div>	
			Risposta esatta	C				Risposta esatta	C

N°	506	Domanda	La fase farmacodinamica di un farmaco corrisponde a:		N°	508	Domanda	I vaccini ricombinanti sono costituiti da:	
			<div><div>A</div>dissoluzione e assorbimento</div>					<div><div>A</div>antigeni proteici o polipeptidici prodotti da un microorganismo carrier (batterio o lievito) nel cui corredo genetico è stato inserito un gene che ne codifica la sintesi</div>	
			<div><div>B</div>distribuzione</div>					<div><div>B</div>antigeni di superficie del patogeno o da tossine inattive di elevata immunogenicità</div>	
			<div><div>C</div>metabolizzazione</div>					<div><div>C</div>un polisaccaride legato ad una proteina trasportatrice riconoscibile dai linfociti T</div>	
			<div><div>D</div>interazione con il sito di azione</div>					<div><div>D</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>	
			<div><div>E</div>eliminazione</div>					<div><div>E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	A



509	N°	Domanda	Il composto avente la struttura indicata viene utilizzato come antiossidante nella preparazione delle forme farmaceutiche. Esso viene indicato come	<div><div><input type="radio"/> A</div>butilidrossianisolo</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>acido ascorbico</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>con tutti i nomi riportati, eccetto uno</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>gallato di propile</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>propilglicol</div>	Risposta esatta	B
510	N°	Domanda	<div></div> I diuretici osmotici sono distribuiti nel fluido extracellulare; a ciò consegue estrazione di acqua dai compartimenti intracellulari e aumento di volume del liquido extracellulare. Per questi motivi tale classe di farmaci può provocare	<div><div><input type="radio"/> A</div>aumento degli edemi degli arti inferiori</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>edema polmonare acuto in presenza di scompenso cardiaco e congestione polmonare</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>aumento della pressione intracranica</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>aumento della pressione intraoculare</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>riduzione della tolleranza ai carboidrati</div>	Risposta esatta	B
511	N°	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito la sillaba "estir" nella Denominazione Comune?	<div><div><input type="radio"/> A</div>derivati carbammici di dioli e trioli usati come tranquillanti minori</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>anestetici locali</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>antistaminici H2</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>ormoni estrogeni</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>inibitori delle beta-lattamasi</div>	Risposta esatta	D
512	N°	Domanda	Che cosa si intende per desensibilizzazione recettoriale?	<div><div><input type="radio"/> A</div>riduzione della capacità di un sistema recettoriale di generare una risposta al farmaco</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>riduzione della capacità di un sistema recettoriale di legarsi al ligando</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>induzione della dipendenza al farmaco</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>impossibilità di un ligando di legarsi al recettore</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>riduzione della capacità di un enzima di legarsi ad un farmaco</div>	Risposta esatta	A

N°	513	Domanda	Gli ACE-inibitori bloccano la conversione:	<div><div>A</div> della angiotensina I in angiotensina II</div> <div><div>B</div> dell'angiotensinogeno in angiotensina I</div> <div><div>C</div> della bradichinina in angiotensinogeno</div> <div><div>D</div> della forma inattiva della renina in forma attiva</div> <div><div>E</div> della angiotensina II in angiotensina III</div>	Risposta esatta	A
N°	515	Domanda	I medicinali sterili possono essere preparati in Farmacia?	<div><div>A</div> no, mai</div> <div><div>B</div> sì, osservando le Norme di Buona Preparazione dei medicinali in Farmacia</div> <div><div>C</div> sì, se i locali sono mantenuti puliti</div> <div><div>D</div> sì, solo per uso topico</div> <div><div>E</div> sì, osservando le procedure stabilite dal Decreto Ministeriale 18 novembre 2003</div>	Risposta esatta	B
N°	514	Domanda	Quali sono le dosi di assunzione giornaliera di iodio raccomandate dal LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti) per le donne in gravidanza?	<div><div>A</div> 100 mcg</div> <div><div>B</div> 150 mcg</div> <div><div>C</div> 175 mcg</div> <div><div>D</div> 200 mcg</div> <div><div>E</div> 250 mcg</div>	Risposta esatta	C
N°	516	Domanda	A chi deve essere inviata dal farmacista la copia della richiesta di approvvigionamento di medicinali stupefacenti della Tab. II Sez. A e D a bordo di navi mercantili?	<div><div>A</div> alla Capitaneria di Porto</div> <div><div>B</div> alla A.S.L. territorialmente competente</div> <div><div>C</div> al Medico di Porto</div> <div><div>D</div> al Ministero della Marina Mercantile</div> <div><div>E</div> al Prefetto</div>	Risposta esatta	C



N°	517	Domanda	La vigilanza sugli Ordini dei Farmacisti spetta	<div><div><div>A</div></div><div>al Ministero della Salute</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>al Prefetto</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>alla Giunta Regionale</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>al Ministero della Salute di concerto con la Federazione Ordini Farmacisti Italiani</div></div>
----	-----	---------	---	--

N° 518 Domanda Quale delle seguenti affermazioni sulla chinidina NON è corretta

- A


è un alcaloide ottenuto da varie specie di Cinchona
- B

può essere preparato dalla chinina
- C


i due atomi di azoto presenti nella molecola hanno la stessa basicità
- D

è l'enantiomero destrogiro della chinina
- E

è poco solubile in acqua






Risposta esatta C



N°	525	Domanda	A chi deve essere inviata dal farmacista copia della richiesta di approvigionamento di medicinali supefacenti della Tabella II Sez. A, C e D nei cantieri di lavoro?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>al Ministero della Salute</div><div>al Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali Sociale</div><div>all'Ispettorato del Lavoro</div><div>alla A.S.L. territorialmente competente</div><div>alla Regione</div></div>	Risposta esatta	D
N°	527	Domanda	L'ingestione di semi di stramonio (<i>Datura stramonium</i> L.) induce una sindrome letale, soprattutto per i bambini, caratterizzata da:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>tachicardia</div><div>secchezza delle fauci con difficoltà di deglutizione</div><div>cute calda e asciutta</div><div>midriasi</div><div>Tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E

N°	526	Domanda	L'insulina glergine rispetto all'insulina umana presenta:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>sostituzione di una molecola di glicina e di due di arginino</div><div>sostituzione di due molecole di arginina e aggiunta di due di glicina</div><div>sostituzione di una molecola di arginina e di una di glicina</div><div>sostituzione di una molecola di glicina e aggiunta di due di arginino</div><div>sostituzione di due molecole di arginina e di due di glicina</div></div>	Risposta esatta	D
N°	528	Domanda	Il foglietto illustrativo NON è presente	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>nei medicinali prescrivibili con ricetta ministeriale a ricalco</div><div>nei SOP</div><div>nei galenici magistrali</div><div>nei medicinali veterinari</div><div>negli OTC</div></div>	Risposta esatta	C

N°	529	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce la spiramicina, avente la struttura indicata?		N°	531	Domanda	Per quali di questi ingredienti impiegati negli integratori alimentari, il Ministero della Salute prevede l'obbligo di riportare in etichetta delle avvertenze specifiche:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div> sintesi proteica ribosomiale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> membrana citoplasmatica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> metabolismo energetico della cellula batterica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> acidi nucleici della cellula batterica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> parete cellulare batterica</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div> passiflora incarnata</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> echinacea purpurea</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> malva officinalis</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> ginkgo biloba</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> equisetum arvense</div>	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	D
N°	530	Domanda	La fluoxetina, che ha la struttura sotto riportata, esplica azione antidepressiva. Quale delle affermazioni riportate è corretta?		N°	532	Domanda	Il farmacista al quale venga richiesta un medicinale autorizzato in Italia, di cui non sia provvisto, ha l'obbligo di procurarselo?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div> impedisce il reuptake della serotonina a livello centrale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> inibisce le MAO-A</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> inibisce le MAO-B</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> provoca più di uno degli effetti indicati</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> agisce sul recettore del GABA</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div> no, mai</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> sì, sempreché il richiedente anticipi le spese di porto</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> no, a meno che non si tratti di farmaco unica rurale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> sì, ma soltanto per i medicinali erogabili in regime di SSN</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> sì, ma soltanto per i medicinali prescritti con ricetta medica</div>	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	B




N°	533	Domanda	I neurolettici possono indurre tutti i seguenti effetti, tranne:		
			<div><div>A</div>disturbi sessuali</div> <div><div>B</div>stipsi</div> <div><div>C</div>ipertensione ortostatica</div> <div><div>D</div>alterazioni endocrine</div> <div><div>E</div>ipertensione</div>	Risposta esatta	E
N°	535	Domanda	La tossina botulinica		
			<div><div>A</div>facilita l'esocitosi di acetilcolina</div> <div><div>B</div>blocca i recettori muscarinici</div> <div><div>C</div>inibisce l'idrolisi dell'acetilcolina</div> <div><div>D</div>inibisce la liberazione di acetilcolina</div> <div><div>E</div>facilita la sintesi di acetilcolina</div>	Risposta esatta	D
N°	536	Domanda	La sopravvivenza dei pazienti in scompenso cardiaco risulta statisticamente aumentata dal trattamento con		
			<div><div>A</div>inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina</div> <div><div>B</div>ammine simpaticomimetiche</div> <div><div>C</div>inibitori della fosfodiesterasi III</div> <div><div>D</div>glicosidi cardioattivi</div> <div><div>E</div>agonisti dei canali del Ca 2+ voltaggio-dipendenti</div>	Risposta esatta	A
N°	534	Domanda	Quale dei seguenti farmaci NON viene utilizzato per le micosi sistemiche?		
			<div><div>A</div>Miconazolo</div> <div><div>B</div>Amfotericina B</div> <div><div>C</div>Nistatina</div> <div><div>D</div>Fluconosolo</div> <div><div>E</div>più di uno di quelli indicati</div>	Risposta esatta	C



N°	537	Domanda	Indicare il valore di pH di una soluzione 0,01 M di acido cloridrico	<div><div>A</div>0,2</div> <div><div>B</div>1</div> <div><div>C</div>2</div> <div><div>D</div>2,5</div> <div><div>E</div>3</div>	Risposta esatta	C
N°	539	Domanda	I farmaci possono essere somministrati attraverso molteplici vie. Quale di quelle sotto indicate presenta il così detto "metabolismo di primo passaggio" in % molto basso?	<div><div>A</div>parenterale</div> <div><div>B</div>endovena</div> <div><div>C</div>rettale</div> <div><div>D</div>tutte le vie indicate provocano un esteso metabolismo epatico</div> <div><div>E</div>orale</div>	Risposta esatta	C



N°	538	Domanda	Un intossicato per sovradosaggio di sostanza d'abuso presenta come sintomi: confusione mentale, sudore, mioclismi puntiformi, depressione respiratoria. Quale tra quelle elencate è la sostanza più probabilmente responsabile della sua condizione?	<div><div>A</div>cocaina</div> <div><div>B</div>eroina</div> <div><div>C</div>metilendiosimetamfetamina (MDMA)</div> <div><div>D</div>hashish</div> <div><div>E</div>LSD</div>	Risposta esatta	B
N°	540	Domanda	Il buono acquisto stupefacenti conforme al D.M. 18.12.2006 può essere utilizzato per:	<div><div>A</div>più di una indicazione è corretta</div> <div><div>B</div>solo per le richieste singole di stupefacenti</div> <div><div>C</div>solo per le richieste cumulative di stupefacenti</div> <div><div>D</div>anche per cessioni di stupefacenti a titolo gratuito ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere in caso di urgenza terapeutica</div> <div><div>E</div>le richieste singole o cumulative di stupefacenti</div>	Risposta esatta	A



N°	541	Domanda	Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti che ha stabilito l'importo della tassa annuale per gli iscritti all'Albo è ammesso il ricorso quando tale ricorso è proposto	N°	543	Domanda	Quali sono i prodotti oggetto di notifica nel sistema di allerta rapido "RASFF"?
		<div><div><div>A</div></div><div>in nessuno dei casi indicati</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>integratori alimentari</div></div>	
		<div><div><div>B</div></div><div>innanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie</div></div>				<div><div><div>B</div></div><div>alimenti</div></div>	
		<div><div><div>C</div></div><div>innanzi al Ministero della Sanità</div></div>				<div><div><div>C</div></div><div>alimenti e mangimi</div></div>	
		<div><div><div>D</div></div><div>all'Assemblea degli iscritti convocati in adunanza generale</div></div>				<div><div><div>D</div></div><div>farmaci</div></div>	
		<div><div><div>E</div></div><div>innanzi al Prefetto</div></div>				<div><div><div>E</div></div><div>alimenti destinati ad una alimentazione particolare</div></div>	
		Risposta esatta	D			Risposta esatta	C


N°	542	Domanda	Quale dei principi attivi seguenti viene usato per arrestare la crescita dei tumori estrogeno-dipendenti in quanto ha la capacità di legarsi ai recettori degli estrogeni esplicando effetto antagonista?	N°	544	Domanda	Generalmente i soggetti parkinsoniani vanno incontro a forme depressive. L'associazione di un medicinale antidepressivo contenente fluoxetina con un altro agente attività antiparkinson e contenente la selegilina (struttura indicata) NON è consigliabile in quanto
		<div><div><div>A</div></div><div>etinilestradiolo</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>la fluoxetina agisce come antagonista sul recettore dopaminergico</div></div>	
		<div><div><div>B</div></div><div>levonorgestrel</div></div>				<div><div><div>B</div></div><div>la fluoxetina viene rapidamente metabolizzata in presenza di selegilina</div></div>	
		<div><div><div>C</div></div><div>medrossiprogesterone</div></div>				<div><div><div>C</div></div><div>si realizzerebbe a livello centrale un eccesso di serotonina che potrebbe essere pericoloso</div></div>	
		<div><div><div>D</div></div><div>megestrol</div></div>				<div><div><div>D</div></div><div>la presenza di fluoxetina inibisce l'azione della selegilina</div></div>	
		<div><div><div>E</div></div><div>tamoxifene</div></div>				<div><div><div>E</div></div><div>la fluoxetina agisce come antagonista sul recettore colinergico</div></div>	
		Risposta esatta	E			Risposta esatta	C


<




N°	545	Domanda	I diuretici inibitori dell'anidrasi carbonica sono impiegati comunemente per la cura e la prevenzione del mal di montagna acuto in quanto	<div><div>A</div><div>aumentano il volume dell'urina</div></div> <div><div>B</div><div>riducono il volume del liquido extracellulare</div></div> <div><div>C</div><div>diminuiscono la velocità di formazione del liquido cerebrospinale</div></div> <div><div>D</div><div>riducono la quantità di HCO_3^- nel sangue</div></div> <div><div>E</div><div>aumentano l'eliminazione urinaria di HCO_3^-</div></div>	Risposta esatta	C
N°	547	Domanda	I FANS agiscono bloccando l'enzima	<div><div>A</div><div>acetilcolinesterasi</div></div> <div><div>B</div><div>lipossigenasi</div></div> <div><div>C</div><div>ciclossigenasi</div></div> <div><div>D</div><div>aromatasi</div></div> <div><div>E</div><div>GABA-transaminasi</div></div>	Risposta esatta	C
N°	548	Domanda	I farmaci che inibiscono il CYP3A4	<div><div>A</div><div>possono aumentare la tossicità di farmaci metabolizzati dal CYP3A4</div></div> <div><div>B</div><div>aumentano la clearance dei farmaci metabolizzati dal CYP3A4</div></div> <div><div>C</div><div>diminuiscono la clearance dei farmaci metabolizzati dal CYP3A4</div></div> <div><div>D</div><div>possono diminuire l'attività di profarmaci che vengono attivati dal CYP3A4</div></div> <div><div>E</div><div>tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E

N°	549	Domanda	Le polveri per inalazione sono descritte in F.U. ?	<div><div>A</div></div> <div><div>B</div></div> <div><div>C</div></div> <div><div>D</div></div> <div><div>E</div></div>	<div><div>no, essendo preparazioni per uso esterno</div><div>si,in apposita monografia</div><div>no essendo preparazioni per uso otologico</div><div>no, essendo preparazioni per uso particolare</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	B
N°	551	Domanda	Per quanto tempo il farmacista deve conservare copia del modulo della prescrizione di mangimi medicali?	<div><div>A</div></div> <div><div>B</div></div> <div><div>C</div></div> <div><div>D</div></div> <div><div>E</div></div>	<div><div>due anni</div><div>tre anni</div><div>il farmacista non è tenuto a conservare copia della prescrizione</div><div>cinque anni</div><div>un anno o tre se si tratta del farmacista in farmacia o presso il grossista rispettivamente</div></div>	Risposta esatta	B
N°	550	Domanda	L'itraconazolo è utilizzato nelle micosi superficiali e sistemiche. La sua azione consiste nella:	<div><div>A</div></div> <div><div>B</div></div> <div><div>C</div></div> <div><div>D</div></div> <div><div>E</div></div>	<div><div>inibizione della sintesi dell'ergosterolo</div><div>distruzione dell'aggregazione dei microtubuli durante la mitosi</div><div>inibizione della sintesi degli acidi nucleici</div><div>complessazione con l'ergosterolo della membrana plasmatica del fungo</div><div>inibizione della sintesi della parete cellulare</div></div>	Risposta esatta	A
N°	552	Domanda	Ai sensi della Legge 713/86 e successive modifiche, le sostanze indicate nell'Allegato II	<div><div>A</div></div> <div><div>B</div></div> <div><div>C</div></div> <div><div>D</div></div> <div><div>E</div></div>	<div><div>non possono essere presenti nella composizione di prodotti cosmetici</div><div>possono essere presenti nella composizione dei cosmetici</div><div>devono essere espressamente autorizzate se presenti nella composizione dei cosmetici</div><div>sono obbligatorie nella composizione dei cosmetici</div><div>sono facoltative nella composizione dei cosmetici</div></div>	Risposta esatta	A






N°	553	Domanda	Qual è il limite di prescrizione per i medicinali stupefacenti della tabella II sez. A per uso veterinario?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>una sola preparazione senza limite di dosaggio</div><div>una o più preparazioni purchè con dosaggio globale non superiore ad 8 giorni di terapia</div><div>un solo medicinale in quantità per un massimo di trenta giorni di terapia</div><div>più di una indicazione è corretta</div><div>due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale in due forme farmaceutiche o in due dosaggi per un massimo di trenta giorni di terapia</div></div>	Risposta esatta	E
N°	554	Domanda	Il farmacista, durante il servizio notturno, può rifiutarsi di dispensare medicinali soggetti a prescrizione in assenza di ricetta?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>si, sempre</div><div>no, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa che consente tale dispensazione in caso di necessità e urgenza</div><div>no, se si tratta di medicinali erogabili a carico dell'SSN</div><div>no, se si tratta di medicinali oppiacei per la terapia del dolore</div><div>si, se effettua il servizio "a chiamata"</div></div>	Risposta esatta	B
N°	555	Domanda	I diuretici inibitori dell'androsi carbonica aumentano l'escrezione urinaria di acido urico e cistina, aventi le strutture indicate, in quanto provocano	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div></div><div><div>alcalosi metabolica</div><div>alcalinizzazione della urina</div><div>fosfaturia e ipercalcemia</div><div>acidosi metabolica ipercloremica</div><div>iperkaliuria</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	556	Domanda	Sono tenuti alla registrazione presso il Ministero della Salute:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>solo i fabbricanti di dispositivi medico-diagnostici in vitro con sede in Italia</div><div>solo i fabbricanti di dispositivi medico-diagnostici in vitro con sede fuori dal territorio della UE</div><div>tutti i fabbricanti di dispositivi medico-diagnostici in vitro che immettono in commercio prodotti sul territorio italiano</div><div>solo i fabbricanti di dispositivi medico-diagnostici in vitro con sede nel territorio della UE</div><div>nessuna delle indicazioni date è corretta</div></div>	Risposta esatta	C



N°	557	Domanda	In alcune preparazioni magistrali può essere impiegato come additivo il sodio metabisolfito avente la struttura indicata (I). Quale delle affermazioni riportate è corretta? Il sodiometabisolfito		
		<div><div><chem>[Na+].[O-]S(=O)(=O)O[Na+]</chem><p>(I)</p></div><div><chem>[Na+].[O-]S(=O)(=O)O</chem><p>(II)</p></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div> in acqua si trasforma immediatamente nel composto (II)</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> la sua utilizzazione è preferita a quella di (II) se si deve operare in ambiente alcalino</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> si ottiene per trasformazione del composto (II) a contatto con l'acqua</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> ha struttura diversa dal sodio pirosolfito</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> contiene zolfo al suo massimo grado di ossidazione</div>	Risposta esatta	A
N°	558	Domanda	Quali delle seguenti sostanze può avere effetti teratogeni:		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div> vitamina A</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> Cloramfenicolo</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> Anfetamina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> Metotrexato</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> più di una tra quelle indicate</div>	Risposta esatta	E	
N°	559	Domanda	La mebeverina, avente la struttura indicata, viene utilizzata come		
		<div><chem>CCOC1=CC=C(C(=C1)OC)C(=O)OCCN(C)CCc2ccc(O)cc2</chem></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div> antalgico per i muscoli scheletrici</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> miorellassante di tipo papaverinico</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> miorellassante centrale di tipo meprobamato</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> spasmolitico di tipo anticolinergico</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> miorellassante di tipo curarico</div>	Risposta esatta	D
N°	560	Domanda	Gli antimetaboliti virali agiscono		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div> sul virus extracellulare</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> nella fase di penetrazione</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> nella fase di replicazione</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> nella induzione di interferone</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> nella fase di produzione delle proteine virali</div>	Risposta esatta	C	


N°	561	Domanda	Alcuni dei principali effetti collaterali della terapia sistemica con glucocorticoidi sono:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ulcera duodenale, ipotensione, aumentata suscettibilità alle infezioni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>arrossamento del viso, iperglicemia, atrofia del surrene, aumentata suscettibilità alle infezioni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ipoglicemia, tachicardia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>epatiti, ipoglicemia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>emorragie, mialgie, epatiti</div></div>	Risposta esatta	B
N°	563	Domanda	I corticosteroidi esplicano la loro azione farmacologica:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>attivando una proteina G</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>legandosi a recettori citosolici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>legandosi a recettori sulla membrana plasmatica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>legandosi a recettori sul reticolo endoplasmatico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>con un effetto non mediato da recettore</div></div>	Risposta esatta	B

N°	562	Domanda	La lidocaina, avente la struttura indicata, può essere impiegata come:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>anestetico locale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antiaritmico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ipnotico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antispasmodico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>solo due indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E
N°	564	Domanda	Il gemfibrozil, avente la struttura indicata, è un farmaco		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ipoglicemizzante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>per lo scompenso cardiaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>antipertensivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ipolipidizzante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>diuretico risparmiatore di K⁺</div></div>	Risposta esatta	D




N°	565	Domanda	Il metabolismo può rendere un farmaco:	<div><div>A</div><div>meno attivo</div></div> <div><div>B</div><div>inattivo</div></div> <div><div>C</div><div>più attivo</div></div> <div><div>D</div><div>meno tossico</div></div> <div><div>E</div><div>tutte le risposte sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E
N°	567	Domanda	Quale, tra le coppie farmaco - enzima sotto elencate, rappresenta l'enzima ed il corrispondente inibitore?	<div><div>A</div><div>(captopril) - (tirosina idrossilasi)</div></div> <div><div>B</div><div>(alfa-metildopa) - (triptofano 5-idrossilasi)</div></div> <div><div>C</div><div>(selegilina) - (aldeide deidrogenasi mitocondriale)</div></div> <div><div>D</div><div>(simvastatina) - (aromatico L-amminoaacido decarbossilasi)</div></div> <div><div>E</div><div>(alfa-metil tirosina) - (tirosina idrossilasi)</div></div>	Risposta esatta	E
N°	566	Domanda	Il meccanismo d'azione dell'irinotecan prevede:	<div><div>A</div><div>l'inibizione delle proteasi</div></div> <div><div>B</div><div>l'inibizione delle lipasi</div></div> <div><div>C</div><div>l'inibizione della topoisomerasi</div></div> <div><div>D</div><div>l'inibizioni delle lattamasi</div></div> <div><div>E</div><div>nessuno di questi meccanismi</div></div>	Risposta esatta	C
N°	568	Domanda	Il feniletanolo ed il clorobutanolo, aventi le strutture indicate, sono utilizzati come antibatterici nelle forme farmaceutiche. Quale delle affermazioni riportate è corretta	<div><div>A</div><div>il clorobutanolo è stabile in un largo intervallo di pH (3 - 8)</div></div> <div><div>B</div><div>i due composti non possono essere utilizzati per le preparazioni oftalmiche</div></div> <div><div>C</div><div>il feniletanolo è stabile in un ristretto intervallo di pH</div></div> <div><div>D</div><div>il feniletanolo presenta effetto sinergico con molti altri antibatterici</div></div> <div><div>E</div><div>i due composti sono tra loro incompatibili</div></div>	Risposta esatta	D

N°	569	Domanda	In quali delle seguenti forme farmaceutiche è disponibile l'aciclovir?	<div><div>A</div> compresse</div> <div><div>B</div> unguento oftalmico</div> <div><div>C</div> crema</div> <div><div>D</div> sospensione orale</div> <div><div>E</div> tutte le indicazioni sono corrette</div>	Risposta esatta	E
N°	571	Domanda	Le celastrolpine somministrabili per os sono più frequentemente rappresentate nelle celastrolpine indicate come composti	<div><div>A</div> di prima generazione</div> <div><div>B</div> di seconda generazione</div> <div><div>C</div> di terza generazione</div> <div><div>D</div> di quarta generazione</div> <div><div>E</div> sono distribuite in quantità non dissimile nelle quattro categorie di composti</div>	Risposta esatta	A
N°	570	Domanda	La Hosciamina ha la struttura sotto indicata. Quale delle affermazioni riportate e riguardanti le sue proprietà rispetto a quelle dell'atropina è ERRATA?	<div><div>A</div> la Hosciamina, come l'atropina, è un estere fra il tropanolo e l'acido tropico</div> <div><div>B</div> la Hosciamina ha un'attività farmacologica più elevata rispetto all'atropina</div> <div><div>C</div> nelle specialità medicinali è largamente più rappresentata l'atropina che la Hosciamina</div> <div><div>D</div> la Hosciamina è la forma racemica dell'atropina</div> <div><div>E</div> l'Hosciamina ed atropina presentano entrambe attività spasmolitiche</div>	Risposta esatta	D
N°	572	Domanda	I recettori muscarinici sono	<div><div>A</div> recettori di membrana associati a proteine G</div> <div><div>B</div> recettori porinici</div> <div><div>C</div> recettori citosolici</div> <div><div>D</div> recettori nucleari</div> <div><div>E</div> nessuna indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	A



N°	573	Domanda A quale delle miscele sotto indicate si avvicina maggiormente la composizione di una soluzione idroalcolica al 30% v/v?		N°	575	Domanda Tenendo presente l'azione farmacologica e quindi la principale utilizzazione terapeutica indicare tra quelli sotto riportati, i presidi sanitari nei quali razionalmente la presenza di "sodio cloruro soluzione ipertonica" sarà obbligatoriamente presente	
		<div><div>A</div>30 g di etanolo assoluto e 70 g di acqua</div>				<div><div>A</div>nessuno dei presidi indicati</div>	
		<div><div>B</div>30 ml di etanolo assoluto e 70 ml di acqua</div>				<div><div>B</div>tutti i presidi indicati</div>	
		<div><div>C</div>30 g di etanolo assoluto e 70 ml di acqua</div>				<div><div>C</div>farmacie aperte al pubblico ed ospedaliere</div>	
		<div><div>D</div>40 g di etanolo al 96% e 60 g di acqua</div>				<div><div>D</div>qualsunque farmacia aperta al pubblico</div>	
		<div><div>E</div>40 ml di etanolo al 96% e 60 ml di acqua</div>				<div><div>E</div>farmacia ospedaliere</div>	
			Risposta esatta B				Risposta esatta E
N°	574	Domanda La clonidina diminuisce la liberazione di noradrenalina dai terminali adrenergici:		N°	576	Domanda Le compresse gastroresistenti sono compresse a rilascio:	
		<div><div>A</div>attivando recettori beta adrenergici</div>				<div><div>A</div>modificato</div>	
		<div><div>B</div>bloccando recettori alfa2 adrenergici postsinaptici</div>				<div><div>B</div>ritardato</div>	
		<div><div>C</div>bloccando recettori alfa1 adrenergici</div>				<div><div>C</div>convenzionale</div>	
		<div><div>D</div>attivando recettori alfa1 adrenergici</div>				<div><div>D</div>prolungato</div>	
		<div><div>E</div>attivando recettori alfa2 adrenergici</div>				<div><div>E</div>più di una indicazione è corretta</div>	
			Risposta esatta E				Risposta esatta E




N°	577	Domanda	Un principio attivo contenuto in un medicinale di origine industriale in commercio esclusivamente in Canada può essere impiegato in una preparazione galenica?	<div><div><div>A</div>no</div><div>B</div>si</div> <div><div>C</div>solo se presente anche in una Farmacopea in vigore in UE</div> <div><div>D</div>solo se il medico se ne assume la responsabilità</div> <div><div>E</div>solo dietro presentazione di RNRR</div>	Risposta esatta	C
N°	579	Domanda	Quale delle seguenti sostanze viene impiegata come rivestimento gastro-solubile di compresse:	<div><div>A</div>polivinilacetato</div> <div><div>B</div>copolimeri metacrilato - acido metacrilico</div> <div><div>C</div>acetato di cellulosa</div> <div><div>D</div>ftaleto di idrossipropilmetilcellulosa</div> <div><div>E</div>idrossipropilmetilcellulosa</div>	Risposta esatta	E
N°	580	Domanda	Gli isomeri configurazionali di tipo "geometrico" sono separati tra loro da barriere energetiche facilmente superabili	<div><div>A</div>si trasformano l'uno nell'altro a temperatura ambiente</div> <div><div>B</div>possono modificare la loro "geometria" per favorire l'interazione con il recettore</div> <div><div>C</div>tutte le indicazioni fornite sono errate</div> <div><div>E</div>sono sovrapposibili</div>	Risposta esatta	D
N°	578	Domanda	La preparazione di saccarosio sciroppo (sciroppo semplice) è riportata in tab. 8 della F.U.	<div><div>A</div>solo per impieghi di correzione del sapore</div> <div><div>C</div>nella F.U. in apposita monografia</div> <div><div>D</div>solo per la correzione del gusto di un'emulsione a uso orale</div> <div><div>E</div>solo per uno sciroppo assolutamente privo di conservanti</div>	Risposta esatta	C



N°	Domanda	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
581	L'omeprazolo, utilizzato come antiulcera, agisce con un meccanismo che	<div><div><div>A</div><div>blocca i recettori H2 dell'istamina</div></div><div><div>B</div><div>blocca i recettori della acetilcolina</div></div><div><div>C</div><div>attiva la secrezione di muco protettivo dalle cellule parietali dello stomaco</div></div><div><div>D</div><div>blocca la pompa H⁺, K⁺ ATPasi gastrica</div></div><div><div>E</div><div>non è ancora del tutto chiarito</div></div></div>	583	Tutte le seguenti sono reazioni avverse aspecifiche tranne una, indicare quale:	<div><div><div>A</div><div>ulcera gastrica da aspirina</div></div><div><div>B</div><div>pancreatite da diuretici</div></div><div><div>C</div><div>sindrome oculomucocutanea da pradololo</div></div><div><div>D</div><div>tosse da ace-inibitori</div></div><div><div>E</div><div>cefalea da nitrati</div></div></div>	B

N°	Domanda	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
582	Il piosolfato di sodio ha la formula indicata che è strutturalmente analoga a quella del bisacodile. Quale delle affermazioni riportate è corretta	<div><div><div>A</div><div>il gruppo di estere solforico si idrolizza a livello gastrico</div></div><div><div>B</div><div>il gruppo di estere solforico non si idrolizza nel tratto gastroenterico</div></div><div><div>C</div><div>il preparato commerciale in gocce è utilizzabile anche in età pediatrica</div></div><div><div>D</div><div>agisce fondamentalmente con meccanismo osmotico per la sua natura salina</div></div><div><div>E</div><div>è in commercio anche in forma di supposte per impedire l'irritazione gastrica</div></div></div>	584	La ciproproladina, avente la formula indicata,	<div><div><div>A</div><div>non presenta isomeria geometrica ma presenta isomeria ottica</div></div><div><div>B</div><div>rappresenta l'isomero cis</div></div><div><div>C</div><div>non presenta isomeria ottica ma presenta isomeria geometrica</div></div><div><div>D</div><div>non presenta né isomeria ottica né isomeria geometrica</div></div><div><div>E</div><div>rappresenta l'isomero trans</div></div></div>	D




N°	585	Domanda	Il rilascio di un farmaco da una matrice porosa, non rigonfiabile e non biodegradabile, in un mezzo acquoso esterno ad essa, avviene:	<input type="radio"/> A per contestuale penetrazione del mezzo acquoso nei capillari della matrice, dissoluzione in esso del farmaco e diffusione verso l'esterno <input type="radio"/> B per dilatazione dei pori della matrice e conseguente dissoluzione del farmaco nel mezzo acquoso <input type="radio"/> C per disaggregazione della matrice <input type="radio"/> D per lenta erosione della matrice e contestuale dissoluzione del farmaco <input type="radio"/> E più di una indicazione è corretta	Risposta esatta	A
N°	587	Domanda	Gli Ordini dei Farmacisti hanno carattere:	<input type="radio"/> A provinciale <input type="radio"/> B comunale <input type="radio"/> C regionale <input type="radio"/> D provinciale o interprovinciale <input type="radio"/> E regionale o interregionale	Risposta esatta	D
N°	588	Domanda	Le strutture indicate rappresentano composti utilizzabili come additivi in tecnica farmaceutica. Quale degli accoppiamenti (struttura - caratteristiche) sotto riportati è corretto	<input type="radio"/> A (I) - anfotlica <input type="radio"/> B (II) - non ionica <input type="radio"/> C (III) - non ionica <input type="radio"/> D più di una indicazione è corretta <input type="radio"/> E tutte le indicazioni sono corrette	Risposta esatta	D
N°	586	Domanda	La acetilsistina contiene i tre gruppi funzionali aventi la struttura sotto indicata. Quale, tra i gruppi funzionali indicati, è il responsabile dell'attività mucolitica del principio attivo? Il gruppo	<input type="radio"/> A sulfidrilico (I) <input type="radio"/> B carbossilico (II) <input type="radio"/> C acetamidico (III) <input type="radio"/> D tutti quelli indicati <input type="radio"/> E più di uno di quelli indicati	Risposta esatta	A

N°	589	Domanda	Quale dei seguenti antineoplastici impiegati come antitumorali agisce nel primissimo stadio del processo di sintesi degli acidi nucleici ?	<div><div><div>A</div></div><div>citarabina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>flouxuridina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>fluorouracile</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>metotrexato</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>tioguanina</div></div>	Risposta esatta	D
N°	591	Domanda	Nel trattamento delle infezioni da Helicobacter pylori si usa l'associazione	<div><div><div>A</div></div><div>tetraciclina - gentamicina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>claritromicina - metronidazolo - omeprazolo</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>ampicillina - gentamicina - omeprazolo</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>tetraciclina - streptomicina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>piperacillina - tobramicina - omeprazolo</div></div>	Risposta esatta	B
N°	592	Domanda	L'isoprenalina, avente la struttura indicata, rilascia la muscolatura liscia bronchiale in quanto:	<div><div><div>A</div></div><div>libera noradrenalina dalle vescicole sinapliche dei terminali simpatici</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>inibisce il reuptake neuronale di noradrenalina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>stimola i recettori beta adrenergici</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>stimola i recettori alfa adrenergici</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>ha un'azione sulle micelle non mediata da recettori</div></div>	Risposta esatta	C
N°	590	Domanda	La porzione strutturale di molecola più direttamente responsabile dei processi farmacodinamici correlati al meccanismo d'azione degli antibiotici beta-lattamici è rappresentata	<div><div><div>A</div></div><div>dalla porzione costituita dal ciclo a sei termini</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>dalla porzione costituita dal ciclo a quattro termini</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>dalla porzione costituita dal ciclo a cinque termini</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>dalla porzione ammidica non ciclica</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>da nessuna delle porzioni molecolari sopra indicate</div></div>	Risposta esatta	B

[illegible]

N°	597	Domanda	Quale delle seguenti attività meglio descrive il meccanismo d'azione delle benzodiazepine?		N°	599	Domanda	Qual è l'impiego del carbonato di litio in terapia?	
		<div><div><div>A</div><div>blocco dell'attività eccitatoria dell'acido glutammico</div></div><div><div>B</div><div>inibizione dell'enzima GABA transaminasi</div></div><div><div>C</div><div>attivazione dei recettori della glicina nel midollo spinale</div></div><div><div>D</div><div>facilitazione dell'aumento della conduttanza al cloro mediata da GABA</div></div><div><div>E</div><div>aumento dell'attività dell'enzima adenilato ciclasi</div></div></div>		<div><div><div>A</div><div>trattamento e profilassi degli episodi maniacali</div></div><div><div>B</div><div>ansiolitico</div></div><div><div>C</div><div>agente alcalinizzante</div></div><div><div>D</div><div>ipnotico</div></div><div><div>E</div><div>neuroletico avente lo stesso profilo di azione dell'aloperidolo</div></div></div>				Risposta esatta	A
N°	598	Domanda	Spironolattone e canrenone sono diuretici K ⁺ -risparmiatori. La loro azione diuretica ed efficacia clinica dipende da		N°	600	Domanda	L'impiego di poliacrilati riguarda la tecnica di	
		<div><div><div>A</div><div>inibizione dei canali del Na⁺ dell'epitelio renale</div></div><div><div>B</div><div>fattori diversi da quelli indicati</div></div><div><div>C</div><div>i livelli di aldosterone endogeno</div></div><div><div>D</div><div>velocità di filtrazione glomerulare</div></div><div><div>E</div><div>pH urinario</div></div></div>		<div><div><div>A</div><div>rivestimento</div></div><div><div>B</div><div>micronizzazione</div></div><div><div>C</div><div>emulsionamento</div></div><div><div>D</div><div>filtrazione</div></div><div><div>E</div><div>macinazione</div></div></div>				Risposta esatta	A

N°	601	Domanda	La vancomicina è usata in caso di	<div><div>A</div>colite ulcerosa</div> <div><div>B</div>colite associata al trattamento con antibiotici</div> <div><div>C</div>paratifo</div> <div><div>D</div>giardiasi</div> <div><div>E</div>amebiasi</div>	Risposta esatta	B
N°	603	Domanda	Tra gli eccipienti per preparati farmaceutici da preparare come polveri, il biossido di silicio colloidale è utilizzato come	<div><div>A</div>glidante</div> <div><div>B</div>conservante</div> <div><div>C</div>edulcorante</div> <div><div>D</div>bagnante</div> <div><div>E</div>lubrificante</div>	Risposta esatta	A
N°	602	Domanda	Quale dei seguenti organi o sistemi rappresenta un bersaglio della tossicità delle diossine:	<div><div>A</div>sistema immunitario</div> <div><div>B</div>apparato cardiovascolare</div> <div><div>C</div>genoma</div> <div><div>D</div>fegato</div> <div><div>E</div>più di una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	E
N°	604	Domanda	Le figure 1 e 2 rappresentano l'andamento delle curve dose-effetto di un farmaco. Esse differiscono in quanto	<div><div>A</div>i valori delle ascisse nella Fig 2 sono riportati in forma logaritmica</div> <div><div>B</div>i valori delle ascisse nella Fig 1 sono riportati in forma logaritmica</div> <div><div>C</div>si riferiscono a due antagonisti con pari potenza</div> <div><div>D</div>i valori delle ascisse, sia nella Fig 1 che nella Fig 2, sono riportati in forma logaritmica</div> <div><div>E</div>i valori delle ordinate nella Fig 1 sono riportati in forma logaritmica</div>	Risposta esatta	B



N°	605	Domanda	Zanamivir si somministra per via:		
			<div><div>A</div> inalatoria</div>		
			<div><div>B</div> endovenosa</div>		
			<div><div>C</div> topica</div>		
			<div><div>D</div> intramuscolare</div>		
			<div><div>E</div> rettale</div>		
				Risposta esatta	A


N°	607	Domanda	Il saggio di uniformità di contenuto delle forme farmaceutiche a dose unica si basa sulla determinazione:		
			<div><div>A</div> dei contenuti individuali di principio attivo in un numero di unità a dose unica</div>		
			<div><div>B</div> del contenuto medio del campione di unità a dose unica</div>		
			<div><div>C</div> delle masse individuali del campione di unità a dose unica</div>		
			<div><div>D</div> tutte le indicazioni sono corrette</div>		
			<div><div>E</div> nessuna indicazione è corretta</div>		
				Risposta esatta	A


N°	606	Domanda	Quale dei seguenti strumenti NON è utilizzabile per determinare le dimensioni delle particelle di un campione di polvere:		
			<div><div>A</div> microscopio</div>		
			<div><div>B</div> setacci</div>		
			<div><div>C</div> apparecchio di Andreasen</div>		
			<div><div>D</div> apparecchio di Ostwald</div>		
			<div><div>E</div> contatore di Coulter</div>		
				Risposta esatta	D

N°	608	Domanda	I farmaci ACE-inibitori regolarizzano la pressione arteriosa da soli o in associazione con altri farmaci antipertensivi nella grande maggioranza di pazienti affetti da ipertensione arteriosa di media intensità. E' condivisa l'opinione che gli ACE-inibitori:		
			<div><div>A</div> riducono l'incidenza di vasculopatie cerebrali nei pazienti a rischio</div>		
			<div><div>B</div> riducono l'incidenza di infarto miocardico nei pazienti a rischio</div>		
			<div><div>C</div> limitano la nefropatia</div>		
			<div><div>D</div> rallentano il progresso delle lesioni aterosclerotiche delle arterie</div>		
			<div><div>E</div> più di una indicazione è corretta</div>		
				Risposta esatta	E

N°	609	Domanda La digossina, se somministrata a pazienti con funzionalità renale nei limiti della norma, ha un tempo di dimezzamento (t1/2) di circa	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>1,5 giorni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>1 settimana</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>10 ore</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>3 giorni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>12 ore</div></div>	Risposta esatta A	
N°	611	Domanda Il coefficiente di ripartizione n-octanolo/acqua è un descrittore che, per la molecola in studio, caratterizza della molecola le proprietà	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>steriche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>idrofobiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>elettroniche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>configurazionali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>conformazionali</div></div>	Risposta esatta B	
N°	612	Domanda Indicare quale delle seguenti potenziali sostanze d'abuso è classificabile tra gli antipsicotici a struttura fenilisopropilamminica	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>amfetamina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>efedrina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ecstasy</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutte quelle indicate</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>cattina (struttura indicata)</div></div>	Risposta esatta D	<div><chem>CC(C)C(O)c1ccccc1</chem></div>


N°	613	Domanda	Il sistema delle 5 W (what, why, when, where, who) regola:	
		<div><div><input type="radio"/> A</div><div>gli acquisti da effettuare</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>i pagamenti da effettuare</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>un guadagno ulteriore per il fornitore</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>immobili ed arredi</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	A

N°	614	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce la cefixima, avente la struttura indicata?	
		<div><div></div><div><div><input type="radio"/> A</div><div>sintesi proteica ribosomiale</div></div><div><div><input type="radio"/> B</div><div>membrana citoplasmatica</div></div><div><div><input type="radio"/> C</div><div>parete cellulare batterica</div></div><div><div><input type="radio"/> D</div><div>acidi nucleici della cellula batterica</div></div><div><div><input type="radio"/> E</div><div>metabolismo energetico della cellula batterica</div></div></div>	Risposta esatta	C

N°	615	Domanda	Quale tipo di interazione determina la riduzione dei livelli enzimatici di tetraciclina, aventi la struttura generale indicata, in seguito a contemporanea assunzione dell'antibiotico e di alimenti ricchi di calcio?	
		<div><div></div><div><div><input type="radio"/> A</div><div>interazione elettrostatica</div></div><div><div><input type="radio"/> B</div><div>inibizione enzimatica</div></div><div><div><input type="radio"/> C</div><div>complessazione</div></div><div><div><input type="radio"/> D</div><div>sinergismo</div></div><div><div><input type="radio"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div>	Risposta esatta	C

N°	616	Domanda	L'azione profilattica dei beta-antagonisti nell'angina pectoris consegue a	
		<div><div><input type="radio"/> A</div><div>diminuita richiesta di O₂ da parte del cuore</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>aumento del flusso coronarico</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>ridistribuzione del flusso coronarico</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>inibizione degli spasmi delle coronarie</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>diminuzione del precarico</div></div>	Risposta esatta	A

617	N°	Domanda	In quale caso è obbligatorio conservare l'originale della ricetta che prescrive medicinali preparati industrialmente?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	
619	N°	Domanda	Si devono preparare 300 ml di una soluzione di HCl 0,2 M disponendo di HCl 6 M. Entro quale intervallo ricade la quantità di HCl 6 M da prelevare?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	
620	N°	Domanda	Il meccanismo dell'azione del pirante è	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	
618	N°	Domanda	Il meccanismo dell'azione del pirante è	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	
619	N°	Domanda	Si devono preparare 300 ml di una soluzione di HCl 0,2 M disponendo di HCl 6 M. Entro quale intervallo ricade la quantità di HCl 6 M da prelevare?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	
620	N°	Domanda	Il PHT (prontuario Ospedale Territorio) è:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	




N°	621	Domanda	La tecnologia diagnostica ELISA si basa sull'uso di:				
			<div><div>A</div>sonde magnetiche</div>				
			<div><div>B</div>anticorpi specifici</div>				
			<div><div>C</div>risonanza nucleare</div>				
			<div><div>D</div>sequenze di DNA</div>				
			<div><div>E</div>termografia</div>				
					Risposta esatta	B	

N°	622	Domanda	Sumatriptan e zolmitriptan, agonisti dei recettori serotoninergici, vengono impiegati clinicamente in una delle seguenti patologie:				
			<div><div>A</div>parkinsonismo</div>				
			<div><div>B</div>epilessia</div>				
			<div><div>C</div>emicrania</div>				
			<div><div>D</div>insufficienza cerebrovascolare acuta</div>				
			<div><div>E</div>detossificazione lenta dell'eroinomane</div>				
					Risposta esatta	C	

N°	623	Domanda	Per anticorpo monoclonale umanizzato si intende una immunoglobulina				
			<div><div>A</div>estratta da plasma umano</div>				
			<div><div>B</div>ottenuta immunizzando un soggetto umano</div>				
			<div><div>C</div>in cui le sequenze che riconoscono l'antigene sono murine</div>				
			<div><div>D</div>ottenuta per via sintetica</div>				
			<div><div>E</div>in cui la regione costante (Fc) è murina</div>				
					Risposta esatta	C	

N°	624	Domanda	I curari sono				
			<div><div>A</div>antagonisti dell'acetilcolina ai recettori nicotinici delle giunzioni neuromuscolari</div>				
			<div><div>B</div>antagonisti dell'acetilcolina ai recettori muscarinici</div>				
			<div><div>C</div>antagonisti della serotonina ai recettori 5-HT1</div>				
			<div><div>D</div>attivatori dei recettori postgangliari del sistema simpatico</div>				
			<div><div>E</div>attivatori dei recettori nicotinici presenti alle sinapsi gangliari</div>				
					Risposta esatta	A	




N°	Domanda	Le cicloossigenasi sono:	625	N°	Domanda	Indicare quale dei seguenti composti NON interagisce con i recettori GABA-A:	627
	<div><div><div><div><div>A</div><div>isoenzimi implicati nella biosintesi delle prostaglandine</div></div><div><div>B</div><div>enzimi coinvolti nel ciclo di Krebs</div></div><div><div>C</div><div>enzimi deputati alla biosintesi del GABA</div></div><div><div>D</div><div>enzimi deputati al catabolismo ossidativo</div></div><div><div>E</div><div>enzimi coinvolti nella catena respiratoria</div></div></div></div></div>				<div><div><div><div>A</div><div>barbiturici</div></div><div><div>B</div><div>benzodiazepine</div></div><div><div>C</div><div>alcaloidi dell'oppio a struttura fenantrenica</div></div><div><div>D</div><div>zolpidem</div></div><div><div>E</div><div>bicucullina</div></div></div></div>		
	Risposta esatta	A			Risposta esatta	C	


N°	Domanda	Nella terapia antipertensiva vengono usati	626	N°	Domanda	La digitale aumenta la forza di contrazione cardiaca. Quale dei seguenti meccanismi è associato a tale effetto?	628	Risposta esatta	D
		<div><div><div><div>A</div><div>beta1-agonisti</div></div><div><div>B</div><div>antagonisti ai recettori H2 dell'istamina</div></div><div><div>C</div><div>agonisti della noradrenalina ai recettori alfa1</div></div><div><div>D</div><div>diuretici</div></div><div><div>E</div><div>attivatori dei canali del Ca2+</div></div></div></div>				<div><div><div><div>A</div><div>attivazione della adenil ciclasi</div></div><div><div>B</div><div>blocco dei canali del Na+</div></div><div><div>C</div><div>attivazione dei canali lenti del Ca2+</div></div><div><div>D</div><div>inibizione della Na+, K+-ATPasi</div></div><div><div>E</div><div>blocco della H+, K+-ATPasi</div></div></div></div>		Risposta esatta	D



N°	629	Domanda	I limiti di accettabilità per le aflatoxine nelle droghe vegetali sono richiesti dalla F.U.:	<div><div>A</div>mai</div> <div><div>B</div>solo per le radici</div> <div><div>C</div>solo per le foglie</div> <div><div>D</div>sempre</div> <div><div>E</div>quando necessario</div>	Risposta esatta	E
N°	631	Domanda	La ticlopidina agisce come antiaggregante piastrinico:	<div><div>A</div>bloccando la cicloossigenasi piastrinica</div> <div><div>B</div>bloccando la lipossigenasi piastrinica</div> <div><div>C</div>attivando la cicloossigenasi piastrinica</div> <div><div>D</div>bloccando la via dell'adenosina difosfato piastrinica</div> <div><div>E</div>attivando la via dell'adenosina difosfato piastrinica</div>	Risposta esatta	D
N°	630	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sul nitrato di isomile NON è corretta	<div><div>A</div>è una sostanza volatile</div> <div><div>B</div>è infiammabile</div> <div><div>C</div>è poco solubile in acqua</div> <div><div>D</div>forma miscele esplosive con l'aria o con l'ossigeno</div> <div><div>E</div>si somministra sia per inalazione che per via intravenosa</div>	Risposta esatta	E
N°	632	Domanda	I composti sotto elencati hanno la DL50 (mg/Kg) indicata. Quale composto presenta la tossicità minore?	<div><div>A</div>tetrodotossina = 0,1</div> <div><div>B</div>picrotossina = 5</div> <div><div>C</div>stricnina solfato = 2</div> <div><div>D</div>d-tubocurarina = 0,5</div> <div><div>E</div>nicotina = 1</div>	Risposta esatta	B



N°	633	Domanda	La interazione di un farmaco con il suo recettore forma un complesso farmaco-recettore. Tale interazione è all'equilibrio quando si è	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	egguagliata la velocità delle reazioni di associazione e dissociazione annullata la concentrazione del farmaco annullata la velocità della reazione nei due sensi annullata la concentrazione del recettore libero egguagliata la concentrazione del farmaco e quella del suo complesso con il recettore	Risposta esatta	A
N°	635	Domanda	Il farmacista è tenuto ad inviare una delle copie della richiesta di approvvigionamento di stupefacenti della Tabella II Sez. A B e C presentata da medici o direttori sanitari di ospedali o case di cura sprovvisti di farmacia interna	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	all'Autorità di pubblica sicurezza al Ministero della Salute all'AIFA il farmacista non ha alcun obbligo al riguardo alla A.S.L. di appartenenza	Risposta esatta	E
N°	634	Domanda	A quali macromolecole circolanti si legano prevalentemente i farmaci:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	alfa-glicoproteine acide albumina gamma-globuline lipoproteine beta-globuline	Risposta esatta	B
N°	636	Domanda	Il linezolid esercita azione:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	ipolidemizante antibatterica diuretica antiaritmica antipertensiva	Risposta esatta	B



\dot{N}

637

Domanda Se la biotrasformazione di un farmaco viene inibita, quale dei parametri farmacocinetici elencati viene prevalentemente modificato:


- ☐ **A** volume apparente di distribuzione
 - ☐ **B** enivita di distribuzione
 - ☐ **C** velocita di assorbimento
 - ☐ **D** enivita di eliminazione
 - ☐ **E** le costanti di velocita di distribuzione

Risposta esatta D

 \dot{z}

639

Domanda Molti barbiturici si differenziano per la natura dei gruppi sostituenti sul carbonio 5. Da cosa NON possono essere costituiti i due sostituenti R1 ed R2 del carbonio 5?



- ☐ A etile

☐ B idrogeno

☐ C fenile

☐ D cicloesene

☐ E alchile ramificato

Risposta esatta

 \dot{N}

638

Domanda Quale dei seguenti farmaci è agonista diretto dei recettori muscarinici?

- A** betanecolo
- B** neostigmina
- C** fisostigmina
- D** galantamina
- E** succinilcolina

Risposta esatta A

 \dot{N}

640


Domanda Quale farmaco, tra quelli riportati, è più indicato nella terapia della sindrome ossessivo-compulsiva?


- A** inibitore della captazione neuronale della serotonina
- B** barbiturico
- C** antiepilettico
- D** neurolettico fenotiazinico
- E** inibitore dell'acetilcolinesterasi

Risposta esatta A

N°	641	Domanda	Non sono erogabili a carico del SSN i prodotti dietetici destinati a soggetti affetti da:		N°	643	Domanda	Il rapporto tra servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private è disciplinato da accordi a livello		
			<div><div>A</div>rettocolite ulcerosa</div>					<div><div>A</div>regionale ed aventi durata triennale</div>		
			<div><div>B</div>cellachia</div>					<div><div>B</div>provinciale ed aventi durata biennale</div>		
			<div><div>C</div>fibrosi cistica</div>					<div><div>C</div>nazionale ed aventi durata biennale</div>		
			<div><div>D</div>fenilketonuria</div>					<div><div>D</div>regionale ed aventi durata biennale</div>		
			<div><div>E</div>galattosemia</div>					<div><div>E</div>nazionale ed aventi durata triennale</div>		
				Risposta esatta	A				Risposta esatta	E


N°	642	Domanda	Il termine "mesitato" si riferisce ad un controllo di basi poco solubili; tale termine è sinonimo di		N°	644	Domanda	Da quale precursore deriva il GABA avente la struttura indicata		
			<div><div>A</div>dodecil solfato</div>					<div><div>A</div>collina</div>		
			<div><div>B</div>metansolfonato</div>					<div><div>B</div>triptofano</div>		
			<div><div>C</div>benzensolfonato</div>					<div><div>C</div>acido glutammico</div>		
			<div><div>D</div>toluensolfonato</div>					<div><div>D</div>istidina</div>		
			<div><div>E</div>metilsolfato</div>					<div><div>E</div>serina</div>		
				Risposta esatta	B				Risposta esatta	C



N°	645	Domanda	Il pancuronio bromuro, avente la struttura indicata, è un bloccante neuromuscolare in quanto	N°	647	Domanda	Quale particolare "modello" di registro deve essere adottato dal farmacista per i movimenti di entrata e uscita degli stupefacenti della tabella II sezione A, B e C?
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>blocca in modo competitivo il recettore nicotinico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>blocca in modo depolarizzante il recettore nicotinico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>stimola il recettore muscarinico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>blocca i canali del K⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>inibisce l'acetilcolinesterasi</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>nessuno</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>quello stabilito dall'Autorità Regionale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>quello stabilito dal Ministero della Salute</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>quello stabilito dall'Ordine dei Farmacisti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>quello scelto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato</div></div>	
		Risposta esatta	A			Risposta esatta	C
N°	646	Domanda	Gli enzimi di fase I responsabili della biotrasformazione di un farmaco catalizzano reazioni di:	N°	648	Domanda	I farmaci orfani sono:
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ossidazione o idrolisi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>conjugazione con acido glucuronico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>fosforilazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>conjugazione con il tripeptide glutatone</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>alchilazione</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>farmaci utilizzati per le malattie rare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>farmaci il cui brevetto è scaduto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>farmaci di cui non si conosce il meccanismo d'azione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>farmaci privi dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>farmaci la cui somministrazione nelle donne richiede particolari precauzioni</div></div>	
		Risposta esatta	A			Risposta esatta	A



N°	649	Domanda	Quale dei seguenti effetti costituisce l'azione terapeutica più importante dei farmaci antagonisti istaminici H2?	<div><div><div>A</div></div><div>regolazione del sistema cardiovascolare</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>potenziamento delle risposte immunitarie</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>riduzione della secrezione gastrica</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>azione anti-nausea e antiemetica</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>anestesia locale</div></div>	Risposta esatta	C
N°	650	Domanda	Quale tra i seguenti farmaci si usa nella profilassi dell'asma allergico e agisce stabilizzando i mastociti?	<div><div><div>A</div></div><div>Aminofillina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Ipratropio</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Zafirlukast</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Cromoglicato di sodio</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Adrenalina</div></div>	Risposta esatta	D
N°	651	Domanda	E' consentito al farmacista esporre in farmacia avvisi relativi a studi privati di medici, odontoiatri o di altri sanitari?	<div><div><div>A</div></div><div>si, sempre</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>no, mai</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>si, previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Locale</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>si, ma solo medici od odontoiatri</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>si, previa nulla osta dell'Ordine</div></div>	Risposta esatta	B
N°	652	Domanda	La cocaina, avente la struttura indicata, interferisce sulla trasmissione noradrenergica in quanto	<div><div><div>A</div></div><div>stimola direttamente i recettori alfa adrenergici</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>stimola direttamente i recettori beta adrenergici</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>inibisce il catabolismo della noradrenalina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>inibisce il reuptake neuronale della noradrenalina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>libera noradrenalina dai terminali sinaptici</div></div>	Risposta esatta	D




N°	653	<div><div></div><div>Domanda La fenitoina sale di sodio è il composto rappresentato dalla struttura indicata. La sua attività farmacologica è</div></div>	<div><div>A</div>antiepilettica</div> <div><div>B</div>più di una di quelle indicate</div> <div><div>C</div>antiaritmica</div> <div><div>D</div>ipnotica</div> <div><div>E</div>tranquillante</div>	Risposta esatta B
N°	654	<div><div></div><div>Domanda Le autorizzazioni alla pubblicità dei dispositivi medici hanno validità di:</div></div>	<div><div>A</div>24 mesi</div> <div><div>B</div>12 mesi</div> <div><div>C</div>24 mesi, fatta salva la possibilità del Ministero della Salute di stabilire un periodo di validità più breve, in relazione delle caratteristiche del messaggio divulgato</div> <div><div>D</div>5 anni</div> <div><div>E</div>illimitata</div>	Risposta esatta C
N°	655	<div><div></div><div>Domanda Quale, tra gli enzimi seguenti, NON partecipa alla formazione dei neurotrasmettitori adrenergici nell'organismo?</div></div>	<div><div>A</div>istidin decarbossilasi</div> <div><div>B</div>tirosina idrossilasi</div> <div><div>C</div>dopamina beta-idrossilasi</div> <div><div>D</div>DOPA decarbossilasi</div> <div><div>E</div>feniletanolammina N-metiltransferasi</div>	Risposta esatta A
N°	656	<div><div></div><div>Domanda Quale dei seguenti è un ormone prodotto dalla neuropofisi?</div></div>	<div><div>A</div>Vasopressina</div> <div><div>B</div>Prolattina</div> <div><div>C</div>Ormone della crescita</div> <div><div>D</div>Ormone tireostimolante</div> <div><div>E</div>nessuno di quelli indicati</div>	Risposta esatta A

N°	657	Domanda La d-tubocurarina compete con l'acetilcolina per il sottotipo N2 di recettore nicotinico della placca neuromuscolare determinando:	<div><div><div><div>A</div><div>depolarizzazione della placca per entrata di Na+</div></div><div><div>B</div><div>stabilizzazione della placca neuromuscolare con blocco del canale del Na+</div></div><div><div>C</div><div>iperpolarizzazione della placca per uscita di K+</div></div><div><div>D</div><div>iperpolarizzazione della placca per entrata di Cl-</div></div><div><div>E</div><div>depolarizzazione della placca per entrata di Ca2+</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	659	Domanda Il tipo di reazione a farmaci provocata dalla penicillina è:	<div><div><div><div>A</div><div>una sindrome autoimmune</div></div><div><div>B</div><div>una reazione cellulo-mediata</div></div><div><div>C</div><div>una allergia a farmaci di tipo II</div></div><div><div>D</div><div>mediata da IgE</div></div><div><div>E</div><div>malattia da siero</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	660	Domanda Quali medicinali iniettabili possono essere consegnati dal farmacista senza presentazione di ricetta medica per la necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa per la consegna di medicinali in caso di necessità e urgenza?	<div><div><div><div>A</div><div>tutti gli antibiotici monodose</div></div><div><div>B</div><div>solo l'insulina</div></div><div><div>C</div><div>tutti gli antibiotici</div></div><div><div>D</div><div>i farmaci per patologie cardiovascolari</div></div><div><div>E</div><div>gli antidolorifici</div></div></div></div>	Risposta esatta	A



N°	661	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti è ERRATA: le competenze professionali dei farmacista prevedono, tra le altre,		N°	663	Domanda	Il polimorfismo è un fenomeno per cui una sostanza	
		<input type="checkbox"/> A	la spedizione dei medicinali				<input type="checkbox"/> A	può presentare denominazioni comuni italiane diverse	
		<input type="checkbox"/> B	l'informazione sui medicinali				<input type="checkbox"/> B	può generare cristalli molto simili a quelli di un'altra sostanza	
		<input type="checkbox"/> C	il prelievo di sangue capillare per la determinazione della glicemia				<input type="checkbox"/> C	può formare soluzioni solide con cristalli di altre sostanze	
		<input type="checkbox"/> D	la preparazione dei medicinali				<input type="checkbox"/> D	presenta, quando si trova in miscela con un'altra sostanza qualsiasi un punto eutettico	
		<input type="checkbox"/> E	il consiglio sui medicinali				<input type="checkbox"/> E	può presentarsi in due o più forme cristalline	
			Risposta esatta	C				Risposta esatta	E
N°	662	Domanda	Come deve compiersi la chiusura giornaliera del registro entrata e uscita stupefacenti?		N°	664	Domanda	La paralisi flaccida causata dalla tossina botulinica è dovuta a:	
		<input type="checkbox"/> A	la chiusura non è giornaliera, ma è mensile				<input type="checkbox"/> A	inibizione dell'enzima acetilcolinesterasi a livello della placca neuromuscolare	
		<input type="checkbox"/> B	annullando tutti gli spazi vuoti				<input type="checkbox"/> B	blocco della liberazione di Ach dalle terminazioni nervose colinergiche	
		<input type="checkbox"/> C	annotando i dati riassuntivi di entrate, uscite e giacenze				<input type="checkbox"/> C	blocco della sintesi di acetilcolina a livello del motoneurone presinaptico	
		<input type="checkbox"/> D	annotando le sole giacenze				<input type="checkbox"/> D	blocco della trasmissione a livello dei terminali inibitori nel midollo spinale	
		<input type="checkbox"/> E	la chiusura non è giornaliera, ma annuale				<input type="checkbox"/> E	interazione con i recettori nicotinici a livello della placca neuromuscolare	
			Risposta esatta	E				Risposta esatta	B




N°	665	Domanda	Quale delle sostanze sotto indicate ha una attività antimicrobica dovuta alla sua azione tensioattiva	<div><div><div>A</div></div><div>acqua ossigenata</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>acido pipemidico</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>permanganato di potassio</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>polimixina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>cellipiridino cloruro</div></div>	Risposta esatta	E
N°	667	Domanda	Quale delle affermazioni riguardanti i saponi è ERRATA	<div><div><div>A</div></div><div>i saponi si preparano comunemente dai grassi vegetali</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>i saponi si preparano comunemente dagli oli minerali</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>i saponi si preparano comunemente dai grassi animali</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>i saponi anionici comuni presentano, in soluzione acquosa, un pH superiore a 7</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>il pH delle soluzioni dei saponi contenenti sodio è basico</div></div>	Risposta esatta	B
N°	666	Domanda	Indicare per quale, tra i seguenti sistemi enzimatici, è più noto il fenomeno del polimorfismo genetico:	<div><div><div>A</div></div><div>Citocromo P450 ossidoreduttasi (CYP450)</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Acetil coenzima A</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Idrossilasi</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Tirosin chinasi</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle risposte è corretta</div></div>	Risposta esatta	A
N°	668	Domanda	Gli antibiotici polienici (quali nistatina ed amfotericina) aventi struttura del tipo di quella indicata agiscono	<div><div><div>A</div></div><div>legandosi agli steroli della membrana e alterando le funzioni della stessa</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>bloccando la sintesi degli steroli di membrana</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>formando canali spuri che alterano l'omeostasi degli ioni</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>disaccoppiando recettori di membrana ed effettori</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>alterando il trasporto del glucosio attraverso la membrana</div></div>	Risposta esatta	A



N°	669	Domanda	A chi va trasmessa la copia azzurra della ricetta medica veterinaria in triplice copia?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>alla A.S.L. dove ha sede l'utilizzatore finale</div><div>alla A.S.L. dove ha sede la farmacia</div><div>al servizio farmaceutico della Regione</div><div>all'Ordine Provinciale dei Farmacisti</div><div>a nessuno di quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	A
N°	671	Domanda	Un antagonismo farmacologico recettoriale non competitivo è caratterizzato da:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>aumento dell'effetto massimo dell'agonista</div><div>aumento dell'affinità dell'agonista per il recettore</div><div>diminuzione dell'effetto massimo dell'agonista</div><div>nessuna variazione dell'effetto massimo dell'agonista</div><div>reversibilità dell'antagonismo con l'aumento della dose di agonista</div></div>	Risposta esatta	C

N°	670	Domanda	Quale antidoto è più indicato nell'avvelenamento da muscarina?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>Flumazenil</div><div>Belanecolo</div><div>Pilocarpina</div><div>Atropina</div><div>d-Tubocurarina</div></div>	Risposta esatta	D
N°	672	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti riguardanti la mesalazina, avente la struttura indicata, è ERRATA?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>viene utilizzata, per via sistemica, nella terapia antitubercolare</div><div>sono in commercio specialità medicinali che contengono il corrispondente profarmaco</div><div>e' un isomero dell'acido paraaminosalicico (PAS)</div><div>viene utilizzata nel trattamento delle malattie infiammatorie intestinali</div><div>e' un derivato dell'acido salicilico</div></div>	Risposta esatta	A






N°	673	Domanda	I barbiturici agiscono:	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div>prolungando il tempo di apertura del canale ionoforo per lo ione Cl-</div></div><div>B</div></div><div><div><div>bloccando i canali del Na+ voltaggio dipendenti</div></div><div>C</div></div><div><div><div>bloccando i canali del Ca2+ di tipo T</div></div><div>D</div></div><div><div><div>antagonizzando il GABA sul suo recettore GABA-A</div></div><div>E</div></div><div><div><div>antagonizzando il GABA sul suo recettore GABA-B</div></div><div></div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>A</div>
N°	674	Domanda	Contro l'emofilia si usa:	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div>warfarina</div></div><div>B</div></div><div><div><div>inulina</div></div><div>C</div></div><div><div><div>fattore VII</div></div><div>D</div></div><div><div><div>cumarine</div></div><div>E</div></div><div><div><div>Acido acetilsalilico</div></div><div></div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>C</div>

N°	675	Domanda	Gli effetti cardiaci diretti della dobutamina, avente la struttura indicata, potrebbero essere bloccati da:	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div>metoprololo</div></div><div>B</div></div><div><div><div>clonidina</div></div><div>C</div></div><div><div><div>isoproterenolo</div></div><div>D</div></div><div><div><div>yolimbina</div></div><div>E</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>
N°	676	Domanda	Per l'analisi dell'olio di ricino quale dei seguenti indici NON viene riportato in F.U.?	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div>indice di acidità</div></div><div>B</div></div><div><div><div>indice di esteri</div></div><div>C</div></div><div><div><div>indice di iodio</div></div><div>D</div></div><div><div><div>indice di perossidi</div></div><div>E</div></div><div><div><div>Indice di saponificazione</div></div><div></div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>

N°	Domanda	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
677	Il glucosio viene assorbito per:		679	Di quante pagine deve essere composto il registro entrata e uscita stupefacenti delle farmacie?		
	<input type="checkbox"/> A diffusione acquosa			<input type="checkbox"/> A 350		
	<input type="checkbox"/> B diffusione lipidea			<input type="checkbox"/> B 100		
	<input type="checkbox"/> C trasporto attivo			<input type="checkbox"/> C del numero di pagine adeguato alle movimentazioni della farmacia		
	<input type="checkbox"/> D flusso di massa			<input type="checkbox"/> D 180		
	<input type="checkbox"/> E diffusione facilitata			<input type="checkbox"/> E 160		
						Risposta esatta C


N°	Domanda	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
678	Le "co-beta-lattamine" sono		680	Quale dei farmaci elencati può provocare allucinazioni		
	<input type="checkbox"/> A copolimeri degli antibiotici beta-lattamici			<input type="checkbox"/> A le fenotiazine		
	<input type="checkbox"/> B cofattori essenziali per la vita cellulare			<input type="checkbox"/> B l'acido acetilsalilico		
	<input type="checkbox"/> C associazioni di antibiotici beta-lattamici			<input type="checkbox"/> C la meperidina		
	<input type="checkbox"/> D derivati dell'acido lattico			<input type="checkbox"/> D la indometacina		
	<input type="checkbox"/> E tautomeri dei lattimi			<input type="checkbox"/> E la metformina		
						Risposta esatta C




N°	681	Domanda	La tossicità cronica di fenacetina (I), paracetamolo (II) ed acetaminide (III) è dovuta alla			
				<div><input type="radio"/> A deaminazione del gruppo -NH2 liberatosi per idrolisi metabolica</div> <div><input type="radio"/> B alchilazione del gruppo -OH presente o di origine metabolica</div> <div><input type="radio"/> C formazione di una chinonimina per metabolismo ossidativo</div> <div><input type="radio"/> D formazione di epossidi</div> <div><input type="radio"/> E formazione di radicali liberi</div>	Risposta esatta	C
			<div>(I) $R = OC_2H_5$</div> <div>(II) $R = OH$</div> <div>(III) $R = H$</div>			
N°	682	Domanda	Bevacizumab è utilizzato come:			
			<div><input type="radio"/> A anticoagulante</div> <div><input type="radio"/> B antivirale</div> <div><input type="radio"/> C antitumorale</div> <div><input type="radio"/> D antipertensivo</div> <div><input type="radio"/> E antilucera</div>		Risposta esatta	C
N°	683	Domanda	La pravadatina sale di sodio, avente la struttura indicata, è:			
				<div><input type="radio"/> A un antidiabetico orale</div> <div><input type="radio"/> B una penicillina di terza generazione</div> <div><input type="radio"/> C un inibitore dell'amilasi</div> <div><input type="radio"/> D un inibitore della sintesi endogena del colesterolo</div> <div><input type="radio"/> E un inibitore della sintesi endogena degli acidi grassi</div>	Risposta esatta	D
N°	684	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "oblo" nella Denominazione Comune?			
			<div><input type="radio"/> A beta-bloccanti adrenergici</div> <div><input type="radio"/> B Antiepilettici di tipo Idantolico</div> <div><input type="radio"/> C Ansiolitici di tipo benzodiazepinico</div> <div><input type="radio"/> D Ormoni estrogeni</div> <div><input type="radio"/> E Antistaminici H2</div>		Risposta esatta	A

N°	685	Domanda	I messaggeri chimici si formano da sostanze che vengono immesse nell'organismo con la dieta. Da quale precursore deriva la noradrenalina?	N°	687	Domanda	Un batterio ricombinante è
		<div><div>A</div>istidina</div>				<div><div>A</div>un batterio derivante da una singola cellula genitrice</div>	
		<div><div>B</div>acido glutammico</div>				<div><div>B</div>un batterio capace di combinarsi con un altro batterio</div>	
		<div><div>C</div>tirosina</div>				<div><div>C</div>un batterio con DNA di diversa origine</div>	
		<div><div>D</div>colina</div>				<div><div>D</div>un batterio privo di DNA</div>	
		<div><div>E</div>triptofano</div>				<div><div>E</div>un batterio resistente a tutti gli antibiotici</div>	
		Risposta esatta	C			Risposta esatta	C


N°	686	Domanda	Nelle passività della situazione patrimoniale del bilancio di una farmacia sono presenti:	N°	688	Domanda	I medicinali contenenti stupefacenti e spedibili con RR sono soggetti al
		<div><div>A</div>mezzi propri</div>				<div><div>A</div>DPR 309/90 Tab. II Sez. A</div>	
		<div><div>B</div>il TFR accantonato per il personale</div>				<div><div>B</div>DPR 309/90 Tab.II Sez. C</div>	
		<div><div>C</div>i fondi di ammortamento</div>				<div><div>C</div>DPR 309/90 Tab.II Sez. D</div>	
		<div><div>D</div>i pagamenti da effettuare ai fornitori</div>				<div><div>D</div>DPR 309/90 Tab.II Sez. E</div>	
		<div><div>E</div>più di una indicazione è corretta</div>				<div><div>E</div>a nessuno dei riferimenti citati</div>	
		Risposta esatta	E			Risposta esatta	D




N°	689	Domanda L'amiloride si differenzia dagli altri diuretici K ⁺ -risparmiatori per il suo meccanismo d'azione che consiste nell'inibire	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>l'anidresi carbonica</div><div>il cotrasporto Na⁺, K⁺, 2Cl⁻</div><div>il cotrasporto Na⁺, Cl⁻</div><div>i canali del Na⁺ nella membrana apicale del tubulo collettore</div><div>i meccanismi di concentrazione controcorrente dell'urina</div></div>		
				Risposta esatta	D
N°	690	Domanda I cosmetici possono garantire la protezione totale dai raggi UV?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>no, mai</div><div>solo quelli che riportano l'indicazione "Sun block" in etichetta</div><div>solo quelli che riportano l'indicazione "Protezione Totale" in etichetta</div><div>solo se contengono gli ingredienti riportati nell'Allegato V della Legge 71/386.</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div>		
				Risposta esatta	A
N°	691	Domanda Il rischio di emorragia in pazienti trattati con eparina è aumentato dall'aspirina perché essa:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>inibisce la funzione plastrinica</div><div>ne antagonizza l'effetto</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div><div>favorisce la sintesi delle prostaglandine</div><div>favorisce la formazione di trombi</div></div>		
				Risposta esatta	A
N°	692	Domanda Quali sono le possibili conseguenze tossicologiche dell'inibizione enzimatica?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>aumento della tossicità per riduzione dell'eliminazione</div><div>diminuzione della tossicità per ridotta formazione di metaboliti tossici</div><div>Più di una indicazione è corretta</div><div>non ci sono conseguenze tossicologiche</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>		
				Risposta esatta	C




N°	693	Domanda	L'imatinib è un farmaco usato nella terapia:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>del dolore cronico</div><div>delle artrosi</div><div>della leucemia mieloide cronica</div><div>dei tumori al seno</div><div>per nessuna di queste patologie</div></div></div>	Risposta esatta	C	
N°	695	Domanda	Il fenobarbitale interferisce con molti farmaci. In particolare diminuisce i livelli plasmatici di:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>carbamazepina</div><div>sodio valproato</div><div>warfarina</div><div>fenilina</div><div>tutti quelli indicati</div></div></div>	Risposta esatta	E	
N°	694	Domanda	La Farmacopea Italiana e l'art. 14 del D.P.R. 309/90 riportano alcune Tabelle correlate agli adempimenti professionali del farmacista. Quale delle seguenti affermazioni è esatta	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>sia le tabelle del DPR 309/90 che della Farmacopea Ufficiale sono individuate da numeri romani</div><div>le Tabelle del D.P.R. n. 309/1990 sono contraddistinte da numeri romani e Sezioni in lettere dell'alfabeto</div><div>le Tabelle della Farmacopea Ufficiale sono sei</div><div>il DPR n. 309/1990 contiene gli Allegati I, II e III bis</div><div>sia le Tabelle della Farmacopea Ufficiale che quelle del DPR 309/90 sono sette</div></div></div>	Risposta esatta	B	
N°	696	Domanda	Quante sono le tabelle della Farmacopea Ufficiale?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>quattro</div><div>cinque</div><div>sei</div><div>sette</div><div>otto</div></div></div>	Risposta esatta	E	



N°	697	Domanda	Un farmacista che abbia ceduto le proprie quote di una società per la gestione di una farmacia privata può partecipare ad un concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>non prima di dieci anni</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>non prima di cinque anni se aveva una quota minoritaria e non prima di dieci anni se aveva una quota maggioritaria</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>immediatamente</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>decorsi tre anni dalla vendita</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>decorsi sei mesi dalla vendita</div>	Risposta esatta C
N°	699	Domanda	L'associazione di nitrati organici e farmaci beta-antagonisti è utile nell'angina pectoris in quanto i beta-antagonisti diminuiscono il tempo di perfusione coronarica	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>beta-antagonisti diminuiscono il tempo di perfusione coronarica</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>nitrati correggono la bradicardia da beta-blocco</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>beta-antagonisti diminuiscono il ritorno venoso</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>beta-antagonisti correggono la tachicardia riflessa provocata da nitrati</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nitrati correggono l'inotropismo negativo da beta-blocco</div>	Risposta esatta D

N°	700	Domanda	I derivati della 8-idrossichinolina quali quello riportato in figura appartengono alla classe dei farmaci	
		<div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antimalarici</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>antitumorali</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>antimicrobici</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>radioopacizzanti</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>anestetici generali</div>	Risposta esatta C



N°	701	Domanda	In caso di shock anafilattico quale dei seguenti è un farmaco salvavita?		N°	703	Domanda	Il farmacista è tenuto ad indicare la data entro la quale deve essere impiegato il preparato magistrale allestito in farmacia?	
		<div><div>A</div>Propanobolo</div>					<div><div>A</div>no, solo su indicazione del medico</div>		
		<div><div>B</div>Prednisone</div>					<div><div>B</div>sì, sempre</div>		
		<div><div>C</div>Adrenalina</div>					<div><div>C</div>no, mai</div>		
		<div><div>D</div>Tedilina</div>					<div><div>D</div>sì, ma solo qualora si tratti di sostanze velenose</div>		
		<div><div>E</div>Nedocromile</div>					<div><div>E</div>sì, ma solo se si tratta di sostanze ad azione stupefacente</div>		
			Risposta esatta C					Risposta esatta B	
N°	702	Domanda	Alcuni farmaci agiscono come antagonisti indiretti di neurotrasmettitori in quanto inibiscono gli enzimi che, nell'organismo, intervengono nei processi di sintesi dei trasmettitori stessi. Quale, tra le coppie farmaco - enzima sotto elencate, rappresenta l'enzima ed il corrispondente inibitore?		N°	704	Domanda	Quale dei prodotti sotto elencati può essere impiegato come agente correttore di acidità nella preparazione delle forme farmaceutiche liquide che devono presentare valori di pH analoghi a quelli dei liquidi biologici	
		<div><div>A</div>(Disulfiram) - (aromatico L-amminoacido decarbossilasi)</div>					<div><div>A</div>citrato di sodio</div>		
		<div><div>B</div>(p-Clorofenilalanina) - (triptofano 5-idrossilasi)</div>					<div><div>B</div>dietililalato</div>		
		<div><div>C</div>(Selegilina) - (aldeide deidrogenasi mitocondriale)</div>					<div><div>C</div>acetato di sodio</div>		
		<div><div>D</div>(Carbidopa) - (tirosina idrossilasi)</div>					<div><div>D</div>fosfato monobasico di potassio</div>		
		<div><div>E</div>(Benserazide) - (transpeptidasi)</div>					<div><div>E</div>tutti quelli indicati, tranne uno</div>		
			Risposta esatta B					Risposta esatta E	




N°	705	Domanda	Quale, dei farmaci elencati, può potenziare gli effetti delle sulfoniluree?	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>fenitoina</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>diazossido</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>glucocorticoidi</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>eparina</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>fibrati</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	707	Domanda	La chinidina, avente la struttura indicata, è un farmaco utilizzato come:	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>antimalarico</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>rilassante della muscolatura liscia</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>antagonista opiaceo</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>antiaritmico</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>antipertensivo</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	706	Domanda	Una siringa preimpressa con soluzione di NaCl 0,9% destinata dal fabbricante al lavaggio di dispositivi medici come ad esempio i cateteri è:	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>un farmaco di cui la siringa costituisce il contenitore primario</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>un dispositivo medico</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>un dispositivo medico combinato con farmaco</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>una confezione contenente un farmaco ed un dispositivo</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>un presidio medico-chirurgico</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	708	Domanda	Derivati dell'acido Lisergico possono trovare impiego come	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>antiemicrania</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>antiParkinson</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>emostatici uterini</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div></div>	Risposta esatta	E

N°	713	Domanda	L'etilnistradiolo differisce dall'estradiolo per:		N°	715	Domanda	Quale tra i farmaci elencati può indurre vomito?	
			<div><div>A</div>la chiralità al carbonio 17</div>	<div><div>A</div>displatino</div>					
			<div><div>B</div>la presenza in posizione 17 di un etinile</div>	<div><div>B</div>levodopa</div>					
			<div><div>C</div>la stereochimica della giunzione tra gli anelli C e D</div>	<div><div>C</div>apomorfina</div>					
			<div><div>D</div>tutti i motivi menzionati</div>	<div><div>D</div>bronociprina</div>					
			<div><div>E</div>l'aromaticità dell'anello A</div>	<div><div>E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>					
									Risposta esatta E
N°	714	Domanda	Al sensi della Legge 713/86 chiunque intenda produrre o confezionare in proprio i prodotti cosmetici:		N°	716	Domanda	Qual è lo sterole la cui sintesi viene inibita da molti farmaci antifungini?	
			<div><div>A</div>deve darne comunicazione scritta almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività al Ministero della Salute e alla Regione competente.</div>	<div><div>A</div>Colesterolo</div>					
			<div><div>B</div>nessuna indicazione è corretta</div>	<div><div>B</div>Sigmasterolo</div>					
			<div><div>C</div>deve darne comunicazione scritta entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'attività al Ministero della Salute e alla Regione</div>	<div><div>C</div>Ergosterolo</div>					
			<div><div>D</div>deve darne comunicazione scritta almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità</div>	<div><div>D</div>Corisolo</div>					
			<div><div>E</div>deve darne comunicazione scritta almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività alla Regione e all'Istituto Superiore di Sanità</div>	<div><div>E</div>Sioosterolo</div>					
									Risposta esatta C



N°	717	Domanda	Il farmacista è tenuto ad annotare sull'etichetta di preparazioni galeniche allestite in farmacia, se l'impiego del medicinale è per "uso esterno"?		N°	719	Domanda	Quale, tra gli enzimi seguenti, NON partecipa alla formazione della melatonina nell'organismo?		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>non è obbligatorio</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>si, sempre</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>si, ma soltanto ove possano sorgere dubbi sull'uso del medicinale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>si, ma solo per i medicinali del formulario nazionale</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>no, ma è comunque tenuto ad informarne il cliente</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>arilamina acetiltransferasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>acetilserotonina metiltransferasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>più di uno di quelli indicati</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>fenilalaninamina metiltransferasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>triptofan 5-idrossilasi</div>		
				Risposta esatta	B				Risposta esatta	D
N°	718	Domanda	Il principio attivo aripiprazolo può essere classificato come:		N°	720	Domanda	La F.U. definisce un contenitore ermeticamente chiuso quando:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antipsicotico tipico</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>antipsicotico atipico</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>antistaminico H1</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>antagonista adrenergico beta 1</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>tutte le indicazioni sono errate</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>è chiuso per fusione del materiale che lo costituisce</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>è impermeabile a solidi, liquidi e gas in condizioni normali di manipolazione, conservazione e trasporto</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>e' chiuso con un dispositivo che rivela in modo irreversibile se il recipiente è stato aperto</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>contiene una quantità di preparazione destinata ad essere usata tutta in una sola volta</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>		
				Risposta esatta	B				Risposta esatta	B

N°	721	Domanda	Quali è la sequenza completa delle fasi nella preparazione dei medicinali omeopatici:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>ceppo omeopatico, materia prima, diluizione, dinamizzazione</div><div>pianta intera, macerazione, diluizione, dinamizzazione, medicinale omeopatico</div><div>materia prima, materiale di base-ceppo omeopatico, diluizione e dinamizzazione, impregnazione su supporto neutro, medicinale omeopatico</div><div>tutte le sequenze descritte possono portare alla preparazione del medicinale</div><div>nessuna delle sequenze descritte</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	722	Domanda	Il titolare di farmacia può affidare ad un terzo la propria farmacia?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>si, sempre</div><div>no</div><div>si, purché il terzo abbia conseguito la pratica professionale biennale</div><div>si, previa autorizzazione dell'ASL</div><div>si, previa autorizzazione del Sindaco</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	723	Domanda	La farmacocinetica comprende tutte le seguenti fasi, tranne:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>assorbimento</div><div>distribuzione</div><div>interazione recettoriale</div><div>metabolismo</div><div>escrezione</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	724	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti corrisponde maggiormente alla definizione di "pro-farmaco": un farmaco	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>che viene somministrato al posto di un altro farmaco ad esso equivalente</div><div>che ha effetti più duraturi nel tempo</div><div>considerato un placebo</div><div>che deve essere trasformato metabolicamente prima di poter svolgere la sua azione</div><div>che ha la stessa attività farmacologica di un altro farmaco</div></div></div>	Risposta esatta	D




N°	725	Domanda	La dosulepina, avente la struttura riportata a lato, è un farmaco		
					
		<input type="checkbox"/> A	Ca2+-antagonista		
		<input type="checkbox"/> B	antistaminico		
		<input type="checkbox"/> C	ansiolitico		
		<input type="checkbox"/> D	neuroletico		
		<input type="checkbox"/> E	antidepressivo		
			Risposta esatta	E	
N°	726	Domanda	Sono farmaci antitumorali le:		
		<input type="checkbox"/> A	naftaclidine		
		<input type="checkbox"/> B	tetraciclina		
		<input type="checkbox"/> C	antraciclina		
		<input type="checkbox"/> D	esciclidina		
		<input type="checkbox"/> E	pentaciclina		
			Risposta esatta	C	
N°	727	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i diritti addizionali previsti per le preparazioni magistrali è errata? La Tariffa Nazionale dei Medicinali		
		<input type="checkbox"/> A	ne prevede uno valido per le sostanze classificate come stupefacenti		
		<input type="checkbox"/> B	ne prevede uno valido per le sostanze inserite nella Tab.3 F.U.		
		<input type="checkbox"/> C	ne prevede uno valido per le sostanze manifestamente tossiche		
		<input type="checkbox"/> D	ne prevede uno valido per le sostanze corrosive o coloranti		
		<input type="checkbox"/> E	ne prevede solamente uno valido applicabile quando vengono superati i dosaggi della Tab.8 della F.U.		
			Risposta esatta	E	
N°	728	Domanda	Quale dei sali indicati deve essere utilizzato come isotonizzante in un preparato galenico riguardante un collirio a base di nitrato di argento?		
		<input type="checkbox"/> A	cloruro di potassio		
		<input type="checkbox"/> B	cloruro di sodio		
		<input type="checkbox"/> C	solfato di sodio		
		<input type="checkbox"/> D	nitrato di potassio		
		<input type="checkbox"/> E	lisina cloridrato		
			Risposta esatta	D	

N°	729	Domanda	Qualora il medicinale prescritto sia irripetibile nel normale ciclo distributivo, o la farmacia ne risulti sprovvista, il farmacista può consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si, purché non in forma iniettabile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si, ad eccezione dei farmaci che richiedono una prescrizione non ripetibile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, purché di prezzo inferiore a medicinale prescritto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>no</div></div>	Risposta esatta	C
N°	731	Domanda	I farmaci sotto indicati appartengono tutti alla classe delle catecolammine, con l'ECCEZIONE di:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>noradrenalina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dopamina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>isoproterenolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>amfetamina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>adrenalina</div></div>	Risposta esatta	D
N°	732	Domanda	La procaina, avente la struttura indicata, si comporta da anestetico locale in quanto	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>blocca i canali al Ca²⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>apre i canali al Na⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>blocca i canali al Na⁺ nello stato di apertura ed inattivazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>blocca i canali al Cl⁻</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>apre i canali al Cl⁻</div></div>	Risposta esatta	C



N°	733	Domanda	Il dimenidrinato è una sostanza presente in numerosi medicinali utilizzati per i disturbi collegati al movimento. Quale delle affermazioni che riguardano tale sostanza è corretta		N°	735	Domanda	La ricetta di un preparato galenico contenente anabolizzanti della lista delle sostanze vietate per doping:	
		<input type="checkbox"/> A	ha proprietà antitrombotiche				<input type="checkbox"/> A	deve obbligatoriamente riportare l'assunzione di responsabilità da parte del medico	
		<input type="checkbox"/> B	presenta anche effetti antistaminici H1				<input type="checkbox"/> B	è sempre ripetibile	
		<input type="checkbox"/> C	i medicinali che la contengono si possono dispensare senza ricetta				<input type="checkbox"/> C	va inviata alla A.S.L. entro 30 giorni dalla data di spedizione	
		<input type="checkbox"/> D	i medicinali che la contengono possono indurre sonnolenza				<input type="checkbox"/> D	ha tre mesi di validità	
		<input type="checkbox"/> E	le indicazioni date sono tutte corrette				<input type="checkbox"/> E	va trattenuta per ulteriori 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo alla trasmissione dei dati al Ministero	
			Risposta esatta	E				Risposta esatta	E


N°	734	Domanda	Al sensi della Legge 713/86 per durata minima del prodotto cosmetico si intende		N°	736	Domanda	L'adrenalina è il farmaco d'elezione nello shock anafilattico. Quale azione NON le è propria	
		<input type="checkbox"/> A	il periodo entro il quale il prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e mantiene le sue caratteristiche di sicurezza				<input type="checkbox"/> A	broncocostrizione	
		<input type="checkbox"/> B	dodici mesi dall'apertura della confezione				<input type="checkbox"/> B	aumento della forza di contrazione cardiaca	
		<input type="checkbox"/> C	sei mesi dall'apertura della confezione				<input type="checkbox"/> C	aumento del tono vasale	
		<input type="checkbox"/> D	tre mesi dall'apertura della confezione				<input type="checkbox"/> D	aumento della frequenza cardiaca	
		<input type="checkbox"/> E	quella stabilita dall'Istituto Superiore di Sanità				<input type="checkbox"/> E	aumento della pressione arteriosa	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	A



N°	737	Domanda	Il meccanismo d'azione dei glitazoni consiste in:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>blocco del recettore delle LDL</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>stimolazione dell'adenilato ciclas</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>interazione diretta col recettore insulinico</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>interazione con il recettore PPAR-gamma (peroxisome proliferator-activated receptor)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>blocco del canale ionico voltaggio dipendente del calcio</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	739	Domanda	Gli inibitori delle MAO NON si devono mai associare con	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antidepressivi triciclici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sulfamidici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>penicillina</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>aspirina</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>beta-bloccanti</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	740	Domanda	L'uso delle statine nelle donne in gravidanza e allattamento	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>non ha nessuna controindicazione</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è sconsigliato</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è consigliato</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è sconsigliato dopo il primo parto</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	738	Domanda	Quale dei seguenti è un effetto collaterale dell'iperdosaggio di chinino?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>vertigini</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>crampi addominali</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>somnolenza</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>oliguria</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>edema</div></div></div></div>	Risposta esatta	A




N°	741	Domanda	Il medico può apporre sulla ricetta l'indicazione di non sostituibilità del medicinale prescritto?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si, sempre</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no, mai</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, solo per i medicinali appartenenti alla classe A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, solo per i medicinali appartenenti alla classe C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si, ma solo se non si tratta di un medicinale generico</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>A</div>
N°	742	Domanda	Il richiamo dal mercato di un dispositivo medico:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>deve essere deciso solo dal fabbricante</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>può essere disposto dal Ministero della Salute</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>può essere disposto anche dagli utilizzatori</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>può essere disposto dall'Istituto Superiore di Sanità</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>può essere disposto dai Carabinieri per la Tutela della Salute-N.A.S.</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>
N°	743	Domanda	Le quote di spetanza sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali equivalenti a carico del SSN sono:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>liberamente determinate d'intesa tra produttori, grossisti e farmacisti</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>stabilite dalla legge</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>stabilite dall'AIFA</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>stabilite dalla Regioni sulla base dei criteri individuati dall'AIFA</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>fisse per i produttori, liberamente determinate d'intesa tra grossisti e farmacisti</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>
N°	744	Domanda	Una delle seguenti è la definizione di DDD, indicare quale:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>dose media del farmaco assunta giornalmente per l'indicazione principale in un paziente adulto (Defined Daily Dose)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dose doppia rispetto alla normale dose terapeutica (Double Daily Dose)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>dose minima per avere un effetto terapeutico senza avere effetti avversi (Defender Daily Dose)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dose di farmaco non assunta dal paziente rispetto a quanto prescritto (Drop Daily Dose)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>costo medio giornaliero in dollari di una terapia (Defined Daily Dollar)</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>A</div>




N°	745	Domanda	Le Tinture Madri (T.M.) per preparazioni omeopatiche sono:	N°	747	Domanda	Per ADI (Acceptable Daily Intake) si intende :
			<div><div><div>A</div></div><div>preparazioni alcoliche ottenute da estratti secchi</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>macerati glicerinati di piante fresche</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>preparazioni di piante rare o selvatiche e comunque non spontanee</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>tutte le preparazioni elencate sono buone per la preparazione della T.M.</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>preparazioni liquide ottenute per l'azione solvente di un veicolo appropriato sulle materie prime</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>la dose giornaliera di farmaco "sicura" per tutta la durata della vita</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>la quantità di sostanza che può essere ingerita ogni giorno per tutta la vita, senza rischio apprezzabile per la salute</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>la dose massima tollerabile per tutta la durata della vita</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>il fattore di sicurezza di un farmaco per tutta la durata della vita</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>
			Risposta esatta E				Risposta esatta B


N°	746	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi provoca una colorazione dei liquidi biologici durante la terapia?	N°	748	Domanda	La cardiotoxicità limita l'utilità clinica di quale dei seguenti antineoplastici?
			<div><div><div>A</div></div><div>bacitracina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>rifampicina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>sulfametossolo</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>omeprazolo</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni date sono corrette</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>Dadnomicina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Doxorubicina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Bleomicina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Cisplatino</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Vincristina</div></div>
			Risposta esatta B				Risposta esatta B




N°	753	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti riguardanti il glucagone è errata	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>la sua attività ipoglicemizzante si protrae per alcune ore</div><div>determina un aumento del rilascio di glucosio</div><div>si usa per le emergenze ipoglicemiche</div><div>possiede azione idrotra positiva</div><div>è un prodotto costituito da una sequenza di 29 amminoacidi</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	754	Domanda	Chi autorizza le farmacie all'acquisto di sostanze stupefacenti?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>il Ministero della Salute</div><div>la Regione</div><div>l'Azienda Sanitaria Locale</div><div>l'autorità di pubblica sicurezza</div><div>non è necessaria alcuna autorizzazione</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	755	Domanda	Quale tra quelle elencate è un'indicazione d'uso della nalazolina?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>malattia da nov/mento</div><div>congestione della congiuntiva</div><div>secchezza oculare</div><div>ipertensione</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	756	Domanda	Quale delle affermazioni sotto riportate e riguardanti il principio attivo che va sotto il nome di algedrato è corretta?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>è un sale di magnesio</div><div>provoca stipsi</div><div>è un gel di idrossido di alluminio</div><div>è un citrato di alluminio e sodio</div><div>più di una delle indicazioni fornite è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta	E



N°	757	Domanda	Quali effetti collaterali può provocare l'uso di nitrati organici?	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div>mal di testa</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div><div>ipertensione posturale</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div><div>nausea</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div><div>polso accelerato</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div><div>tutti quelli citati</div><div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	758	Domanda	<div><chem>[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)OS(=O)(=O)[Na+])c3ccccn3</chem></div> <div>Il piosolfato di sodio, avente la formula indicata, è strutturalmente analogo al bisacodile. Quale delle affermazioni riportate è corretta</div>	<div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div>è un profarmaco che viene idrolizzato a farmaco attivo nello stomaco</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div><div>è un profarmaco che viene idrolizzato a farmaco attivo nel colon</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div><div>la forma di sciroppo in commercio non è utilizzabile in età pediatrica</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div><div>la forma farmaceutica di compresse è preferibile che si disgreghi a livello intestinale</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div><div>è in commercio anche in forma di supposte per impedire l'irritazione gastrica</div><div></div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	759	Domanda	Da quale ente viene rilasciata la qualifica di farmaco orfano?	<div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div>dal Ministero della Salute</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div><div>dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div><div>dall'Agenzia Europea per i Medicinali</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div><div>unicamente dall'Agenzia Italiana del Farmaco</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div><div>dall'Istituto Superiore di Sanità</div><div></div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	760	Domanda	Secondo la legislazione alimentare comunitaria una sostanza o un prodotto vanno considerati come "novel food" quando:	<div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div>non hanno fatto registrare una storia di consumo significativo in ambito comunitario deponente a favore della sicurezza</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div><div>presentano una composizione innovativa</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div><div>sono addizionati con Vitamine e minerali in modo da superare le dosi giornaliere raccomandate (RDA) con le usuali razioni</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div><div>non sono mai stati impiegati come alimenti in Europa e nel resto del mondo</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div><div>sono estratti di piante ammesse come ingredienti alimentari</div><div></div></div></div></div>	Risposta esatta	B

N°	761	Domanda	Le curve dose-risposta riportate, riguardanti un agonista da solo (A) o in presenza di un suo antagonista (B), specificano un antagonismo farmacologico di tipo:		
					
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>non competitivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>misto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>chimico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>competitivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono errate</div></div>	Risposta esatta	A
N°	762	Domanda	L'azione dell'amiodarone sulle correnti ioniche della miocellula ventricolare ha come conseguenza		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un aumento della velocità di conduzione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>un aumento dell'automatismo cardiaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>un aumento del potenziale di membrana</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>una diminuita velocità di ripolarizzazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>una diminuita durata del potenziale d'azione</div></div>	Risposta esatta	D
N°	763	Domanda	L'utilizzazione terapeutica di un principio attivo presuppone in molti casi la presenza di eccipienti necessari per preparare la forma farmaceutica opportuna. Quale, tra le indicazioni seguenti è corretta per il sodio edelato? E'		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un levigante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>un chelante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>un diluente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>un tensioattivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	B
N°	764	Domanda	Quante copie sono previste per buono-acquisto stupefacenti conforme al modello approvato con D.M. 18.12.2006?		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>due copie</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>quattro copie</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>due copie per medicinali dalla Tab. II sez. B e C e tre per quelli della Tabella II sez. A</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tre copie</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tre copie per i medicinali della Tabella II Sez. B e C e quattro copie per quelli della Tabella II Sez. A</div></div>	Risposta esatta	B




N°	765	Domanda	Nella preparazione delle supposte, i polietilenglicoli sono impiegati come
A	eccipienti liposolubili	B	plastificanti
C	basi idrosolubili	D	regolatori del punto di fusione
E	conservanti		
Risposta esatta C			
N°	766	Domanda	Le benzodiazepine provocano:
A	convulsioni	B	ansia
C	dipendenza psichica	D	ipotroidismo
E	amnesia retrograda		
Risposta esatta C			
N°	767	Domanda	Le strutture indicate rappresentano composti utilizzabili come additivi in tecnica farmaceutica. Quale degli accoppiamenti (struttura - caratteristiche) sotto riportati è corretto?
A	(I) - anionica	B	(II) - cationica
C	più di una indicazione è corretta	D	(II) - anionica
E	(III) - anionica		
Risposta esatta C			
N°	768	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce il trimetoprim?
A	sintesi proteica ribosomiale	B	membrana citoplasmatica
C	metabolismo energetico della cellula batterica	D	didrofolato reductasi batterica
E	più di uno		
Risposta esatta E			


N°	Domanda	Risposta esatta
769	Domanda In una preparazione galenica vengono prescritti: Pancreatina, Papaverina cloridrato, Acido fenilellobarbiturico, Sodio bicarbonato. Il preparato	Risposta esatta B
	<p><input type="radio"/> A richiede ricetta medica speciale</p> <p><input type="radio"/> B deve essere dispensato per una terapia non superiore agli otto giorni</p> <p><input type="radio"/> C presenta incompatibilità di tipo farmacologico</p> <p><input type="radio"/> D la tariffazione porta ad un prezzo di 6,60 euro</p> <p><input type="radio"/> E richiede accorgimenti tecnici per la presenza di incompatibilità chimiche</p>	
770	Domanda E' obbligatorio tenere in farmacia un apposito registro di entrata e uscita dei medicinali a base di costituenti del sangue?	Risposta esatta E
	<p><input type="radio"/> A sì, sempre</p> <p><input type="radio"/> B no, mai</p> <p><input type="radio"/> C sì, ma solo per le farmacie ospedaliere</p> <p><input type="radio"/> D sì, ma in alternativa è sufficiente conservare per tre anni gli originali delle ricette</p> <p><input type="radio"/> E sì, ma solo per la fornitura ad ospedali e case di cura</p>	
771	Domanda La forma farmaceutica "sospensione" presenta alcuni vantaggi rispetto ad altre forme di somministrazione. Quale affermazione è errata?	Risposta esatta C
	<p><input type="radio"/> A possono essere facilmente deglutite</p> <p><input type="radio"/> B possono mascherare il sapore sgradevole di un principio attivo</p> <p><input type="radio"/> C sono chimicamente instabili rispetto alla soluzione dello stesso principio attivo</p> <p><input type="radio"/> D possono essere impiegate in una terapia ritardo</p> <p><input type="radio"/> E possono essere impiegate in forme iniettabili</p>	
772	Domanda Su quale dei bersagli elencati agisce la piperacillina, avente la struttura indicata?	Risposta esatta E
	<p><input type="radio"/> A più di uno</p> <p><input type="radio"/> B DNA girasi</p> <p><input type="radio"/> C metabolismo energetico della cellula batterica</p> <p><input type="radio"/> D acidi nucleici della cellula batterica</p> <p><input type="radio"/> E parete cellulare batterica</p>	

N°	773	Domanda	Quale dei seguenti rappresenta un effetto avverso dell'isotretinoina:	<div> <input type="radio"/> A secchezza e prurito delle mucose e della cute </div> <div> <input type="radio"/> B iperglicemia </div> <div> <input type="radio"/> C iperlipidemia </div> <div> <input type="radio"/> D tutte le indicazioni sono corrette </div> <div> <input type="radio"/> E tutte le indicazioni tranne una sono corrette </div>	Risposta esatta	E
N°	774	Domanda	Il sucralfato ha la struttura sotto indicata. Quale delle affermazioni sotto riportate è errata?	<div> <input type="radio"/> A è privo di proprietà antiacide </div> <div> <input type="radio"/> B viene assorbito in misura minima </div> <div> <input type="radio"/> C interagisce con le proteine della superficie ulcerata </div> <div> <input type="radio"/> D forma una pellicola protettiva sull'ulcera gastrica </div> <div> <input type="radio"/> E tutte le risposte sono corrette </div>	Risposta esatta	B

$$R = \text{SO}_3\text{Al}_2(\text{OH})_5$$

N°	775	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni è errata?	<div> <input type="radio"/> A Il fentanyl è un antagonista del recettore oppioido mu </div> <div> <input type="radio"/> B La buprenorfina è un agonista parziale del recettore oppioido mu </div> <div> <input type="radio"/> C Il naltrexone ha una migliore biodisponibilità orale rispetto al naloxone </div> <div> <input type="radio"/> D l'astinenza da oppiacei provoca midriasi </div> <div> <input type="radio"/> E la codeina ha una migliore biodisponibilità orale rispetto alla morfina </div>	Risposta esatta	A
N°	776	Domanda	Nel caso di movimento in uscita, devono essere indicati nel registro entrata e uscita stupefacenti gli estremi del buono-acquisto ricevuto dal farmacista?	<div> <input type="radio"/> A no, è sufficiente indicare gli estremi della fattura </div> <div> <input type="radio"/> B si, ma solo quando vengano cedute sostanze e non preparazioni </div> <div> <input type="radio"/> C si, ma solo quando vengano cedute preparazioni e non sostanze </div> <div> <input type="radio"/> D si, sempre </div> <div> <input type="radio"/> E nessuna indicazione è corretta </div>	Risposta esatta	D


N°	777	Domanda Cosa deve obbligatoriamente fare il farmacista in caso di smarrimento o sottrazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>presentare denuncia all'A.S.L. di competenza e dare comunicazione all'Ordine dei Farmacisti</div><div>presentare denuncia al Ministero della Salute e dare comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza</div><div>presentare denuncia all'Ordine dei Farmacisti e dare comunicazione al Sindaco</div><div>presentare denuncia al Sindaco e dare comunicazione al Ministero della Salute</div><div>presentare denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e dare comunicazione all'Autorità Sanitaria Locale di competenza</div></div>	Risposta esatta	E
N°	778	Domanda Cosa si intende per polimorfismo genetico di un enzima metabolizzante?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>che sono presenti più isoforme dello stesso enzima</div><div>che vi è una variabilità enzimatica dovuta ad induttori ed inibitori</div><div>che sono presenti due o più fenotipi metabolizzanti</div><div>che la capacità metabolica varia con l'età</div><div>due delle indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	C
N°	779	Domanda I diuretici tiazidici, aventi la struttura indicata, inibiscono il simporto di Na ⁺ , Cl ⁻ . La sede primaria di questa azione sul nefrone è localizzata nel:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div></div><div>glomerulo</div><div>tubulo contorto prossimale</div><div>tratto ascendente dell'ansa di Henle</div><div>tubulo contorto distale</div><div>tubulo e dotto collettore</div></div>	Risposta esatta	D
N°	780	Domanda L'incorporazione meccanica di un principio attivo in una crema idrofila è possibile:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>solo se il principio attivo è liposolubile</div><div>solo se il principio attivo è fotolabile</div><div>mai</div><div>solo se il principio attivo è termolabile</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	E


O=[N+]([O-])S(=O)(=O)c1ccc2c(c1)n(c3ccccc3n2)C(=O)N

N°	781	Domanda	Quale delle affermazioni riportate è corretta per il bisacodile avente la struttura indicata.	<div><div><input type="radio"/> A</div> agisce come lassativo lubrificante</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> agisce come lassativo osmotico</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> agisce come purgante di massa</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> agisce come lassativo di contatto</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> è in commercio anche in forma di sciroppo per l'utilizzazione pediatrica</div>	Risposta esatta	D
N°	782	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la regolarizzazione delle ricette spedite in regime convenzionale e restituite al farmacista è corretta, secondo il D.P.R. 08.07.98 n.371? La regolarizzazione può essere fatta entro trenta giorni dalla ricezione nel caso in cui manchi	<div><div><input type="radio"/> A</div> tessera sanitaria/codice fiscale</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> la data della spedizione</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> timbro della farmacia</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> timbro e/o firma del medico</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> tutte le indicazioni fornite</div>	Risposta esatta	E
N°	783	Domanda	Nelle intossicazioni leggere o moderate da glicosidi cardiaci un sintomo è rappresentato da:	<div><div><input type="radio"/> A</div> nausea e vomito</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> broncoostrizione</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> ritenzione urinaria</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> ipotensione</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> miatriasi</div>	Risposta esatta	A
N°	784	Domanda	La fisostigmina, presente nei semi di <i>Physostigma venenosum</i> Balf., è:	<div><div><input type="radio"/> A</div> controindicata in caso di glaucoma</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> un antagonista colinergico</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> un inibitore della peristalsi intestinale</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> un flavonoide</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> un inibitore reversibile dell'acetilcolinesterasi</div>	Risposta esatta	E


N°	785	Domanda I diuretici osmotici incrementano la osmolarità del fluido extracellulare e pertanto spostano l'acqua dal compartimento intracellulare a quello extracellulare. Incrementando la pressione osmotica del plasma essi	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>fanno aumentare gli edemi degli arti inferiori</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>provocano lisi dei globuli rossi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>richiamano l'acqua dall'occhio e dall'encefalo</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>fanno aumentare la pressione intracranica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>fanno aumentare la pressione intraoculare</div></div></div></div>	<div>Risposta esatta C</div>	
N°	787	Domanda Quali sono i documenti che attestano la conformità dei dispositivi medico-diagnostici in vitro alla direttiva 98/79/CE?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il certificato CE</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la dichiarazione di conformità ed il certificato CE rilasciato dall'Organismo Notificato quando previsto</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>la dichiarazione di conformità</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la dichiarazione di conformità ed il certificato ISO 9001</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni date è corretta</div></div></div></div>	<div>Risposta esatta B</div>	
N°	786	Domanda Quale tra questi analgesici è il più potente:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>pentazocina</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>morfina</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>propossifene</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>fentanyl</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>metadone</div></div></div></div>	<div>Risposta esatta D</div>	
N°	788	Domanda L'utilizzazione terapeutica di numerosi principi attivi è correlata alla loro capacità di bloccare particolari sistemi enzimatici. Quale, tra le coppie farmaco - enzima sotto elencate, rappresenta l'enzima ed il corrispondente inibitore?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>carbiodopa - DOPA decarbossilasi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>donepazil - aldeide deidrogenasi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alfa-metilDOPA - MAO-B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>fisostigmina - HMG (3-idrossi-3-metilglutaril) CoA-reductasi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna tra quelle indicate</div></div></div></div>	<div>Risposta esatta A</div>	



N°	789	Domanda	L'efficacia terapeutica del salbutamolo nell'asma è dovuta alla sua capacità di:
			<div><div><div><div>A</div><div>inibire le fosfodiesterasi</div></div><div><div>B</div><div>ridurre l'infiammazione delle vie aeree</div></div><div><div>C</div><div>antagonizzare l'azione dell'istamina a livello dei suoi recettori</div></div><div><div>D</div><div>ridurre l'ipersecrezione di muco</div></div><div><div>E</div><div>dilatare i bronchi attraverso un aumento della concentrazione di cAMP</div></div></div></div>
			Risposta esatta E
N°	790	Domanda	Qual è il termine di validità del modulo di prescrizione per i mangimi medicati?
		<div><div><div><div>A</div><div>60 giorni</div></div><div><div>B</div><div>30 giorni</div></div><div><div>C</div><div>30 e 60 giorni per animali da compagnia e produttori di alimenti rispettivamente</div></div><div><div>D</div><div>1 mese per animali produttori di alimenti per l'uomo, 3 mesi per animali da compagnia</div></div><div><div>E</div><div>90 giorni</div></div></div></div>	Risposta esatta A
N°	791	Domanda	In alcuni casi, il rivestimento delle compresse con eccipienti opportuni ha lo scopo di favorire il rilascio del farmaco in un particolare tratto del sistema gastroenterico. Degli accoppiamenti seguenti, che indicano gli eccipienti ed il tratto gastroenterico di dissoluzione, quale è corretto:
		<div><div><div><div>A</div><div>saccarosio - intestino</div></div><div><div>B</div><div>cellulosa acetato ftalato - intestino</div></div><div><div>C</div><div>shellac - stomaco</div></div><div><div>D</div><div>mellicellulosa - intestino</div></div><div><div>E</div><div>eudragit 100 - intestino</div></div></div></div>	Risposta esatta B
N°	792	Domanda	I farmaci ad azione ganglioplegica inibiscono:
		<div><div><div><div>A</div><div>i recettori nicolinici</div></div><div><div>B</div><div>i recettori GABA-ergici</div></div><div><div>C</div><div>i recettori muscarinici</div></div><div><div>D</div><div>la liberazione di acetilcolina dalle terminazioni sinaptiche</div></div><div><div>E</div><div>l'idrolisi dell'acetilcolina</div></div></div></div>	Risposta esatta A

N°	793	Domanda	L'enzima di conversione, inibito dagli ACE inibitori, riconducibili alla struttura indicata, determina	
				
		<input type="radio"/> A conversione dell'angiotensinogeno in angiotensina I <input type="radio"/> B liberazione di retina <input type="radio"/> C conversione dell'angiotensina I in angiotensina II <input type="radio"/> D aumento della sintesi di aldosterone <input type="radio"/> E aumento dei recettori per l'angiotensina II	Risposta esatta	C
N°	794	Domanda	I diuretici inibitori dell'anidrasi carbonica riducono la riserva corporea di HCO ₃ ⁻ . Ciò provoca	
		<input type="radio"/> A acidosi metabolica ipercloremica <input type="radio"/> B alcalosi metabolica ipokaliemica <input type="radio"/> C iperuricemia <input type="radio"/> D ipomagnesemia <input type="radio"/> E iponatremia	Risposta esatta	A
N°	795	Domanda	Quale delle seguenti strutture NON risponde alla stimolazione del recettore beta adrenergico?	
		<input type="radio"/> A muscolo ciliare <input type="radio"/> B muscolo radiale dell'iride <input type="radio"/> C muscolatura bronchiale <input type="radio"/> D nodo senoatriale <input type="radio"/> E timometrio	Risposta esatta	B
N°	796	Domanda	Una sostanza può essere classificata come cancerogena nell'uomo (gruppo 1 della classificazione dell'International Agency for Research on Cancer) se:	
		<input type="radio"/> A ha dato una risposta positiva in test di mutagenesi <input type="radio"/> B ha dato una risposta positiva in test di aberrazione cromosomica <input type="radio"/> C si è dimostrata cancerogena in uno studio di cancerogenesi nei roditori <input type="radio"/> D e' stata dimostrata una relazione causale tra esposizione e cancro in studi epidemiologici <input type="radio"/> E tutte le indicazioni sono corrette	Risposta esatta	D

N°	801	Domanda	Quale, tra quelli sotto indicati, costituisce adempimento di legge per il farmacista che abbia smarrito il registro di entrata e uscita degli stupefacenti?		N°	803	Domanda	Indicare il valore del pH di una soluzione acquosa 10^{-8} M di NaOH:	
		<input type="checkbox"/> A	Inoltare denuncia all'A.S.L. di appartenenza				<input type="checkbox"/> A	8,00	
		<input type="checkbox"/> B	dare comunicazione di quanto accaduto all'A.S.L. di appartenenza				<input type="checkbox"/> B	6,98	
		<input type="checkbox"/> C	Inoltare denuncia al Ministero della Salute				<input type="checkbox"/> C	7,02	
		<input type="checkbox"/> D	dare comunicazione di quanto accaduto al Sindaco del Comune di residenza				<input type="checkbox"/> D	5,98	
		<input type="checkbox"/> E	ottemperare a più di uno degli adempimenti indicati				<input type="checkbox"/> E	7,24	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	C


N°	802	Domanda	Una classificazione molto utilizzata per gli antibiotici beta-lattamici tiene conto della presenza di alcune porzioni strutturali individuabili con nomi specifici. A quale dei nomi sotto riportati corrisponde la struttura indicata?		N°	804	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni è errata? La sulpiride, indicata in struttura,	
			<input type="checkbox"/> A	penam			<input type="checkbox"/> A	è un farmaco antipsicotico a struttura benzammidica	
			<input type="checkbox"/> B	perite			<input type="checkbox"/> B	è un farmaco antidopaminergico	
			<input type="checkbox"/> C	cefene			<input type="checkbox"/> C	non si lega in modo significativo alle proteine plasmatiche	
			<input type="checkbox"/> D	oxapenam			<input type="checkbox"/> D	induce iperplatinemia	
			<input type="checkbox"/> E	azeldina			<input type="checkbox"/> E	è il farmaco di prima scelta nella terapia del parkinsonismo indotto da neuroletici	
				Risposta esatta	A			Risposta esatta	E

N°	805	Domanda	Il rilascio di un farmaco da un sistema monolitico rigorifiabile avviene per:		N°	807	Domanda	Quale dei seguenti farmaci è un profarmaco	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>diffusione del farmaco nel liquido di rigorifiamento presente nella matrice rigorifiata</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>streptomicina fosfato</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>per completa dissoluzione della matrice</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>tetraciclina cloridrato</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>per disaggregazione della matrice</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>ampicillina cloridrato</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>per erosione della matrice</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>cloramfenicolo palmitato</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>sale di sodio dell'acido fusidico</div>	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	D

N°	806	Domanda	Il reattivo EDTA è utile per titolare numerosi ioni presenti in soluzione. Quale, tra quelli sotto elencati, NON può essere titolato con questo reattivo		N°	808	Domanda	Antagonisti istaminici H1 trovano o hanno trovato impiego nel trattamento di:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>Ca2+</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>febbre da fieno</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>Zn2+</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>insonnia</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>Mg2+</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>reazioni allergiche</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>Cl-</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>ulcera gastrica</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>Al3+</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>più di una indicazione è corretta</div>	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	E




N°	809	Domanda	Il fattore di attivazione piastrinica (PAF) è:	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	Risposta esatta	D	
N°	810	Domanda	Quale delle coppie di composti aventi la struttura indicata è contenuta nell'Ammoniacca della Farmacopea Ufficiale	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	Risposta esatta	A	
N°	811	Domanda	Delle tre strutture generali indicate, quale può essere utilizzata come antistaminico H1?	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	Risposta esatta	E	
N°	812	Domanda	Due farmaci che possono essere considerati "isosteri classici" sono quelli in cui un atomo della molecola del primo è stato sostituito nel secondo con un atomo	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	<div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> </div>	Risposta esatta	D	


N°	813	Domanda	Le azioni degli agonisti dei recettori colinergici comprendono:	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>broncodilatazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>contrazione del muscolo ciliare e migliorato drenaggio dell'umore acqueo nel glaucoma</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ridotta motilità gastrointestinale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ridotta trasmissione neuromuscolare e ritardato recupero da un blocco neuromuscolare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	B
N°	815	Domanda	Le due curve dose-effetto indicate in figura con le lettere A e B si riferiscono	
		<div><div></div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>nessuna delle indicazioni fornite è corretta</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>a due farmaci aventi la stessa efficacia</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>a due farmaci aventi lo stesso meccanismo di azione sul recettore</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>alla miscela (curva B) del farmaco A con un suo antagonista competitivo</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>a due farmaci aventi la stessa potenza e la stessa efficacia</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>A</div>		
N°	816	Domanda	Una valida alternativa terapeutica agli ACE-inibitori è rappresentata da:	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>agonisti dei recettori per l'angiotensina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antagonisti dei recettori per l'angiotensina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>antagonisti dei recettori alfa1 adrenergici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>agonisti dei recettori alfa1 adrenergici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>inibitori dell'enzima di conversione della angiotensina</div></div>	Risposta esatta	B

Risposta esatta


B



N°	817	Domanda	I valori in mg/100 ml del glucosio nel sangue variano al variare dei soggetti e dell'età. Quale, tra gli intervalli sotto indicati, si avvicina maggiormente al valore medio degli adulti sani se il prelievo è stato eseguito su un soggetto digiuno da almeno 10 ore	<div><div>A</div>70-110</div> <div><div>B</div>50-80</div> <div><div>C</div>90-120</div> <div><div>D</div>180-210</div> <div><div>E</div>110-130</div>	Risposta esatta	A
N°	819	Domanda	La nefelometria misura la luce:	<div><div>A</div>dispersa</div> <div><div>B</div>assorbita</div> <div><div>C</div>riflessa</div> <div><div>D</div>rifratta</div> <div><div>E</div>polarizzata</div>	Risposta esatta	A
N°	820	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi NON appartiene alla classe delle sulfoniluree ipoglicemizzanti?	<div><div>A</div>Glibenclamide (struttura indicata)</div> <div><div>B</div>Gliciclamide</div> <div><div>C</div>Gliclazide</div> <div><div>D</div>Glipizide</div> <div><div>E</div>tutti quelli indicati sono sulfoniluree ipoglicemizzanti</div>	Risposta esatta	E



N° 821 Domanda Il metilfenidato, avente la struttura indicata, è impiegato nel trattamento della:



- ☐ A depressione
- ☐ B sindrome ipercinetica dei bambini
- ☐ C distimia bipolare
- ☐ D schizofrenia
- ☐ E demenza senile


Risposta esatta B

N° 822 Domanda L'acido acetilsalicilico, interagendo con l'albumina plasmatica, acida il gruppo -NH₂ di alcuni residui di lisina e quindi sfavorisce il legame di altri farmaci alle proteine plasmatiche. Esistono medicinali in forma iniettabile che contengono acetilsalicilato di lisina. Quale delle affermazioni riportate, riferite alle soluzioni iniettabili di acetilsalicilato di lisina, è corretta?

- ☐ A la lisina presente nella soluzione iniettabile è già completamente acilata
- ☐ B nella soluzione iniettabile sono presenti soltanto acido salicilico e acetililisina
- ☐ C la disponibilità elettronica del gruppo -NH₂ della lisina è diversa nei due casi
- ☐ D solo la reazione di tipo enzimatico con la lisina può provocare la transacetilazione
- ☐ E la transacetilazione nelle fiale non avviene perché la concentrazione è troppo elevata

Risposta esatta D

N° 823 Domanda Indicare quale delle affermazioni seguenti è corretta riguardo ai principi attivi enalapril (I) e lisinopril (II)?



- ☐ A sono due principi attivi della stessa classe uno dei quali si comporta da profarmaco
- ☐ B uno di essi si trova in commercio sotto forma di sale
- ☐ C si usano entrambi in terapia antipertensiva
- ☐ D il secondo si utilizza per la terapia diuretica nei casi in cui si ha carenza di K⁺
- ☐ E soltanto il primo si utilizza nella terapia antipertensiva

Risposta esatta A


N° 824 Domanda Qual è la percentuale consigliata di idrossietilcellulosa per ottenere un gel acquoso, non versabile, cioè fermo?

- ☐ A 0,5-1%
- ☐ B 1-2,5%
- ☐ C 2,5-5%
- ☐ D 10-20%
- ☐ E oltre 20%

Risposta esatta C




N°	825	Domanda	L'elaidolo presente nel sangue materno supera la barriera placentare per:	Risposta esatta C	
				<div><div>A</div>diffusione facilitata</div> <div><div>B</div>coppia ionica</div> <div><div>C</div>diffusione semplice</div> <div><div>D</div>trasporto attivo</div> <div><div>E</div>pinocitosi</div>	
N°	827	Domanda	La somministrazione di farmaci retinoidi e vitamina A può causare:	Risposta esatta B	
				<div><div>A</div>reazioni allergiche</div> <div><div>B</div>effetto additivo</div> <div><div>C</div>eczema</div> <div><div>D</div>nausea</div> <div><div>E</div>cefalea</div>	
N°	828	Domanda	Tra le sostanze riportate quale è corretto definire legante?	Risposta esatta C	
				<div><div>A</div>derivati della cellulosa</div> <div><div>B</div>gomma adriagante</div> <div><div>C</div>tutte le sostanze indicate</div> <div><div>D</div>amido</div> <div><div>E</div>sodio alginato</div>	



N

829

Domanda La neostigmina, avente la formula indicata, antagonizza la paralisi muscolare provocata da tutti i farmaci elencati con l'eccezione di uno. Quale?



- | | |
|----------|----------------|
| A | Atracurio |
| B | Vecuronio |
| C | d-Tubocurarina |
| D | Pancuronio |
| E | Suxametonio |

Risposta esatta E

N

830

Domanda Con quale delle tecniche seguenti si può realizzare un farmaco "ritardo"? Aggiungendo al principio attivo una sostanza che


- A** lo rende più solubile nei grassi
- B** lo rende meno solubile in acqua
- C** inibisce il recettore sul quale il farmaco agisce
- D** ne facilita l'escrezione renale
- E** più di una delle definizioni riportate è corretta

Risposta esatta E

 \dot{N}

831

Domanda I diuretici tiazidici tipo metolazone avente la struttura indicata (I) sono farmaci potenti ma la loro azione può essere attenuata dalla concomitante somministrazione di probenecid (II) o di farmaci antinfiammatori non steroidei. Ciò avviene perché questi farmaci




- A** inibiscono il metabolismo di (I)
- B** favoriscono il legame di (I) alle proteine plasmatiche
- C** impediscono il legame di (I) alle proteine plasmatiche
- D** favoriscono la filtrazione glomerulare di (I)
- E** inibiscono competitivamente la secrezione di (I) a livello

Risposta esatta E

 \dot{N}

832

Domanda Quale attività farmacologica tra quelle indicate può essere ipotizzata per la lidocaina, avente la struttura indicata?





- A** Antiaritmica
- B** Neurolettica
- C** Anticonvulsivante
- D** Ipnotica
- E** più di una di quelle indicate

Risposta esatta A

N°	833	Domanda	Quale tra le proprietà sotto riportate è sicuramente identica per le sostanze polimorfe	<div><div><div>A</div><div>solubilità</div></div><div><div>B</div><div>densità</div></div><div><div>C</div><div>punto di fusione</div></div><div><div>D</div><div>punto di ebollizione</div></div><div><div>E</div><div>diagrammi di diffrazione ai raggi X</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	835	Domanda	La vendita da parte di un erborista, in erboristeria, di preparazioni e/o prodotti contenenti piante o loro parti, anche in miscela, con etichette che attribuiscono agli stessi effetti terapeutici:	<div><div><div>A</div><div>è consentita</div></div><div><div>B</div><div>è consentita a condizione che l'erborista sia un farmacista</div></div><div><div>C</div><div>non è consentita</div></div><div><div>D</div><div>è consentita a condizione che l'erborista abbia una specifica autorizzazione dalla Regione</div></div><div><div>E</div><div>è consentita solo su prescrizione medica</div></div></div>	Risposta esatta	C


N°	834	Domanda	La stimolazione di quale dei seguenti recettori a livello del sistema nervoso centrale porta ad una riduzione della pressione arteriosa media?	<div><div><div>A</div><div>alfa1 adrenergico</div></div><div><div>B</div><div>beta1 adrenergico</div></div><div><div>C</div><div>alfa2 adrenergico</div></div><div><div>D</div><div>beta2 adrenergico</div></div><div><div>E</div><div>Collinergico muscarinico</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	836	Domanda	La specialità medicinale "A" contiene magladrato. Essa si differenzia dalla specialità medicinale "B", contenente algedrato, in quanto	<div><div><div>A</div><div>non contiene alluminio</div></div><div><div>B</div><div>non contiene magnesio</div></div><div><div>C</div><div>differisce per l'anione del sale</div></div><div><div>D</div><div>oltre all'alluminio, contiene anche magnesio</div></div><div><div>E</div><div>non ha proprietà catartiche</div></div></div>	Risposta esatta	D



N°	837	Domanda	La levodopa, avente la struttura indicata, presenta attività antiparkinson in quanto
			
		<input type="radio"/> A agisce come colinergico	
		<input type="radio"/> B blocca l'enzima tirosin decarbossilasi	
		<input type="radio"/> C nessuna delle indicazioni date è corretta	
		<input type="radio"/> D passa la barriera ematoencefalica dopo essere stata decarbossilata	
		<input type="radio"/> E inibisce le MAO	
		Risposta esatta	C

N°	838	Domanda	Goserelin è un analogo del GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormon) provvisto di attivita :
		<input type="radio"/> A del tutto simile al precursore naturale	
		<input type="radio"/> B simile al precursore naturale, ma dotato di migliore biodisponibilità sistemica	
		<input type="radio"/> C 100 volte superiore al precursore naturale	
		<input type="radio"/> D 10 volte superiore al precursore naturale	
		<input type="radio"/> E 5 volte superiore al precursore naturale	
		Risposta esatta	C

N°	839	Domanda	In alcuni anestetici generali per inalazione sono presenti caratteristiche chimiche e/o chimico-fisiche che li accomunano. Quale, tra quelle sotto elencate, può rappresentare più verosimilmente una di queste caratteristiche comuni
		<input type="radio"/> A analogia strutturale	
		<input type="radio"/> B pronunciata dissociazione ionica	
		<input type="radio"/> C assenza di atomi di alogeni	
		<input type="radio"/> D basso coefficiente di ripartizione olio-acqua	
		<input type="radio"/> E presenza di più atomi di alogeni	
		Risposta esatta	E

N°	840	Domanda	Lo spironolattone è:
		<input type="radio"/> A un antagonista competitivo del recettore citoplasmatico dell'aldosterone	
		<input type="radio"/> B un inibitore della sintesi dell'aldosterone	
		<input type="radio"/> C un antagonista competitivo del recettore di membrana dell'aldosterone	
		<input type="radio"/> D un agonista del recettore di membrana dell'aldosterone	
		<input type="radio"/> E un bloccante diretto dei canali del Na+ della membrana luminale del nefrone	
			
		Risposta esatta	A





N°	845	Domanda	L'omessa detenzione in farmacia degli apparecchi e utensili previsti dalla tabella n.6 della F.U.		N°	847	Domanda	Quale, tra gli enzimi seguenti, partecipa alla formazione dell'istamina nell'organismo?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>non è sanzionata</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>è sanzionata penalmente</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>è sanzionata amministrativamente</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>è sanzionata amministrativamente solo nel caso di reiterata omissione a seguito di diffida</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>è sanzionata amministrativamente soltanto nell'ipotesi di recidiva</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>anilammina acetiltransferasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>istidina decarbossilasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>più di uno di quelli indicati</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>fenilalaninammina metiltransferasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>istamina metiltransferasi</div>	
			Risposta esatta	C				Risposta esatta	B

N°	846	Domanda	A quale classe di farmaci appartiene la feniramina?		N°	848	Domanda	In quale delle seguenti situazioni è CONTROINDICATA l'atropina?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>contraccettivi sistemici ormonali</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>antistaminici</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>benzodiazepine orali</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>ipoglicemizzanti orali</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>antagonisti beta-adrenergici</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>nell'avvelenamento da muscarina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>nell'avvelenamento da pilocarpina</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>nel glaucoma</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>nell'avvelenamento da organofosforici</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nella medicazione preanestetica</div>	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	C



N°	849	Domanda	Quale dei farmaci elencati è attivo in pazienti che presentano contemporaneamente asenze e crisi tonico-cloniche generalizzate?	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>trimecladione</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>acido valproico</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>carbamazepina</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>fencarbital</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>etosuccimide</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	850	Domanda	Il dietilstilbestrolo, di cui si riporta la struttura, ha attività	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>mineralcorticoide</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>progestinica</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>estrogenica</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>androgenica</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>glucocorticoide</div></div></div></div> <div><chem>CCc1ccc(cc1)C(=C(C)CC)c2ccc(O)cc2</chem></div>	Risposta esatta	C
N°	851	Domanda	L'introduzione di gruppi achillici ingombranti sull'azoto della noradrenalina potenzia	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>l'alfa-attività</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>l'alfa1-attività</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>le risposte centrali</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>le risposte periferiche</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>la beta-attività</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	852	Domanda	Qual è l'impiego terapeutico della ciclofosfamide avente la struttura indicata?	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>spasmolitico</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>antistaminico</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>vasodilatatore</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>antineoplastico e immunosoppressore</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div></div> <div><chem>ClC1CCN(C1)P(=O)(O)O</chem></div>	Risposta esatta	D





N°	853	Domanda	L'edeltato disodico calcico viene prevalentemente impiegato nel trattamento dell'avvelenamento da:		N°	855	Domanda	La displasia dello smalto dentario può verificarsi in neonati da madri che hanno assunto in gravidanza:	
			<div><div>A</div>piombo</div>					<div><div>A</div>clorantfenicolo</div>	
			<div><div>B</div>arsenico</div>					<div><div>B</div>aztreonam</div>	
			<div><div>C</div>nessuno di quelli indicati</div>					<div><div>C</div>ampicillina</div>	
			<div><div>D</div>mercurio</div>					<div><div>D</div>tetraciclina</div>	
			<div><div>E</div>rame</div>					<div><div>E</div>amminoglicosidi</div>	
				Risposta esatta A					Risposta esatta D

N°	854	Domanda	L'etichetta o la confezione di un prodotto cosmetico deve contenere:		N°	856	Domanda	In quale delle metodiche elencate può essere classificata la determinazione della cloramina T mediante sodio tiosolfato come riportato in F.U.	
			<div><div>A</div>la composizione qualitativa degli ingredienti</div>					<div><div>A</div>titolazione acido-base</div>	
			<div><div>B</div>solo il principio attivo e il suo contenuto percentuale</div>					<div><div>B</div>reazioni di precipitazione</div>	
			<div><div>C</div>l'elenco completo degli ingredienti in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione.</div>					<div><div>C</div>analisi gravimetrica</div>	
			<div><div>D</div>l'elenco delle sostanze pericolose</div>					<div><div>D</div>permanganometria</div>	
			<div><div>E</div>l'elenco delle sostanze sottoposte a restrizioni</div>					<div><div>E</div>tecnica diversa da quelle elencate</div>	
				Risposta esatta C					Risposta esatta E



N°	857	Domanda	E' dovuta dal vincitore di concorso della farmacia l'indennità di avviamento nei confronti del precedente gestore provvisorio?	<div><div><div>A</div></div><div>no</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>si, sempre</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>si, purchè la sede farmaceutica sia di nuova istituzione</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>si, purchè la sede farmaceutica non sia di nuova istituzione</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>si, purchè la gestione provvisoria abbia avuto una durata di almeno cinque anni</div></div>	Risposta esatta	B
N°	859	Domanda	La pubblicità a mezzo stampa o in qualsiasi altro modo concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, medicinali, presidi medico-chirurgici:	<div><div><div>A</div></div><div>non è consentita</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>è consentita previa autorizzazione del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>è consentita previa licenza del Ministero della Salute</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>è consentita previa licenza della Regione</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>è consentita senza alcuna licenza o autorizzazione</div></div>	Risposta esatta	C




N°	860	Domanda	La penicillina G procainica (struttura indicata) è caratterizzata da	<div><div><div>A</div></div><div>aumento della solubilità in acqua rispetto alla penicillina G (sale potassico)</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>abbassamento della solubilità in acqua rispetto alla penicillina G (per ottenere effetti più prolungati quando iniettata)</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>nessuna delle proprietà indicate</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>potenziamento dell'azione della procaina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>capacità autoconservante</div></div>	Risposta esatta	B
----	-----	---------	--	--	-----------------	---



N°	865	Domanda	Per quanto tempo deve essere conservato in farmacia il registro di carico e scarico degli stupefacenti ?	<div><div><div>A</div></div><div>non ci sono limiti temporali</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>cinque anni dalla data dell'ultima registrazione</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>cinque anni dalla data dell'ultima chiusura</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>due anni dalla data dell'ultima registrazione</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>due anni dalla data dell'ultima chiusura</div></div>	Risposta esatta	D
N°	867	Domanda	Quali medicinali sono sottoposti a farmacovigilanza?	<div><div><div>A</div></div><div>tutti</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>solo gli stupefacenti</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>solo quelli erogabili in regime di S.S.N.</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>solo quelli vendibili dietro presentazione di ricetta medica</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>solo quelli vendibili senza presentazione di ricetta medica</div></div>	Risposta esatta	A
N°	866	Domanda	Il dantrolene, avente la struttura indicata, ha azione miorilassante in quanto: <div><chem>O=C1NC(=O)C2=NC(=C(C=C2)Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])N1</chem></div>	<div><div><div>A</div></div><div>esplica la sua azione al livello di sinapsi centrali</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>agisce sulla giunzione neuromuscolare</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>inibisce il rilascio del calcio dal reticolo sarcoplasmatico</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>è un inibitore diretto dell'Ach</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>si comporta come un farmaco miorilassante depolarizzante</div></div>	Risposta esatta	C
N°	868	Domanda	Indicare quale dei seguenti farmaci si comporta da miorilassante periferico	<div><div><div>A</div></div><div>dantrolene</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>flufenazina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>dordiazepossido</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>baclofene</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>pinozide</div></div>	Risposta esatta	A


N°	869	Domanda	Quale dei seguenti fattori è responsabile, in maggior misura, dell'intensità dell'effetto di un farmaco?	N°	871	Domanda	La furosemide è un diuretico utile per il trattamento di
		<div><div><div>A</div><div>solubilità in acqua</div></div><div><div>B</div><div>concentrazione del farmaco al sito recettoriale</div></div><div><div>C</div><div>tempo di eliminazione</div></div><div><div>D</div><div>tempo di comparsa dell'effetto dopo somministrazione orale</div></div><div><div>E</div><div>minima concentrazione efficace</div></div></div>				<div><div><div>A</div><div>scompenso cardiaco congestizio ed edema polmonare</div></div><div><div>B</div><div>ipercalciuria</div></div><div><div>C</div><div>diabete insipido</div></div><div><div>D</div><div>glaucoma</div></div><div><div>E</div><div>iperglicemia</div></div></div>	
		Risposta esatta	B			Risposta esatta	A

N°	870	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce l'antibiotico glucopeptidico vancomicina?	N°	872	Domanda	E' obbligatorio per il farmacista tenere in modo ostensibile al pubblico l'elenco ufficiale dei medicinali registrati?
		<div><div><div>A</div><div>acidi nucleici della cellula batterica</div></div><div><div>B</div><div>membrana citoplasmatica</div></div><div><div>C</div><div>parete cellulare batterica</div></div><div><div>D</div><div>sintesi proteica ribosomiale</div></div><div><div>E</div><div>metabolismo energetico della cellula batterica</div></div></div>				<div><div><div>A</div><div>sì, sempre</div></div><div><div>B</div><div>no, purché detenga almeno l'informatore farmaceutico o altra pubblicazione analoga</div></div><div><div>C</div><div>no</div></div><div><div>D</div><div>no, è obbligatorio solo per le farmacie ospedaliere</div></div><div><div>E</div><div>no, è sufficiente tenerlo in farmacia</div></div></div>	
		Risposta esatta	C			Risposta esatta	C

[illegible]

N°	877	Domanda	L'emolisi indotta dal consumo di fave, in individui predisposti, è dovuta a:	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>carezza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi</div><div>carezza di esochinasi</div><div>carezza di prostaglandina H sintasi</div><div>carezza di ALA-deidratasi</div><div>carezza di glicogeno sintasi</div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	879	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "trevato" nella Denominazione Comune?	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>beta-bloccanti adrenergici</div><div>Antagonisti dell'acido folico</div><div>Antiacidi dispensabili come OTC</div><div>Omoni estrogeni</div><div>Antistaminici H2</div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	880	Domanda	Le aflatoxine sono micotossine prodotte da muffe (<i>Aspergillus flavus</i> , <i>Aspergillus parasiticus</i>). Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>contaminano principalmente alimenti vegetali</div><div>possono contaminare carni, latte e formaggi</div><div>causano cancro epatico</div><div>sono distrutte dal calore durante le normali operazioni di cottura</div><div>la loro formazione è favorita da temperature elevate ed alta umidità</div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div>	Risposta esatta	D

N° 878 Domanda Il trazodone è un farmaco antidepressivo avente la struttura riportata. Quale delle affermazioni riportate è ERRATA?



-
- non ha somiglianze strutturali con la fenelzina

provoca sedazione

in alcuni casi provoca ipotensione

produce pilsipiano

e' un inibitore specifico delle MAO

Risposta esatta E


N°	881	Domanda Qualora il medico, nel prescrivere un medicinale in regime di SSN, apponga sulla ricetta l'indicazione di non sostituibilità, l'eventuale differenza tra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto, salvo deroghe regionali, è a carico dell'assistito con l'eccezione di:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>minori di 18 anni esenti per patologia esenti per reddito invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia non sono previste eccezioni</div>	Risposta esatta D
N°	883	Domanda Quale dei seguenti effetti indesiderati è dato dalla propoli?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>reazioni allergiche vomito convulsioni diarrea nessuna delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta A
N°	882	Domanda Molti sali di calcio trovano applicazione in terapia. Tra le sequenze di sali sotto indicate qual è quella che esprime un contenuto crescente di calcio quando si somministrano quantità equiponderali dei prodotti indicati? <div><div>$C_3H_7CaO_4P$ glicerofosfato</div><div>$C_{12}H_{22}CaO_{14} \cdot H_2O$ glucronato</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>glicerofosfato-cloruro-gluconato gluconato-glicerofosfato-cloruro cloruro-gluconato-glicerofosfato cloruro-glicerofosfato-gluconato glicerofosfato-gluconato-cloruro</div>	Risposta esatta B
N°	884	Domanda Quale dei seguenti messaggeri chimici dell'organismo è capace di interagire con i recettori nicotinici	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>GABA dopamina serotonina acetilcolina noradrenalina</div>	Risposta esatta D


[illegible]




N°	889	Domanda La deposizione degli aerosol lungo l'albero respiratorio dipende da: <div><div><input type="checkbox"/> A</div> lipofilia dello xenobiotico</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> composizione delle particelle dell'aerosol</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> efficacia della rimozione linfatica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> dimensioni delle particelle dell'aerosol</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> nessuna delle indicazioni è corretta</div>
----	-----	--




N°	893	Domanda	Gli effetti collaterali più pericolosi della cocaina interessano:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>l'apparato statoacustico</div><div>l'apparato gastrointestinale</div><div>la cute</div><div>l'apparato cardiovascolare</div><div>la funzionalità renale</div></div></div></div>		
N°	895	Domanda	Quale dei diuretici elencati ha un meccanismo d'azione che è proprio dell'idroclorotazide, avente la struttura generale indicata?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>acido etacrinico</div><div>torasemide</div><div>trianterene</div><div>doriladone</div><div>mannitolo</div></div></div></div> <div><chem>NC(=O)S(=O)(=O)c1cc(Cl)cc2c1nc3c2ncn3</chem></div>		Risposta esatta D
N°	896	Domanda	Il meccanismo d'azione dei diuretici dell'ansa consiste nell'inibizione di	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>cotrasporto 2Cl-, Na+, K+</div><div>riassorbimento di HCO₃⁻</div><div>ATPasi Na+, K+-dipendente</div><div>cotrasporto Cl-, Na+</div><div>antiporto H+, Na+</div></div></div></div>		Risposta esatta A
N°	894	Domanda	Alcune ammine simpatomimetiche rilasciano l'utero gravido e possono essere usate per ritardare il parto. Con quale meccanismo agiscono?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>rilasciamento diretto della miocellula uterina</div><div>stimolazione dei recettori α</div><div>blocco del reuptake presinaptico della noradrenalina</div><div>inibizione delle MAO</div><div>stimolazione dei recettori beta2</div></div></div></div>		Risposta esatta E





N°	897	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni relative al trattamento del diabete NON è vera?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>I'insulina costituisce il principale trattamento del diabete di tipo 1</div><div>gli ipoglicemizzanti orali trovano impiego solo nel trattamento del diabete di tipo 2</div><div>le biguanidi sono degli ipoglicemizzanti orali</div><div>gli ipoglicemizzanti orali si usano nel trattamento del diabete di tipo 1</div><div>i gliazoni sono ipoglicemizzanti orali</div></div></div>	Risposta esatta	D	
N°	899	Domanda	La cefazidima si può classificare come una	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>tetraciclina</div><div>cefalosporina di "terza generazione"</div><div>cefalosporina di "prima generazione"</div><div>cefalosporina di "seconda generazione"</div><div>eritromicina</div></div></div>	Risposta esatta	B	
N°	898	Domanda	La struttura indicata rappresenta la lidocaina che possiede attività anestetica locale in quanto	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>	<div><div><div>in alza la soglia di eccitazione di una fibra nervosa</div><div>è un bloccante dei canali del K+</div><div>è un attivatore dei canali del Na+</div><div>è un bloccante dei canali del K+ e del Na+</div><div>riduce la concentrazione di Ca2+ extracellulare</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	900	Domanda	Le tetraciline sono controindicate in gravidanza in quanto:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>si depositano nell'osso in fase di crescita</div><div>causano epatotossicità materna ad alte dosi</div><div>possono provocare pigmentazione scura della dentatura decidua del neonato</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div><div>studi sull'animale hanno dimostrato effetti sullo sviluppo scheletrico</div></div></div>	Risposta esatta	D	




N°	901	Domanda	Quale dei seguenti antibatterici NON ha attività nei confronti del <i>Mycobacterium tuberculosis</i> ?		N°	903	Domanda	I farmaci elencati inibiscono le colinesterasi. Quale di essi può essere considerato un inibitore irreversibile?	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>Etambutolo</div><div>Isoniazide</div><div>Metronidazolo</div><div>Rifampicina</div><div>Pirazinamide</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>donepezil</div><div>galantamina</div><div>rivastigmina</div><div>nessuno di quelli indicati</div><div>fisostigmina</div></div>	
			Risposta esatta	C				Risposta esatta	D

N°	902	Domanda	Quale è l'attività farmacologica più rilevante della prometazina, avente la struttura indicata		N°	904	Domanda	E' obbligatorio conservare in farmacia la Farmacopea Ufficiale?	
		<div><div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>Antistaminica H2</div><div>Antistaminica H1</div><div>Colinergica</div><div>Adrenergica</div><div>Nicotinica</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>no, ma è opportuno</div><div>sì, ma soltanto ove la farmacia esegua preparazioni magistrali</div><div>sì, ma soltanto per le farmacie ospedaliere</div><div>sì, sempre</div><div>no, quando la farmacia ha un equipollente collegamento informatico con banche dati</div></div>	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	D



N°	909	Domanda	Quale delle seguenti sostanze può venire impiegata come legante nella preparazione delle compresse	<div><div><div>A</div><div>stearato di magnesio</div></div><div><div>B</div><div>talco</div></div><div><div>C</div><div>carbonato di magnesio</div></div><div><div>D</div><div>miristato di sodio</div></div><div><div>E</div><div>carbomeri</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	910	Domanda	Modificando opportunamente la struttura della feniletilammina si può raggiungere una maggiore selettività nei confronti del recettore adrenergico beta. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	<div><div><div>A</div><div>si deve sostituire con un gruppo alchilico uno degli idrogeni presenti sull'atomo di azoto</div></div><div><div>B</div><div>si deve inserire un ossidrillo sul carbonio beta della catena</div></div><div><div>C</div><div>si deve avere una configurazione R al carbonio della catena che porta l'ossidrillo</div></div><div><div>D</div><div>si deve trasformare la struttura della feniletilammina in ammina terziaria</div></div><div><div>E</div><div>tutte le indicazioni, tranne una, sono corrette</div></div></div> <div></div>	Risposta esatta	E
N°	911	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti riguardanti gli antagonisti beta adrenergici è ERRATA?	<div><div><div>A</div><div>si usano come antipertensivi</div></div><div><div>B</div><div>la loro azione antipertensiva è più pronunciata sui soggetti normali che su quelli ipertesi</div></div><div><div>C</div><div>modificano sensibilmente la frequenza cardiaca</div></div><div><div>D</div><div>modificano il metabolismo dei carboidrati</div></div><div><div>E</div><div>riducono la contrattilità del miocardio</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	912	Domanda	La L-DOPA è	<div><div><div>A</div><div>un inibitore della DOPAdecarbossilasi</div></div><div><div>B</div><div>un precursore della dopamina</div></div><div><div>C</div><div>un antagonista dopaminergico</div></div><div><div>D</div><div>un catabolita della dopamina</div></div><div><div>E</div><div>un inibitore della MAO-B</div></div></div>	Risposta esatta	B




N°	Domanda	Domanda	915	N°
913	L'ormone liberante le gonadotropine (GnRH) è	L'uso del plasma expander è da riservare a pazienti:		
	<div><div>A</div>un polipeptide</div>	<div><div>A</div>ipertesi</div>		
	<div><div>B</div>uno sterode</div>	<div><div>B</div>con diminuita volemia</div>		
	<div><div>C</div>costituito da un unico amminoacido</div>	<div><div>C</div>in trattamento con glucocorticoidi</div>		
	<div><div>D</div>una glicoproteina</div>	<div><div>D</div>con idus emorragico</div>		
	<div><div>E</div>una lipoproteina</div>	<div><div>E</div>con ipotensione ortostatica</div>		
	Risposta esatta A	Risposta esatta B		


N°	Domanda	Domanda	916	N°
914	Un preparato officinale è:	Qual è il trattamento più appropriato per la celiachia?		
	<div><div>A</div>un medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica destinato ad un determinato paziente</div>	<div><div>A</div>l'impiego di antivirali</div>		
	<div><div>B</div>un medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una Farmacopea</div>	<div><div>B</div>l'istaurazione di una dieta priva di glutine</div>		
	<div><div>C</div>un medicinale ottenuto sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti di estrazione</div>	<div><div>C</div>l'impiego ciclico di antistaminici</div>		
	<div><div>D</div>più di una delle indicazioni è corretta</div>	<div><div>D</div>nessuna indicazione è corretta</div>		
	<div><div>E</div>nessuna indicazione è corretta</div>	<div><div>E</div>l'impiego di antibiotici</div>		
	Risposta esatta B	Risposta esatta B		






N°	921	Domanda	Per quante volte può essere utilizzata una ricetta ripetibile che non riporti né la durata della terapia, né la posologia, né il numero delle confezioni complessivamente occorrenti per la terapia?	<div><div>A</div>senza limitazioni nell'intervallo di un anno</div> <div><div>B</div>senza limitazioni nell'intervallo di tre mesi</div> <div><div>C</div>tre volte</div> <div><div>D</div>una sola volta oltre la prima</div> <div><div>E</div>diedi volte con l'eccezione delle prescrizioni di stupefacenti di cui alla Tab. II Sez. E del DPR n. 309/1990</div>		N°	923	Domanda	Sono dovuti i diritti addizionali previsti dalla tariffa nazionale dei medicinali per la dispensazione di medicinali durante le ore di chiusura diurna quando la farmacia effettua servizio "a battenti chiusi"?	<div><div>A</div>no, mai</div> <div><div>B</div>sì, sempre</div> <div><div>C</div>e' a discrezione del farmacista</div> <div><div>D</div>sì, ma solo per le farmacie rurali sussidiate</div> <div><div>E</div>sì, tranne che per le ricette dichiarate urgenti dal medico</div>			Risposta esatta	B
N°	922	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "romina" nella Denominazione Comune?	<div><div>A</div>anestetici locali</div> <div><div>B</div>antilipidici della classe dell'acido fenossibutirrico</div> <div><div>C</div>antinfiammatori derivati dall'indometacina</div> <div><div>D</div>ipoglicemizzanti orali biguanidici</div> <div><div>E</div>antistaminici H2</div>		N°	924	Domanda	E' ammesso il libero e diretto accesso dei clienti ai medicinali in farmacia?	<div><div>A</div>sì, purché non si tratti di oncopatici</div> <div><div>B</div>sì, sempre</div> <div><div>C</div>e' ammesso solo gli OTC</div> <div><div>D</div>sì, purché non rimborsati dal SSN</div> <div><div>E</div>sì, ma devono essere separati dai medicinali di automedicazione</div>			Risposta esatta	C





N°	925	Domanda	Tutti i principi attivi sottoriportati sono steroidi antinfiammatori ad ECCEZIONE di		
			<div><div>A</div>desametasone</div> <div><div>B</div>triamcinolone</div> <div><div>C</div>prednisolone</div> <div><div>D</div>danazolo</div> <div><div>E</div>flunisolide</div>	Risposta esatta	D
N°	927	Domanda	L'anastrozolo è un farmaco che agisce:		
			<div><div>A</div>inibendo i recettori alfa adrenergici</div> <div><div>B</div>inibendo i recettori beta adrenergici</div> <div><div>C</div>inibendo la aromatasi</div> <div><div>D</div>inibendo le chinasi</div> <div><div>E</div>nessuno di questi meccanismi è vero</div>	Risposta esatta	C
N°	928	Domanda	E' consentita agli eredi la gestione provvisoria della farmacia in caso di morte del titolare?		
			<div><div>A</div>no</div> <div><div>B</div>si, limitatamente al coniuge ed agli eredi in linea retta entro il primo grado</div> <div><div>C</div>si</div> <div><div>D</div>si, purché gli eredi siano farmacisti</div> <div><div>E</div>si, limitatamente agli eredi in linea retta entro il primo grado</div>	Risposta esatta	C




N°	929	Domanda	Quale delle seguenti proprietà, secondo la F.U., non è riferibile a compresse solubili:	<div><div>A</div><div>compresse non rivestite</div></div> <div><div>B</div><div>compresse rivestite con film</div></div> <div><div>C</div><div>destinate ad essere disperse in acqua prima della somministrazione dando una dispersione omogenea</div></div> <div><div>D</div><div>destinate ad essere disperse in acqua prima della somministrazione dando una soluzione che divolta più essere leggermente opalescente</div></div> <div><div>E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	C
N°	930	Domanda	Gli antistaminici anti H1 di ultima generazione hanno le seguenti caratteristiche	<div><div>A</div><div>sono meno lipofili e permeano meno la BEE</div></div> <div><div>B</div><div>agiscono prevalentemente in periferia</div></div> <div><div>C</div><div>presentano maggiore affinità recettoriale</div></div> <div><div>D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div> <div><div>E</div><div>solo una indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	D
N°	931	Domanda	Nella dispensazione di un farmaco per il quale può essere opportuno mantenere concentrazioni ematiche costanti nel periodo di cura, quale dei consigli sotto riportati è più valido? Da assumere	<div><div>A</div><div>"dopo il pasto della sera"</div></div> <div><div>B</div><div>"ad intervalli equidistanti"</div></div> <div><div>C</div><div>"ad intervalli irregolari"</div></div> <div><div>D</div><div>"a digiuno"</div></div> <div><div>E</div><div>"dopo i pasti"</div></div>	Risposta esatta	B
N°	932	Domanda	Quale, tra le funzioni azotate sotto riportate, deve essere presente in un farmaco spasmolitico neurotrofo nel quale si vuole circoscrivere l'azione farmacologica esclusivamente a livello intestinale?	<div><div>A</div><div>la funzione (1)</div></div> <div><div>B</div><div>la funzione (2)</div></div> <div><div>C</div><div>la funzione (3)</div></div> <div><div>D</div><div>la funzione (4)</div></div> <div><div>E</div><div>nessuna di quelle indicate</div></div>	Risposta esatta	E



N°	937	Domanda	Si può dire che gli antibiotici chinoloni, in particolare i 6-fluoroderivati, sono complementari ai beta-lattamici delle prime generazioni in quanto	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>possono essere preparati con una sintesi simile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>hanno lo stesso meccanismo d'azione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sono attivi preferenzialmente sui batteri gram-, mentre i beta-lattamici delle prime generazioni lo sono preferibilmente sui gram+</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sono enantiomeri</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	C
N°	939	Domanda	Il più frequente effetto sistemico dell'inossidazione da sali inorganici di mercurio è:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>l'asma</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>l'anemia aplastica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>l'aumento della pressione arteriosa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la tossicità renale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>l'aumento della suscettibilità alle infezioni</div></div>	Risposta esatta	D
N°	940	Domanda	La procainamide, avente la struttura indicata, ha trovato impiego nelle aritmie perché	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>blocca i canali Na+</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>blocca i canali al Ca2+</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>blocca i recettori beta adrenergici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>stimola il reuptake di noradrenalina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>attiva i canali al Na+</div></div>	Risposta esatta	A




N°	941	Domanda	Nei medicinali in cui è presente il racemo dei norgestrel, rappresentato in struttura, la quantità pro dose di farmaco progestinico, confrontata con quelle che contengono il solo isomero lievo, è	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>inferiore</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>superiore</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>identica</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>quasi uguale</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>non si possono prevedere relazioni tra i due dosaggi</div></div>	Risposta esatta	B
<hr/>						
N°	942	Domanda	Quale tra quelli indicati è farmaco di prima scelta in caso di convulsioni tonico-cloniche?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>diazepam</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>etossuccinimide</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>acido acetilsalicylico</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>furosenide</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>clorpromazina</div></div>	Risposta esatta	A
<hr/>						
N°	943	Domanda	Lo stato patrimoniale del bilancio di una farmacia prevede.	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>attività e passività</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>solo attività</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>solo passività</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	A
<hr/>						
N°	944	Domanda	Tenendo presente l'azione farmacologica e quindi la principale utilizzazione terapeutica di "glucosio soluzione ipertonica", indicare, tra quelli sotto riportati, i presidi sanitari nei quali sarà obbligatoriamente presente	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>nessuno di quelli riportati</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>qualunque farmacia aperta al pubblico</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>farmacie aperte al pubblico ed ospedaliere</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>farmacia ospedaliera</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>tutti quelli riportati</div></div>	Risposta esatta	D




N°	945	Domanda	Per quale percentuale mlv di codeina (espressa come base anidra) per somministrazioni ad uso diverso da quello parentale, è richiesta la ricetta da rinnovarsi volta per volta, con riferimento alla tabella II sezione D degli stupefacenti?	N°	947	Domanda	L' atropina agisce
		<input type="checkbox"/> A	superiore all'1% della soluzione multidoso			<input type="checkbox"/> A	bloccando i recettori colinergici nicotinici
		<input type="checkbox"/> B	tra lo 0,5 e l'1% della soluzione multidoso			<input type="checkbox"/> B	bloccando i recettori colinergici muscarinici
		<input type="checkbox"/> C	inferiore allo 0,5% della soluzione multidoso			<input type="checkbox"/> C	stimolando i recettori adrenergici
		<input type="checkbox"/> D	tutte le indicazioni sono corrette			<input type="checkbox"/> D	causando la liberazione di noradrenalina
		<input type="checkbox"/> E	nessuna delle indicazioni è corretta			<input type="checkbox"/> E	interagendo con i recettori delle endorfine
Risposta esatta A				Risposta esatta B			


N°	946	Domanda	Il tresfenidile, un farmaco utilizzato nella malattia di Parkinson	N°	948	Domanda	L' avvelenamento da muscarina provoca
		<input type="checkbox"/> A	inibisce il reuptake delle ammine nelle terminazioni nervose			<input type="checkbox"/> A	midriasi
		<input type="checkbox"/> B	blocca i recettori dopaminergici			<input type="checkbox"/> B	ileo paralitico
		<input type="checkbox"/> C	blocca i recettori colinergici			<input type="checkbox"/> C	tachicardia
		<input type="checkbox"/> D	inibisce la DOPA decarbossilasi			<input type="checkbox"/> D	ritenzione urinaria
		<input type="checkbox"/> E	inibisce le COMT			<input type="checkbox"/> E	scioglia
Risposta esatta C				Risposta esatta E			



N°	949	Domanda	Quale tra i composti indicati non è considerato allucinogeno ?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>furosemd</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>pslclclbcln</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>fcncldcln</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ncsccln</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>scoplclmcln</div></div>	Risposta esatta	A
N°	951	Domanda	Tenendo presente l'azione farmacologica e quindi la principale utilizzazione terapeutica, indicare, tra quelli sotto riportati, i presidi sanitari nei quali la Farmacopea Ufficiale obbliga razionalmente la presenza di amminoflllna avente la struttura sotto indicata.	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>farmacla rurale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>farmacla urbana</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>farmacla ospedaliera</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>farmacla comunale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>in tutti i presldl riportate</div></div>	Risposta esatta	E
N°	952	Domanda	L'azione antlarlmica dell'amldarone è dovuta principalmente ad una interferenza con i canali del	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Na⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Cl⁻</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>K⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Ca²⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>altri lcln</div></div>	Risposta esatta	C




N°	953	Domanda	Ogni quanti anni è prevista la revisione della F.U.	<div><div>A</div>ogni anno</div> <div><div>B</div>ogni 2 anni</div> <div><div>C</div>ogni 4 anni</div> <div><div>D</div>ogni 5 anni</div> <div><div>E</div>ogni 8 anni</div>	Risposta esatta	D
N°	955	Domanda	La rifampicina è un farmaco inibitore della	<div><div>A</div>DNA sintetasi</div> <div><div>B</div>RNA polimerasi</div> <div><div>C</div>DNA girasi</div> <div><div>D</div>monoammino ossidasi</div> <div><div>E</div>amminioacido decarbossilasi</div>	Risposta esatta	B
N°	954	Domanda	Il farmacista deve allegare alla sua copia del buono-acquisto stupefacenti	<div><div>A</div>la ricetta</div> <div><div>B</div>la bolia di accompagnamento</div> <div><div>C</div>lo scontrino o la ricevuta fiscale</div> <div><div>D</div>la fattura</div> <div><div>E</div>non è necessario allegare alcun documento</div>	Risposta esatta	D
N°	956	Domanda	Le immunoglobuline sono	<div><div>A</div>macrofagi</div> <div><div>B</div>plasmacellule</div> <div><div>C</div>linfociti</div> <div><div>D</div>anticorpi</div> <div><div>E</div>cellule del sistema immunitario</div>	Risposta esatta	D



N°	957	<div>Domanda</div> <div>Il piroxicam ha la struttura indicata. Quale delle affermazioni sotto riportate e ad esso riferite è ERRATA</div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>il suo assorbimento non è influenzato da cibo o da farmaci antiacidi</div></div><div><div>B</div><div>è tollerato meglio rispetto all'indometacina</div></div><div><div>C</div><div>viene assorbito completamente a livello gastrico a seguito di somministrazione per os</div></div><div><div>D</div><div>ha breve emivita per cui sono necessarie più somministrazioni al giorno</div></div><div><div>E</div><div>più di una indicazione è errata</div></div></div></div><div><chem>CN1C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O</chem></div></div>	<div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	959	<div>Domanda</div> <div>Le attività degli Ordini dei Farmacisti sono coordinate e promosse</div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>dal Ministero della Salute</div></div><div><div>B</div><div>dal Prefetto</div></div><div><div>C</div><div>dallo stesso Ordine al quale appartengono</div></div><div><div>D</div><div>dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani</div></div><div><div>E</div><div>Dalla Consuezza Regionale degli Ordini</div></div></div></div></div>	<div>Risposta esatta</div> <div>D</div>
N°	960	<div>Domanda</div> <div>Il rilascio del principio attivo e il relativo andamento dei livelli ematici, nelle forme farmaceutiche convenzionali, dipendono essenzialmente:</div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>dalle caratteristiche chimico-fisiche del principio attivo</div></div><div><div>B</div><div>dalle caratteristiche chimico-fisiche degli eccipienti</div></div><div><div>C</div><div>dalle caratteristiche della forma farmaceutica</div></div><div><div>D</div><div>da interventi tecnologici specificatamente adottati</div></div><div><div>E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div></div></div>	<div>Risposta esatta</div> <div>A</div>



N°	961	Domanda	Gli antidepressivi triciclici possono causare:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>miosi</div><div>bradicardia</div><div>tachicardia</div><div>diarrea</div><div>dimagrimento</div></div>	Risposta esatta	C
N°	963	Domanda	Una preparazione magistrale in capsule prevede l'impiego di un aminoacido ramificato. Quale, tra quelli elencati, appartiene a tale categoria?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>valina</div><div>glutamina</div><div>norleucina</div><div>alanina</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	A
N°	962	Domanda	In un prodotto cosmetico l'elenco degli ingredienti deve essere riportato:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione</div><div>in ordine crescente di peso al momento dell'incorporazione</div><div>in ordine crescente in termini di composizioni percentuali del prodotto finito</div><div>in ordine decrescente in termini di composizioni percentuali del prodotto finito</div><div>in ordine alfabetico</div></div>	Risposta esatta	A
N°	964	Domanda	L'uso del ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i> L.) può esporre ad interazioni farmacologiche con farmaci:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>antiaggreganti</div><div>ipocolesterolemizzanti</div><div>neuroletici</div><div>antiaritmici</div><div>antimicrobici</div></div>	Risposta esatta	A




N°	965	Domanda	Quale l'indicazione terapeutica della glicazide, avente la struttura sotto indicata?	<input type="radio"/> A antinfiammatorio <input type="radio"/> B ipoglicemizzante orale <input type="radio"/> C uricosurico <input type="radio"/> D diuretico <input type="radio"/> E antibatterico	Risposta esatta	B
----	-----	---------	--	---	-----------------	---


N°	966	Domanda	Nella prescrizione su ricetta in triplice copia a ricalco per stupefacenti l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico o del veterinario sono obbligatori?	<input type="radio"/> A sono elementi facoltativi <input type="radio"/> B solo se il medico opera in libera professione <input type="radio"/> C solo per gli stupefacenti appartenenti all'Allegato II-bis <input type="radio"/> D sì, sempre <input type="radio"/> E solo per i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale	Risposta esatta	D
----	-----	---------	--	--	-----------------	---

N°	967	Domanda	La capacità di scorrimento di una polvere, determinata misurando il tempo necessario perché l'intero campione defluisca dall'imbuto, viene espressa, riferita a 100 g di campione in:	<input type="radio"/> A secondi e decimi di secondo <input type="radio"/> B minuti <input type="radio"/> C tempo infinito <input type="radio"/> D due indicazioni sono corrette <input type="radio"/> E nessuna indicazione è corretta	Risposta esatta	A
----	-----	---------	---	--	-----------------	---

N°	968	Domanda	I messaggeri chimici che agiscono nell'organismo vengono trasformati metabolicamente. Da quale di essi deriva il composto avente la formula rappresentata a lato e che corrisponde alla melatonina	<input type="radio"/> A adrenalina <input type="radio"/> B noradrenalina <input type="radio"/> C dopamina <input type="radio"/> D istamina <input type="radio"/> E serotonina	Risposta esatta	E
----	-----	---------	--	---	-----------------	---



N°	969	Domanda	Con quale dei seguenti metodi è ancora possibile misurare la tensione interfacciale	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>metodo del capillare</div><div>impiego dello stalagnometro</div><div>metodo della pipetta di Andreasen</div><div>impiego del picnometro</div><div>impiego dello zettametro</div></div>	Risposta esatta	B
N°	971	Domanda	Quale dei seguenti ormoni non si usa in terapia?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>Ormone adrenocorticotropo (ACTH)</div><div>Prolattina</div><div>Ossitocina</div><div>Vasopressina</div><div>Somatotropina</div></div>	Risposta esatta	B
N°	970	Domanda	Gli unguenti sono definiti dalla F.U. come	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>preparazioni semisolide multifase costituite da una fase acquosa e da una fase lipofila</div><div>preparazioni semisolide che contengono disperse polveri in grandi proporzioni</div><div>preparazioni costituite da liquidi gelificati per mezzo di opportuni gelificanti</div><div>preparazioni semisolide costituite da una base monofasica in cui possono essere disperse sostanze solide o liquide</div><div>nessuna definizione è corretta</div></div>	Risposta esatta	D
N°	972	Domanda	In quale dei seguenti disturbi è utilizzato il succo mirtillo rosso americano (<i>Vaccinium macrocarpon</i> Ait.)?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>infezioni delle prime vie aeree</div><div>infezioni recidivanti delle vie urinarie</div><div>bronchiti croniche</div><div>disturbi della menopausa</div><div>infezioni cutanee</div></div>	Risposta esatta	B



N°	973	Domanda	Per teratogeno puro si intende:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>uno xenobiotico in grado di indurre, a basse dosi, malformazioni</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>uno xenobiotico in grado di indurre, a basse dosi, letalità</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>uno xenobiotico in grado di indurre, a basse dosi, ritardo nella crescita</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>uno xenobiotico in grado di indurre, a basse dosi, tutti e tre gli effetti</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	A
N°	975	Domanda	Qual è l'indicazione clinica principale delle sulfoniluree aventi la struttura generale indicata?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>diabete insulino dipendente (Tipo I)</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>diabete non insulino dipendente (Tipo II)</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>trattamento della resistenza muscolare all'insulina</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>diabete tipo Mody</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>feocromocitoma</div></div>	Risposta esatta	B
N°	976	Domanda	Una capsula a base di ingredienti vegetali può essere:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>un medicinale vegetale tradizionale</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>un medicinale</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>un integratore alimentare</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>un dispositivo medico</div></div>	Risposta esatta	D

N°	977	Domanda	Degli accoppiamenti sotto indicati, qual è quello corretto?	<div><div><div><div>A</div><div>clomipramina - antidepressivo</div></div><div><div>B</div><div>promazina - antipsicotico</div></div><div><div>C</div><div>triazolam - ipnotico sedativo</div></div><div><div>D</div><div>sobrerolo - antidiuretico</div></div><div><div>E</div><div>tutti gli accoppiamenti sono corretti</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	978	Domanda	La natura del chitosano è:	<div><div><div><div>A</div><div>lipidica</div></div><div><div>B</div><div>proteica</div></div><div><div>C</div><div>polisaccaridica</div></div><div><div>D</div><div>idrocarburea</div></div><div><div>E</div><div>inorganica</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>C</div>
N°	979	Domanda	Quali delle seguenti droghe è usata come amaro eupeptico?	<div><div><div><div>A</div><div>Genziana (radice di <i>Gentiana lutea</i> L.)</div></div><div><div>B</div><div>Assenzio (foglie e sommità fiorite di <i>Artemisia absinthium</i> L.)</div></div><div><div>C</div><div>Rabarbaro (rizoma di <i>Rheum palmatum</i> L. o <i>R. officinale</i> Baillon)</div></div><div><div>D</div><div>China (corteccia di <i>Cinchona</i> spp.)</div></div><div><div>E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	980	Domanda	Le indicazioni terapeutiche accettate per farmaci antimuscarinici comprendono tutte le seguenti tranne:	<div><div><div><div>A</div><div>ipertensione</div></div><div><div>B</div><div>cinetosi</div></div><div><div>C</div><div>malattia di Parkinson</div></div><div><div>D</div><div>spasmo vescicale postoperatorio</div></div><div><div>E</div><div>induzione di miotriasi e cicloplegia</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>A</div>

N°	981	Domanda	Quale tra i farmaci antimicrobici seguenti riesce a provocare modificazioni della sintesi o del metabolismo degli acidi nucleici della cellula batterica?		N°	983	Domanda	Il principio attivo (-)-R-deprenil trova impiego per la terapia del morbo di Parkinson. Quale delle seguenti affermazioni è vera?	
		<div><div><div>A</div></div><div>nessuno di quelli indicati</div></div>					<div><div><div>A</div></div><div>(-)-R-deprenil è precursore nella biosintesi della dopamina</div></div>		
		<div><div><div>B</div></div><div>Telooplanina</div></div>					<div><div><div>B</div></div><div>(-)-R-deprenil è un inibitore della MAO-B</div></div>		
		<div><div><div>C</div></div><div>Carbapenem</div></div>					<div><div><div>C</div></div><div>(-)-R-deprenil è un inibitore della MAO-A</div></div>		
		<div><div><div>D</div></div><div>Cicloerina</div></div>					<div><div><div>D</div></div><div>(-)-R-deprenil è un inibitore della ricaptazione della dopamina</div></div>		
		<div><div><div>E</div></div><div>Cefalosporine</div></div>					<div><div><div>E</div></div><div>(-)-R-deprenil favorisce il rilascio di dopamina</div></div>		
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	B
N°	982	Domanda	Quale dei seguenti farmaci antitumorali corrisponde alla definizione di "Sostanza di origine naturale che agisce promuovendo l'assemblamento e la stabilizzazione della tubulina"		N°	984	Domanda	Cosa sono le proteine G?	
		<div><div><div>A</div></div><div>vincristina</div></div>					<div><div><div>A</div></div><div>parte del sistema di trasduzione del segnale</div></div>		
		<div><div><div>B</div></div><div>vinblastina</div></div>					<div><div><div>B</div></div><div>peptidi gastrointestinali</div></div>		
		<div><div><div>C</div></div><div>mitomicina C</div></div>					<div><div><div>C</div></div><div>proteine plasmatiche</div></div>		
		<div><div><div>D</div></div><div>podofilossina</div></div>					<div><div><div>D</div></div><div>antigeni</div></div>		
		<div><div><div>E</div></div><div>taxolo</div></div>					<div><div><div>E</div></div><div>proteine virali</div></div>		
			Risposta esatta	E				Risposta esatta	A




N°	985	Domanda	Quale è un metodo di preparazione dei medicinali omeopatici?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>metodo Hahnemanniano</div><div>metodo Korsakoviano</div><div>più di uno tra quelli indicati</div><div>metodo di Avogadro</div><div>nessuno tra quelli indicati</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	987	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce la clorotetraciclina, avente la struttura indicata?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>subunità ribosomiale 50S</div><div>membrana citoplasmatica</div><div>subunità ribosomiale 30S</div><div>acidi nucleici della cellula batterica</div><div>parete cellulare batterica</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	986	Domanda	Quale dei seguenti è un catione monovalente che tende a diminuire o invertire l'artrosia lieve-moderata indotta da digitale?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>Magnesio</div><div>Chinidina</div><div>Lito</div><div>Potassio</div><div>Calcio</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	988	Domanda	Da un punto di vista strutturale il paracetamolo può essere considerato:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>un amminoacido</div><div>un ossiacido</div><div>un pirazolo</div><div>una anilide</div><div>un acetossiacido</div></div></div></div>	Risposta esatta	D




N°	989	Domanda Quale delle seguenti condizioni NON rappresenta una controindicazione per la somministrazione di un vaccino attenuato:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>gravidenza</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>trattamento con corticosteroidi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>trattamento con antinfiammatori non steroidei</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>paziente immunodepresso</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>malattie febbrili in atto</div></div></div></div>	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>preparazioni multifase che hanno come fase continua la fase lipofila</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>preparazioni multifase che hanno come fase continua la fase lipofila e contengono polisorbati</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>preparazioni monofasiche costituite da basi lipofile in grado di assorbire piccole quantità di acqua</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>preparazioni monofasiche costituite da basi quali miscele di macrogol</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>preparazioni in grado di assorbire notevoli quantità di acqua</div></div></div></div>	N°	991	Domanda Gli unguenti (drobi) sono definiti dalla F.U. come:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>preparazioni multifase che hanno come fase continua la fase lipofila</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>preparazioni multifase che hanno come fase continua la fase lipofila e contengono polisorbati</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>preparazioni monofasiche costituite da basi lipofile in grado di assorbire piccole quantità di acqua</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>preparazioni monofasiche costituite da basi quali miscele di macrogol</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>preparazioni in grado di assorbire notevoli quantità di acqua</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	990	Domanda Per quale motivo le compresse rivestite con un prodotto che presenta un gruppo funzionale acido ed uno estero, si solubilizzano facilmente a livello intestinale?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il rivestimento presenta più di una delle caratteristiche indicate</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>il rivestimento ha carattere anfifilico</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>il rivestimento ha carattere cationico</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>il rivestimento, in ambiente acido, subisce la saponificazione della funzione esterea</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>il rivestimento ha carattere acido</div></div></div></div>	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Mellidopa</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Beta-bloccanti</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Diuretici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ACE inibitori</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div></div>	N°	992	Domanda Quale tra quelli elencati è il farmaco più indicato per il controllo dell'ipertensione arteriosa in gravidanza?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Mellidopa</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Beta-bloccanti</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Diuretici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ACE inibitori</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta	A

N°	993	Domanda	Il termine "ecstasy" è utilizzato in gergo per indicare:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>nescallina</div><div>metilfenidato</div><div>metilendiossimetamfetamina</div><div>fenciclidina</div><div>caffeina + teofillina</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	995	Domanda	Nella descrizione dei principi attivi utilizzati per la terapia del morbo di Parkinson si trovano riportati il deprenil e la selegilina. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>con i nomi selegilina e deprenil si indicano due composti con struttura diversa</div><div>il deprenil è il metabolita attivo proveniente dalla selegilina</div><div>il deprenil è un inibitore specifico delle MAO-A</div><div>tutte le indicazioni, tranne una, sono corrette</div><div>la selegilina è un inibitore specifico delle MAO-B</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	996	Domanda	La pralidossima ripristina la funzionalità dell'acetilcolinesterasi inibita da esteri fosforici	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>stimolando la sintesi ex novo</div><div>trasformando la conformazione della macromolecola da inattiva ad attiva</div><div>sostituendosi alla serina dell'enzima nel legame con il fosfato</div><div>aumentando enormemente la velocità di idrolisi spontanea dell'estere fosforico</div><div>stimolando l'azione di enzimi idrolitici che tendono a rigenerare l'enzima</div></div></div>	Risposta esatta	C




N°	997	Domanda	Il trasferimento della titolarità della farmacia:		N°	999	Domanda	Il principio attivo levodopa trova impiego per la terapia del morbo di Parkinson. Quale delle seguenti affermazioni è vera?	
			<input type="checkbox"/> A non è consentito se non nei casi in cui il titolare abbia compiuto sessanta anni di età					<input type="checkbox"/> A levodopa è precursore nella biosintesi della dopamina	
			<input type="checkbox"/> B è sempre consentito					<input type="checkbox"/> B levodopa è un inibitore della MAO-B	
			<input type="checkbox"/> C è consentito decorsi 5 anni dalla conseguita titolarità					<input type="checkbox"/> C levodopa è un inibitore della MAO-A	
			<input type="checkbox"/> D è consentito decorsi 3 anni dalla conseguita titolarità					<input type="checkbox"/> D levodopa è un inibitore della ricaptazione della dopamina	
			<input type="checkbox"/> E è consentito decorso 1 anno dalla conseguita titolarità					<input type="checkbox"/> E levodopa favorisce il rilascio di dopamina	
			Risposta esatta D					Risposta esatta A	


N°	998	Domanda	I messaggeri chimici si formano da sostanze che vengono immesse nell'organismo con la dieta. Da quale precursore deriva la serotonina		N°	1000	Domanda	L'infotropismo cardiaco negativo da beta-antagonisti consegue a:	
			<input type="checkbox"/> A Triptofano					<input type="checkbox"/> A inibizione della fosfodiesterasi	
			<input type="checkbox"/> B Acido glutammico					<input type="checkbox"/> B inibizione dell'adenilato ciclasi	
			<input type="checkbox"/> C Tirosina					<input type="checkbox"/> C diminuzione di inositolo trifosfato	
			<input type="checkbox"/> D Colina					<input type="checkbox"/> D diminuita attività della proteinchinasi C	
			<input type="checkbox"/> E Istidina					<input type="checkbox"/> E diminuzione di cGMP	
			Risposta esatta A					Risposta esatta B	




N°	1001	Domanda	Quale dei seguenti farmaci NON è un antitubercosico?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Paclitaxel</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Tamoxifene</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Cisplatino</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Busulfano</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Alopurinolo</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1003	Domanda	Gli antipsicotici tipici:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>possono indurre il Parkinson farmacologico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sono antagonisti dopaminergici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>possono presentare attività antiemetica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>solo una indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1004	Domanda	L'atropina, avente la struttura indicata, è un antagonista dell'acetilcolina sul recettore	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>muscarinico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>nicotinico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alfa1</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>beta1</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>5-HT2</div></div>	Risposta esatta	A






N°	1005	Domanda	Un cosmetico può contenere il selenio e i suoi sali?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no, perché presente nell'elenco delle sostanze non ammesse</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>solo nel caso in cui si tratti di disolfuro di selenio e alla concentrazione massima dell'1%</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, se il contenuto è inferiore allo 0,1%</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, se la sua azione è secondaria all'effetto cosmetico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1006	Domanda	I "farmaci equivalenti" sono farmaci	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>analoghi agli OTC</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>analoghi ai farmaci SOP</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>utilizzabili per malattie generiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>le indicazioni sono tutte errate</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>preparati esclusivamente in farmacia</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1007	Domanda	Nei prodotti cosmetici, l'indicazione del paese di origine:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è obbligatoria</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è obbligatoria solo per i prodotti fabbricati in paesi non membri dell'Unione Europea</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è obbligatoria solo per prodotti fabbricati in paesi membri dell'Unione Europea</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è facoltativa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>è obbligatoria solo per i prodotti destinati ai bambini in età inferiore ai 3 anni</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1008	Domanda	Quale affermazione relativa alla dichiarazione di conformità è corretta:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è emessa dall'Organismo Notificato per i dispositivi medici di classe IIa, IIb e III</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è emessa dal fabbricante per tutti i dispositivi indipendentemente dalla classe</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è emessa dal fabbricante solo per i dispositivi di classe IIa, IIb e III</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è emessa dal fabbricante solo per i dispositivi di classe I.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>non è obbligatoria per nessun dispositivo</div></div>	Risposta esatta	B




N°	1013	Domanda	Il ginseng (radice di <i>Panax ginseng Meyer</i>) può:	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div><div><div> aumentare il rilascio di ormone adrenocorticotropo (ACTH)</div><div> aumentare i livelli plasmatici di glucosio</div><div> diminuire la pressione arteriosa</div><div> inibire la liberazione di ossido nitrico (NO)</div><div> più di una indicazione è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1015	Domanda	L'assorbimento di farmaci per diffusione facilitata	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div><div><div> non corrisponde a nessuna delle definizioni indicate</div><div> è mediato da carrier</div><div> comporta consumo di energia</div><div> avviene contro gradiente di concentrazione</div><div> non è saturabile</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1016	Domanda	Quando si modifica il gruppo fenilacetamidico della penicillina G con il gruppo R sotto indicato, si ottengono penicilline	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div><div><div> gastroresistenti</div><div> ritardo</div><div> antipseudomonas</div><div> con carattere di profarmaco ed aventi la stessa attività delle penicilline corrispondenti</div><div> aventi più di una delle caratteristiche indicate</div></div></div></div> <div><div><div><div><div><div></div></div><div>R =</div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>COOH</div></div><div><div><div></div></div><div>NH</div></div><div><div><div></div></div><div>O</div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1014	Domanda	L'insulina NON viene somministrata per os in quanto	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div><div><div> è idrofila</div><div> è lipofila</div><div> presenta un peso molecolare elevato</div><div> è degradata nello stomaco</div><div> è sempre ionizzata</div></div></div></div>	Risposta esatta	D




N°	1017	Domanda	Le mostarde azotate, aventi struttura generale del tipo di quella indicata, devono la loro azione citotossica al fatto che
			
		<div><div><input type="radio"/> A</div><div>si legano covalentemente ai ribosomi</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>antagonizzano l'acido idrofolico ai siti attivi delle diidrofolato reductasi</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>formano legami covalenti con il DNA</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>inibiscono i fattori di traslocazione extraribosomiali</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>inibiscono irreversibilmente le timidilato sintetasi</div></div>	Risposta esatta C
N°	1018	Domanda	Con quale formalismo il medico deve indicare sulle ricette non ripetibili, che prescrivano medicinali per uso umano, la dose ed il tempo di somministrazione del medicinale?
		<div><div><input type="radio"/> A</div><div>in tutte lettere</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>la dose in lettere ed il tempo in cifre o in lettere</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>sia la dose che il tempo in cifre</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>la dose in cifre o in lettere ed il tempo in lettere</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>il medico non è tenuto ad indicare dose e tempi di somministrazione</div></div>	Risposta esatta E
N°	1019	Domanda	In quale condizione un titolare di farmacia può svolgere l'attività di informatore scientifico del farmaco?
		<div><div><input type="radio"/> A</div><div>nel caso di titolarità di farmacia rurale</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>fuori dagli orari di apertura della farmacia</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>in nessuna perché incompatibile</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>facendosi sostituire dal direttore della farmacia</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>avendo il nulla-osta dell'Ordine Professionale</div></div>	Risposta esatta C
N°	1020	Domanda	Il diazepam subisce come trasformazione principale
		<div><div><input type="radio"/> A</div><div>una N-demetilazione</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>una idrossilazione aromatica</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>una S-ossidazione</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>una N-ossidazione</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>una O-dealchilazione</div></div>	Risposta esatta A





N°	1021	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sul labetalolo NON è corretta? Il composto è un bloccante		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>beta-adrenergico non selettivo</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>dei recettori alfa1-adrenergici</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>dei recettori beta1-adrenergici</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>dei recettori beta2-adrenergici</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>dei recettori alfa2-adrenergici</div>		
			Risposta esatta	E	
N°	1022	Domanda	Di cosa deve essere obbligatoriamente dotata la farmacia ove si eseguano preparazioni iniettabili, oltre che dei necessari mezzi di sterilizzazione?		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>di tutte le sostanze indicate nella Farmacopea Ufficiale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>di aghi e siringhe</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>di specifica autorizzazione dell'A.S.L.</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>di apposito registro</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>dell'attrezzatura, delle apparecchiature e del materiale indispensabile secondo la F.U.</div>			
			Risposta esatta	E	
N°	1023	Domanda	Degli accoppiamenti sotto indicati, qual è quello corretto		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>nifedipina - beta bloccante</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>dortalidone - diuretico tiazidico</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>spironolattone - diuretico risparmiatore di K+</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>furosenide - diuretico osmotico</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>atenolo - beta agonista</div>			
			Risposta esatta	C	
N°	1024	Domanda	Le ammine simpatomimetiche agoniste dei recettori beta adrenergici interferiscono nel metabolismo energetico in quanto:		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>inibiscono la liberazione di acidi grassi dal tessuto adiposo</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>stimolano la ossidazione dei substrati proteici</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>stimolano la sintesi del glicogeno</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>facilitano la sintesi di trigliceridi nel tessuto adiposo</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>sono lipolitiche</div>			
			Risposta esatta	E	



N°	1025	Domanda	L'ezetimibe viene co-somministrato con	<div><div><div>A</div></div><div>antibiotici</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>antiulcera</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>statine</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>antinfiammatori</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>antiasmatici</div></div>
----	------	---------	--	--

1029	N°	Domanda	Il livello ottimale del colesterolo totale nel sangue, espresso in mg/100 ml, dovrebbe essere inferiore a:	<div><div>A</div>260</div> <div><div>B</div>220</div> <div><div>C</div>280</div> <div><div>D</div>200</div> <div><div>E</div>240</div>	Risposta esatta	D	
1030	N°	Domanda	Quale dei seguenti anestetici generali NON è somministrabile per via endovenosa	<div><div>A</div>metossitale</div> <div><div>B</div>chetamina (struttura II)</div> <div><div>C</div>ciclopropano (struttura III)</div> <div><div>D</div>tiopentale</div> <div><div>E</div>etomidato (struttura I)</div>	Risposta esatta	C	
1031	N°	Domanda	Il principio attivo aminoclofillina è costituito dalle due entità molecolari indicate che prendono il nome di teofillina (1) ed etilendiammina (2). Esso deve essere considerato	<div></div>	<div><div>A</div>un'associazione di due principi attivi diversi che non interagiscono chimicamente tra loro</div> <div><div>B</div>un complesso di inclusione dell'etilendiammina nei cristalli di teofillina</div> <div><div>C</div>un sale nel quale la teofillina si comporta da entità molecolare a carattere acido</div> <div><div>D</div>un sale nel quale la teofillina si comporta da entità molecolare a carattere basico</div> <div><div>E</div>un'entità che non corrisponde a nessuna di quelle indicate</div>	Risposta esatta	C
1032	N°	Domanda	Quale, tra quelli indicati, NON rappresenta un possibile effetto collaterale degli anestetici locali di attuale impiego clinico	<div><div>A</div>nistagno</div> <div><div>B</div>tremore</div> <div><div>C</div>ipertensione</div> <div><div>D</div>aritmia</div> <div><div>E</div>convulsioni</div>	Risposta esatta	C	

N°	1033	Domanda	L'androstano è l'idrocarburo di riferimento per gli ormoni androgeni. Il numero di atomi di carbonio del suo scheletro è	<div><div>A</div>19</div> <div><div>B</div>27</div> <div><div>C</div>24</div> <div><div>D</div>21</div> <div><div>E</div>18</div>	Risposta esatta	A
N°	1035	Domanda	Gli inibitori enzimatici detti "substrati suicidi" debbono la loro alta specificità	<div><div>A</div>alla elevata capacità di complessazione al sito catalitico dell'enzima</div> <div><div>B</div>alla caratteristica di inibitori reversibili</div> <div><div>C</div>all'interazione con un sito allosterico specifico dell'enzima</div> <div><div>D</div>alla loro attivazione specifica da parte dell'enzima al quale si legheranno covalentemente</div> <div><div>E</div>all'elevata costante di inibizione (KI)</div>	Risposta esatta	D
N°	1036	Domanda	Indicare quale delle affermazioni seguenti è corretta per il principio attivo triazolam	<div><div>A</div>si utilizza esclusivamente come antidepressivo</div> <div><div>B</div>non si può usare per i pazienti affetti da insonnia</div> <div><div>C</div>si può consegnare senza ricetta medica</div> <div><div>D</div>ha spiccate proprietà antitumoriche</div> <div><div>E</div>corrisponde alla formula riportata a lato</div>	Risposta esatta	E



1039 **N° Domanda** In figura sono riportate due curve dose-effetto riferibili a due principi attivi. A quale delle situazioni sotto indicate può riferirsi la curva B

A al farmaco A in presenza di un suo antagonista non competitivo


P al farmaco A in presenza di un suo agonista non competitivo

C più di una indicazione è corretta

D al farmaco A in presenza di un suo antagonista competitivo

E al farmaco A in presenza di un suo agonista competitivo

Risposta esatta A



Domanda Quale, tra le seguenti Tabelle della F.U., può essere conveniente consultare quando, conoscendo il quantitativo massimo pro-dose di una sostanza consigliato dalla F.U., si voglia stabilire quali sono le dosi corrispondenti di un suo sale?

A la N° 2

[B] la N° 1

C

D più di una di quelle indicate

E tutte quelle indicate

Risposta esatta **B**

1040 N° Domanda Per poter essere ammessa una indicazione sulla salute (claim salutistico) di un prodotto alimentare deve:

A essere supportata da dati della letteratura scientifica

R essere valutata dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)


C non essere ingannevole per il consumatore

autorizzata a livello comunitario

E tutte le indicazioni sono corrette

Risposta esatta E

N° 1038 Domanda La fenilefrina, avente la struttura indicata, a livello della mucosa nasale produce:



A blocco dei recettori istaminergici



B blocco dei recettori beta adrenergici

C vasocostrizione


vasodilatazione

E blocco dei recettori muscarinici

Risposta esatta C



N°	1041	Domanda	I neurolettici tipici interferiscono con il sistema dopaminergico in quanto	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>bloccano il reuptake neuronale della dopamina</div><div>aumentano la liberazione di dopamina</div><div>bloccano i recettori per la dopamina di tipo D2</div><div>inibiscono il catabolismo della dopamina</div><div>attivano i recettori per la dopamina di tipo D1</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1043	Domanda	Quale tra i seguenti enzimi, NON partecipa alla formazione della dopamina nell'organismo?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>più di uno di quelli indicati</div><div>Tirosina idrossilasi</div><div>Dopamina beta-idrossilasi</div><div>DOPA decarbossilasi</div><div>O-acetiltransferasi</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1042	Domanda	Le soluzioni di minoxidil vengono utilizzate per frizioni del cuoio capelluto allo scopo di prevenire la caduta dei capelli. Il preparato, considerato il lungo periodo per il quale deve essere utilizzato,	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>può essere dispensato senza ricetta medica</div><div>presenta controindicazioni rilevanti per i soggetti ipertesi</div><div>presenta controindicazioni rilevanti per i soggetti ipotesi</div><div>presenta controindicazioni rilevanti per i soggetti diabetici</div><div>può essere dispensato esclusivamente a dosi decrescenti</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1044	Domanda	Due soluzioni acquose presentano valori diversi del punto di ebollizione. Se la prima bolle ad una temperatura più elevata rispetto alla seconda vuol dire che nei confronti di quest'ultima essa è	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>isomolica</div><div>isotonica</div><div>ipotonica</div><div>ipertonica</div><div>con identica concentrazione</div></div></div>	Risposta esatta	D




N°	1045	Domanda	I principi attivi identificati con il suffisso "setron" sono dotati:	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>di attività antagonista dei recettori serotoninergici 5-HT3</div></div><div><div><div>B</div></div><div>di attività agonista dei recettori serotoninergici 5-HT3</div></div><div><div><div>C</div></div><div>di attività antagonista dei recettori istaminergici H1</div></div><div><div><div>D</div></div><div>di attività antagonista dei recettori istaminergici H2</div></div><div><div><div>E</div></div><div>di attività antagonista dei recettori nicotinici N1</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>A</div>
N°	1047	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce la gentamicina, avente la struttura indicata?	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>unità ribosomiale 50S</div></div><div><div><div>B</div></div><div>membrana citoplasmatica</div></div><div><div><div>C</div></div><div>metabolismo energetico della cellula batterica</div></div><div><div><div>D</div></div><div>acidi nucleici della cellula batterica</div></div><div><div><div>E</div></div><div>nessuno</div></div></div></div> <div><chem>NC1[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O</chem></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	1048	Domanda	La tariffa nazionale dei medicinali è approvata:	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>dalla FOI</div></div><div><div><div>B</div></div><div>dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni</div></div><div><div><div>C</div></div><div>dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Industria</div></div><div><div><div>D</div></div><div>dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)</div></div><div><div><div>E</div></div><div>dal Ministero della Salute sentito il parere della FOI</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	1046	Domanda	In un prodotto cosmetico è ammesso l'impiego di corticosteroidi?	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>no, perché presenti nell'elenco delle sostanze non ammesse</div></div><div><div><div>B</div></div><div>sì, se il contenuto è inferiore allo 0,2%</div></div><div><div><div>C</div></div><div>sì, se non produce effetti sistemici.</div></div><div><div><div>D</div></div><div>sì, sempre</div></div><div><div><div>E</div></div><div>più di una indicazione è corretta</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>A</div>




N°	1049	Domanda	Tutti i farmaci elencati inducono midriasi e paralisi dell'accomodazione. Il recupero funzionale più lento si osserva dopo somministrazione di	<div><div>A</div>tropicamide</div> <div><div>B</div>atropina</div> <div><div>C</div>omatropina</div> <div><div>D</div>ciclopentololo</div> <div><div>E</div>scopolamina</div>	Risposta esatta	B
N°	1051	Domanda	Da quale dei seguenti effetti collaterali è limitato l'impiego terapeutico della clozapina?	<div><div>A</div>necrosi epatica</div> <div><div>B</div>insufficienza renale</div> <div><div>C</div>granulocitopenia</div> <div><div>D</div>insufficienza cardiaca congestizia</div> <div><div>E</div>otoboscità</div>	Risposta esatta	C
N°	1050	Domanda	Gli isomeri conformazionali di una struttura biologicamente attiva	<div><div>A</div>sono separati tra loro da barriere energetiche facilmente superabili al variare della temperatura</div> <div><div>B</div>possono essere trasformati l'uno nell'altro</div> <div><div>C</div>possono modificare la loro disposizione spaziale per favorire l'interazione con il recettore</div> <div><div>D</div>tutte le indicazioni, tranne una, sono corrette</div> <div><div>E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>	Risposta esatta	E
N°	1052	Domanda	Gli agonisti colinergici muscarinici possono trovare impiego	<div><div>A</div>nell'ileo paralitico</div> <div><div>B</div>nella ritenzione urinaria</div> <div><div>C</div>nel glaucoma</div> <div><div>D</div>in tutte le indicazioni riportate</div> <div><div>E</div>in nessuna delle indicazioni riportate</div>	Risposta esatta	D



N°	1053	Domanda	Gli alimenti senza glutine erogati dal SSN sono inclusi:	<input type="radio"/> A nel registro nazionale degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare <input type="radio"/> B nel registro nazionale degli integratori alimentari <input type="radio"/> C nelle liste di trasparenza degli alimenti <input type="radio"/> D nelle liste della sicurezza alimentare <input type="radio"/> E nessuna delle indicazioni è corretta	Risposta esatta	A
N°	1054	Domanda	Il diltiazem corrisponde alla formula indicata. Quale delle affermazioni riportate è errata?	 <input type="radio"/> A possiede centri chirali <input type="radio"/> B appartiene alla classe delle benzodiazepine <input type="radio"/> C ha attività antipertensiva <input type="radio"/> D e' un farmaco Ca2+-antagonista <input type="radio"/> E più di una delle indicazioni fornite è corretta	Risposta esatta	B
N°	1055	Domanda	Qual è la regione per la quale il naloxone non viene somministrato per via orale?	<input type="radio"/> A viene inattivato dall'acidità gastrica <input type="radio"/> B viene metabolizzato quasi completamente dal fegato prima di raggiungere il circolo <input type="radio"/> C non viene assorbito dal tratto gastrointestinale <input type="radio"/> D induce il vomito se assunto per os <input type="radio"/> E Induce spasmi intestinali se assunto per os	Risposta esatta	B
N°	1056	Domanda	Quale delle sostanze elencate si potrebbe utilizzare in uno sciroppo avente proprietà antitussive e da utilizzare come farmaco OTC?	<input type="radio"/> A metorfano racemico <input type="radio"/> B propossifene racemico <input type="radio"/> C destropropossifene <input type="radio"/> D destronelforfano <input type="radio"/> E nessuno di quelli indicati	Risposta esatta	D

N°	1057	Domanda	Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardanti la buprenorfina è corretta		N°	1059	Domanda	I farmaci possono essere somministrati attraverso molteplici vie. Quale, tra quelle sotto indicate, NON è consigliabile nelle terapie in cui devono essere rispettati dosaggi ben definiti?	
			<div><div>A</div> è un composto strutturalmente correlato alla morfina</div>					<div><div>A</div> parenterale</div>	
			<div><div>B</div> è un composto a carattere neutro</div>					<div><div>B</div> tutte le vie indicate presentano a riguardo inconvenienti comparabili</div>	
			<div><div>C</div> la sua dispensazione richiede ricetta medica non ripetibile</div>					<div><div>C</div> endovena</div>	
			<div><div>D</div> non ha ossidril sulla molecola</div>					<div><div>D</div> orale</div>	
			<div><div>E</div> più di una affermazione è corretta</div>					<div><div>E</div> rettale</div>	
			Risposta esatta A					Risposta esatta E	

N°	1058	Domanda	Quali tra quelli elencati sono gli anticorpi monoclonali meno immunogeni?		N°	1060	Domanda	L'abuso di lassativi antitrichinici provoca perdita di elettroliti, esponendo a rischio di effetto avverso in caso di assunzione contemporanea di:	
			<div><div>A</div> anticorpi murini</div>					<div><div>A</div> ipoglicemizzanti orali</div>	
			<div><div>B</div> anticorpi chimerici</div>					<div><div>B</div> digitalici</div>	
			<div><div>C</div> anticorpi umani</div>					<div><div>C</div> Ca++ antagonisti</div>	
			<div><div>D</div> anticorpi umanizzati</div>					<div><div>D</div> beta-bloccanti</div>	
			<div><div>E</div> anticorpi primateizzati</div>					<div><div>E</div> più di una indicazione è corretta</div>	
			Risposta esatta C					Risposta esatta B	






N°	1061	Domanda	Quale distintivo è obbligato a portare il farmacista sul camice?	<div><div><div>A</div></div><div>nessun distintivo</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>un distintivo di sua scelta, purché recchi il simbolo del caduceo</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>il distintivo che riproduce l'emblema professionale dei farmacisti, adottato dalla FOFI</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>il distintivo adottato da FEDERFARMA</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Il distintivo europeo dei farmacisti, recepito con decreto del Ministro della Salute</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1062	Domanda	Varie famiglie di principi attivi riconducibili agli oppioidi possono essere ricollegate alla struttura della morfina. Quale dei seguenti abbinamenti principio attivo-famiglia di oppioidi NON è corretta?	<div><div><div>A</div></div><div>fenilpropilammine – metadone</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>morfina – pentazocina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>benzomorfini – pentazocina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>fenilpiperidine – meperidina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>endotani – buprenorfina</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1063	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il prefisso "nitur" nella Denominazione Comune?	<div><div><div>A</div></div><div>ormoni progestativi</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>derivati del 5-nitrofurano</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>antistaminici H2</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>ormoni estrogeni</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>ipoglicemizzanti solfonamidici</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1064	Domanda	Il cibo influenza l'assorbimento di:	<div><div><div>A</div></div><div>atracurio</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>insulina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>griseofulvina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>eparina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>N-butilscopolamina</div></div>	Risposta esatta	C



N°	1065	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardo alle eparine a basso peso molecolare NON è CORRETTA?	N°	1067	Domanda	Il Consiglio Superiore di Sanità:
		<input type="checkbox"/> A	sono ottenute per depolarizzazione chimica o enzimatica dell'eparina naturale			<input type="checkbox"/> A	emana disposizioni in materia di sanità
		<input type="checkbox"/> B	hanno un peso molecolare compreso tra 4.000 e 9.000 Dalton			<input type="checkbox"/> B	vigila sull'attività sanitaria dello Stato
		<input type="checkbox"/> C	hanno un peso molecolare compreso tra 20.000 e 30.000 Dalton			<input type="checkbox"/> C	fornisce pareri tecnici al Ministro della Salute
		<input type="checkbox"/> D	presentano una disponibilità e farmacocinetica modificata rispetto all'eparina standard			<input type="checkbox"/> D	cura l'informazione sui farmaci
		<input type="checkbox"/> E	esercitano la loro principale azione anticoagulante attraverso il legame con l'antitrombina III			<input type="checkbox"/> E	provvede all'educazione sanitaria
			Risposta esatta C				Risposta esatta C

N°	1066	Domanda	In quale caso è consentito al medico indicare sulle ricette non ripetibili le sole iniziali del nome e del cognome del paziente?	N°	1068	Domanda	I farmaci appartenenti alla classe delle fenidiazine possono provocare:
		<input type="checkbox"/> A	quando il medico lo ritiene opportuno			<input type="checkbox"/> A	vomito
		<input type="checkbox"/> B	in nessun caso			<input type="checkbox"/> B	parelisi facciale
		<input type="checkbox"/> C	quando il paziente è minorenni			<input type="checkbox"/> C	sindrome parkinsonsimile
		<input type="checkbox"/> D	su richiesta scritta del paziente			<input type="checkbox"/> D	diplopia
		<input type="checkbox"/> E	in presenza di speciali disposizioni che esigano la riservatezza dei trattamenti			<input type="checkbox"/> E	anestesia generale
			Risposta esatta E				Risposta esatta C




N°	1069	Domanda	La molecola sotto rappresentata corrisponde al tropisetone avente attività	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antilemica</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>neurolettica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>anticonvulsivante</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>nootropica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>ansiolitica</div>		Risposta esatta	A
N°	1070	Domanda	Quale dei seguenti farmaci è un agonista muscarinico indiretto	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>Rivastigmina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>onotropina</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>ciclopentolato</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>carbacolo</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>betanecolo</div>		Risposta esatta	A
N°	1071	Domanda	Le droghe vegetali devono essere esenti da:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>batteri aerobi</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>lieviti e muffe</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>metalli pesanti</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>radioattività</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>insetti</div>		Risposta esatta	E
N°	1072	Domanda	L'eserina, avente la struttura indicata, è usata in caso di	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>spasmi addominali</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>asma</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>intossicazione da atropina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>ipertensione</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>intossicazione da organofosforici</div>		Risposta esatta	C




N°	1073	Domanda	Quale di questi farmaci subisce un elevato effetto di primo passaggio quando somministrato per os:		N°	1075	Domanda	Le siringhe monouso per impiego in ambito sanitario sono	
		<div><div><div>A</div><div>nitroglicerina</div></div><div><div>B</div><div>vitamina B₁₂</div></div><div><div>C</div><div>sotalolo</div></div><div><div>D</div><div>digossina</div></div><div><div>E</div><div>tetraciclina</div></div></div>					<div><div><div>A</div><div>ausili sanitari</div></div><div><div>B</div><div>dispositivi medici</div></div><div><div>C</div><div>presidi medico-chirurgici</div></div><div><div>D</div><div>prodotti farmaceutici generici</div></div><div><div>E</div><div>prodotti da banco</div></div></div>		
					Risposta esatta A				


N°	1074	Domanda	Nei pazienti con funzionalità epatica compromessa la posologia dei farmaci deve essere agglustata in quanto:		N°	1076	Domanda	L'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali è dovuta	
		<div><div><div>A</div><div>il metabolismo ossidativo risulta compromesso</div></div><div><div>B</div><div>si può verificare un aumento della concentrazione plasmatica dei farmaci</div></div><div><div>C</div><div>si può verificare una riduzione della biotrasformazione dei profarmaci in metaboliti attivi</div></div><div><div>D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div><div><div>E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div>					<div><div><div>A</div><div>sempre</div></div><div><div>B</div><div>purché la farmacia sia ubicata in località con popolazione non superiore a 3,000 abitanti</div></div><div><div>C</div><div>purché la farmacia sia ubicata in località con popolazione non superiore a 6,000 abitanti</div></div><div><div>D</div><div>se il fatturato della farmacia è inferiore ad importi predeterminati dalla Regione</div></div><div><div>E</div><div>a seguito di previa valutazione discrezionale del Sindaco</div></div></div>		
					Risposta esatta B				





N°	1077	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "cillina" nella Denominazione Comune?		N°	1079	Domanda	Il farmacista è obbligato a tenere un registro di entrata e uscita dei mangimi medicati?	
		<input type="checkbox"/> A	beta-Bloccanti adrenergici				<input type="checkbox"/> A	si, per tutti i mangimi medicati	
		<input type="checkbox"/> B	antibiotici derivati dal G-APA				<input type="checkbox"/> B	si, ma solo per i mangimi medicati destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo	
		<input type="checkbox"/> C	antistaminici H2				<input type="checkbox"/> C	si, ma solo per il farmacista responsabile della vendita diretta presso grossisti autorizzati	
		<input type="checkbox"/> D	antibiotici derivati dal 7-ACA				<input type="checkbox"/> D	no	
		<input type="checkbox"/> E	ACE-inibitori				<input type="checkbox"/> E	si, ma solo il farmacista responsabile della vendita diretta presso produttori	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	D

N°	1078	Domanda	Per quali sostanze o preparazioni in farmacia vige l'obbligo della tenuta in armadio chiuso a chiave?		N°	1080	Domanda	Gli analgesici narcotici svolgono azione	
		<input type="checkbox"/> A	veleni e stupefacenti appartenenti alla Tab. II Sez. A, B, C, D del DPR 309/90				<input type="checkbox"/> A	a livello periferico	
		<input type="checkbox"/> B	veleni e stupefacenti della Tabella II Sez. A, B e C del DPR 309/90				<input type="checkbox"/> B	a livello centrale	
		<input type="checkbox"/> C	veleni della Tab. 3 della F.U. e stupefacenti delle tabelle del DPR 309/90				<input type="checkbox"/> C	interagendo con i recettori delle endorfine	
		<input type="checkbox"/> D	veleni e stupefacenti appartenenti alla Tab. II Sez. A del D.P.R. 309/90				<input type="checkbox"/> D	tutte le indicazioni sono corrette	
		<input type="checkbox"/> E	solo veleni				<input type="checkbox"/> E	nessuna indicazione è corretta	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	D




N°	1081	Domanda	Le due curve dose-effetto indicate in figura con le lettere A e B si riferiscono	N°	1083	Domanda	Le preparazioni omeopatiche nella F.U. riguardano	
		<div><div><div>Farmaco A</div><div>Farmaco B</div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>a due farmaci aventi lo stesso meccanismo di azione sul recettore ma con diversa efficacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>a due farmaci aventi la stessa efficacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>alla miscela (curva B) del farmaco A con un suo antagonista competitivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>a due farmaci aventi la stessa potenza e la stessa efficacia</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>le tinture madri e le materie prime</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>più di una risposta è corretta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>le forme farmaceutiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>le droghe vegetali per preparazioni omeopatiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>i materiali di partenza</div></div>	Risposta esatta	B




N°	1082	Domanda	Quando il gruppo amminico del 6-APA viene acilato con il gruppo R sotto indicato, si ottengono farmaci della classe delle aminopenicilline aventi le caratteristiche di penicilline	N°	1084	Domanda	La L-DOPA è usualmente co-somministrata con	
		<div><div><div>R =</div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>gastroresistenti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ritardo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>con carattere di profarmaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>a largo spettro</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>aventi più di una delle caratteristiche indicate</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un inibitore delle MAO-A</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>un inibitore della Acetilcolinesterasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>un inibitore della DOPAMecarbossilasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	C




N°	1085	Domanda	Il fondaparinux è	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>un polipeptide</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>un lipopolisaccaride</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>un pentasaccaride solfato</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>una lipoproteina</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>una corta sequenza di RNA</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		Risposta esatta	C
N°	1087	Domanda	Molti principi attivi oppioidi derivano direttamente dalla morfina mantenendo la complessità strutturale di questa. Quale dei seguenti principi attivi NON è ottenibile dalla morfina?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>codeina</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>oxicodone</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>nalbexone</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>meladone</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>naltrexone</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		Risposta esatta	D
N°	1086	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sul sistema di segnalazione spontanea delle reazioni avverse è vera?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>permette di stabilire l'esatta incidenza di una reazione avversa</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>permette di valutare l'esatta esposizione al farmaco</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>permette di mettere in evidenza reazioni avverse difficilmente individuabili nei trials clinici</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>permette di valutare la sicurezza di un farmaco rispetto alle alternative terapeutiche disponibili</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>permette di stimare l'esatta prevalenza di una reazione avversa</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		Risposta esatta	C
N°	1088	Domanda	Gli effetti cardiocirculatori delle fenilazine sono dovuti a:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>azione digitalica sul cuore</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>azione chinidina simile sul cuore</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>azione vagale cardiaca</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>azione alfa-bloccante periferica</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>azione muscarinica periferica</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		Risposta esatta	D



N°	1089	Domanda	E' obbligatorio per il farmacista indicare il numero di lotto nel registro entrata e uscita stupefacenti?	<div><div><div>A</div></div><div>si, sempre</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>si, ma solo per le operazioni in uscita</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>si, ma solo per le operazioni in entrata</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>no, mai</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>si, ma solo per gli stupefacenti da conservarsi in armadio chiuso a chiave</div></div>		N°	1091	Domanda	Quali è il termine di validità della ricetta ripetibile che prescrive medicinali veterinari?	<div><div><div>A</div></div><div>un mese</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>tre mesi</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>dieci giorni escluso quello di emissione</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>non è consentito l'uso di ricetta ripetibile per la prescrizione di medicinali veterinari</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>uno o tre mesi per gli animali produttori di alimenti o da compagnia rispettivamente</div></div>	
				Risposta esatta	D					Risposta esatta	B
N°	1090	Domanda	Un antistaminico somministrato durante l'allattamento può	<div><div><div>A</div></div><div>passare nel latte e creare inusuale eccitazione o irritazione nel neonato</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>ridurre la produzione di latte</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>aumentare la produzione del latte</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>più di una delle indicazioni è corretta</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>		N°	1092	Domanda	La resistenza ai farmaci si manifesta quando si utilizzano composti ad attività	<div><div><div>A</div></div><div>ipodica</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>antibatterica</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>ipotensiva</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>stimolante centrale</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>anoressica</div></div>	
				Risposta esatta	D					Risposta esatta	B




N°	1093	Domanda Le cefalosporine sono correntemente classificate in diverse "generazioni". Attualmente questa classificazione comprende quattro categorie. La caratteristica più importante sulla quale è fondata la loro diversità si basa	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>sull'analogue strutturale delle molecole</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>sul tipo di forme farmaceutiche possibili per la somministrazione terapeutica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>sulla possibilità di avere medicinali sotto forma di associazione</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>sul tipo di attività antimicrobica che il farmaco presenta</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>sulla data di introduzione sul mercato</div>			
N°	1095	Domanda Quale, tra le funzioni azotate sotto riportate, deve essere presente in un farmaco spasmolitico neurotrofo nel quale si vuole circoscrivere l'azione farmacologica esclusivamente a livello intestinale	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>amminica primaria</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>quella indicata con (2)</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>più di una tra quelle indicate</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>ammonica quaternaria</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuna di quelle indicate</div>	<div><div></div><div><div></div><div><div></div></div></div></div>		Risposta esatta C
N°	1096	Domanda Rispetto ad un farmaco tradizionale un biofarmaco è:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>più costoso</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>meno selettivo</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>più stabile</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>meglio conservabile</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>più facilmente preparabile</div>			Risposta esatta A




N°	1097	Domanda Uno degli effetti principali dell'angiotensina II consiste nel dare: <div><div><input type="checkbox"/> A</div> accelerazione della frequenza cardiaca</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> diminuzione della frequenza cardiaca</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> aumento della vasocostrizione periferica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> diminuzione della vasocostrizione periferica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> nessuna delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta	C
N°	1099	Domanda Alcuni medicinali contengono principi attivi classificati come nitrati organici, le cui caratteristiche farmacocinetiche sono correlate alla loro trasformazione metabolica ed alla stabilità dei metaboliti. Quale delle sequenze indicate riguardanti l'emivita di questi farmaci è corretta? <div><div><input type="checkbox"/> A</div> trinitroglicerina > isosorbide dinitrato</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> trinitroglicerina > isosorbide 5-mononitrato</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> isosorbide dinitrato > Isosorbide 5-mononitrato</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> isosorbide 5-mononitrato > isosorbide dinitrato</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> più di una di quelle indicate</div>	Risposta esatta	D
N°	1100	Domanda Le curve dose-effetto indicate in figura con le lettere A e B si riferiscono a due farmaci A e B che agiscono sul sistema colinergico. A quale delle coppie di principi attivi sotto elencate potrebbero qualitativamente corrispondere <div><div><input type="checkbox"/> A</div> acetilcolina (curva A) e papaverina (curva B)</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> acetilcolina (curva B) e papaverina in presenza di acetilcolina (curva A)</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> acetilcolina in presenza di atropina (curva A) e atropina (curva B)</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> acetilcolina (curva B) e acetilcolina in presenza di atropina (curva A)</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> nessuna delle indicazioni fornite è corretta</div>	Risposta esatta	E




N°	1101	Domanda	La condizione ottimale per l'assorbimento della tetraciclina per via orale è:	<div><div>A</div>dopo un pasto ricco di carboidrati</div> <div><div>B</div>a stomaco vuoto</div> <div><div>C</div>dopo un pasto ricco di latte e/o di suoi derivati</div> <div><div>D</div>la stessa sia a stomaco vuoto che dopo un pasto</div> <div><div>E</div>dopo un pasto ricco di proteine</div>	Risposta esatta	B
N°	1103	Domanda	In una compressa a rilascio modificato quali dei seguenti componenti è il legante?	<div><div>A</div>lattosio</div> <div><div>B</div>cellulosa microcristallina</div> <div><div>C</div>idrossipropilcellulosa</div> <div><div>D</div>magnesio stearato</div> <div><div>E</div>silice precipitata</div>	Risposta esatta	C
N°	1102	Domanda	La ciclosporina ha tutte le seguenti caratteristiche TRANNE:	<div><div>A</div>è un inibitore specifico della proliferazione dei linfociti T</div> <div><div>B</div>è un peptide ciclico di 11 amminoacidi</div> <div><div>C</div>attraversa facilmente le membrane cellulari</div> <div><div>D</div>è priva di nefrotossicità</div> <div><div>E</div>può causare ipertrofia gengivale</div>	Risposta esatta	D
N°	1104	Domanda	Un farmaco acido avente $pK_a = 5$ si trova in forma maggiormente dissociata quando il pH del distretto dell'organismo in cui si trova è pari a	<div><div>A</div>3</div> <div><div>B</div>5</div> <div><div>C</div>7</div> <div><div>D</div>4</div> <div><div>E</div>6</div>	Risposta esatta	C




N°	1105	Domanda	Il ranitidil, farmaco antipertensivo, esercita la sua azione terapeutica tramite:		N°	1107	Domanda	Quali dei seguenti farmaci può aumentare il fabbisogno insulinico:	
				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>inibizione dell'enzima che catalizza la conversione dell'angiotensinogeno in angiotensina I</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>inibizione dell'enzima che catalizza la conversione dell'angiotensina I in angiotensina II</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>antagonismo reversibile a livello dei recettori vasali dell'angiotensina II</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>inibizione dell'enzima renina prodotto in sede renale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>inibizione della secrezione di aldosterone</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>tiazidi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>glucocorticoidi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>beta-agonisti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>beta-bloccanti non selettivi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette tranne una</div></div>	Risposta esatta	E


N°	1106	Domanda	L'acido valproico agisce:		N°	1108	Domanda	In un prodotto cosmetico è ammesso l'impiego di minoxidil e suoi sali?	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>inibendo l'enzima GABA-transaminasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>inibendo i canali di membrana permeabili agli ioni Na+</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>bloccando i canali T del Ca++</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>attivando la glutammato decarbossilasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no, perché presenti nell'elenco delle sostanze non ammesse (Al.II)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si, se il contenuto è inferiore allo 0,2%</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, se non produce effetti sistemici.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, sempre</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div>		
				Risposta esatta	E			Risposta esatta	A



N°	1109	Domanda	Per quale meccanismo l'asma bronchiale costituisce controindicazione all'impiego dei farmaci beta-antagonisti?	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div></div><div>B</div></div><div><div></div><div>C</div></div><div><div></div><div>D</div></div><div><div></div><div>E</div></div></div><div><div>blocco dell'azione delle catecolamine endogene</div><div>inibizione delle colinesterasi</div><div>stimolo diretto delle secrezioni bronchiali</div><div>blocco dell'azione dell'adenosina</div><div>stimolo diretto della muscolatura liscia bronchiale</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1111	Domanda	L'associazione di sulfametossazolo e trimetoprim	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div></div><div>B</div></div><div><div></div><div>C</div></div><div><div></div><div>D</div></div><div><div></div><div>E</div></div></div><div><div>blocca la formazione del peptidoglicano</div><div>inibisce la diidropteroato sintetasi</div><div>inibisce la diidrofolicolo sintetasi</div><div>comporta un doppio blocco sequenziale nella formazione di acido tetraidrofolicolo</div><div>inibisce la sintesi proteica</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1112	Domanda	L'Autorità Competente in materia di presidi medico chirurgici è:	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div></div><div>B</div></div><div><div></div><div>C</div></div><div><div></div><div>D</div></div><div><div></div><div>E</div></div></div><div><div>il Ministero della Salute</div><div>il Ministero della Salute, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico</div><div>l'Istituto Superiore di Sanità</div><div>il Ministero dello Sviluppo Economico</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1110	Domanda	L'etichettatura dei medicinali omeopatici, autorizzati con procedura semplificata o in commercio perché presenti sul mercato italiano alla data del 6/6/1995, cosa deve contenere?	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div></div><div>B</div></div><div><div></div><div>C</div></div><div><div></div><div>D</div></div><div><div></div><div>E</div></div></div><div><div>la dicitura "Medicinale Omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate"</div><div>la denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici, con il relativo grado di diluizione</div><div>la forma farmaceutica</div><div>dicitura: "Medicinale non a carico del Servizio sanitario nazionale"</div><div>tutte le definizioni sono corrette</div></div></div></div>	Risposta esatta	E








N°	1113	Domanda	L'antitrombina è costituita da residui:	<div><div>A</div>fosfati</div> <div><div>B</div>amminoacidi</div> <div><div>C</div>lipidi</div> <div><div>D</div>nucleotidi</div> <div><div>E</div>nucleosidi</div>	Risposta esatta	B
N°	1115	Domanda	La Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali prevede un diritto addizionale quando nel medicamento sono presenti sostanze	<div><div>A</div>stupefacenti</div> <div><div>B</div>corrosive</div> <div><div>C</div>coloranti</div> <div><div>D</div>in tutti i casi indicati, sommando i contributi in presenza di più di una delle sostanze</div> <div><div>E</div>in tutti i casi indicati, senza sommare i contributi in presenza di più di una delle sostanze</div>	Risposta esatta	E
N°	1114	Domanda	I farmaci citostatici "fase-specific" agiscono:	<div><div>A</div>durante una fase del ciclo mitotico</div> <div><div>B</div>inibendo la sintesi della parete cellulare</div> <div><div>C</div>durante la gravidanza</div> <div><div>D</div>durante lo sviluppo embrionale</div> <div><div>E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta	A
N°	1116	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti sul Flumazenil è corretta?	<div><div>A</div>e' una sostanza che si comporta da antagonista sul recettore delle benzodiazepine</div> <div><div>B</div>nessuna indicazione è corretta</div> <div><div>C</div>pur essendo una forma iniettabile può essere consegnato senza ricetta medica</div> <div><div>D</div>la sua spedizione necessita di ricetta medica non ripetibile</div> <div><div>E</div>la sua spedizione necessita di ricetta medica speciale</div>	Risposta esatta	A



N°	1117	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni relative al principio attivo quetiapina è corretta?		N°	1119	Domanda	Quale, tra quelli sotto indicati, rappresenta l'impiego terapeutico del trisfenidile?	
			<div><div>A</div>e' un antipsicotico atipico</div>					<div><div>A</div>morbo di Parkinson</div>	
			<div><div>B</div>dà un rischio minimo di induzione di Parkinson farmacologico</div>					<div><div>B</div>disturbi maniacco-depressivi</div>	
			<div><div>C</div>presenta antagonismo sui recettori istaminergici H1</div>					<div><div>C</div>discinesia tardiva</div>	
			<div><div>D</div>presenta antagonismo su recettori serotoninergici 5-HT1A e 5-HT2</div>					<div><div>D</div>corea di Huntington</div>	
			<div><div>E</div>tutte le affermazioni non sono corrette</div>					<div><div>E</div>tutti quelli riportati</div>	
			Risposta esatta	E				Risposta esatta	A

N°	1118	Domanda	Quale dei prodotti sotto elencati viene più comunemente usato come agente correttore di acidità nella preparazione delle forme farmaceutiche liquide che devono presentare valori di pH analoghi a quelli dei liquidi biologici?		N°	1120	Domanda	Di quali medicinali sono obbligate ad essere provviste le farmacie? Solo	
			<div><div>A</div>clorbutanolo</div>					<div><div>A</div>dei medicinali salvavita e di pronto soccorso</div>	
			<div><div>B</div>fosfato monobasico di potassio</div>					<div><div>B</div>dei medicinali erogabili in regime di Servizio Sanitario Nazionale</div>	
			<div><div>C</div>cloruro di sodio</div>					<div><div>C</div>delle sostanze ad azione stupefacente</div>	
			<div><div>D</div>dietilitalato</div>					<div><div>D</div>dei medicinali della Tabella n.2 della F.U.</div>	
			<div><div>E</div>nessuno di quelli indicati</div>					<div><div>E</div>dei medicinali che il farmacista ritenga utili per il regolare espletamento del servizio</div>	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	D



N°	Domanda	Risposta esatta
1121	Domanda A chi compete la farmacovigilanza?	
	<input type="radio"/> A all'AIFA, alle A.S.L., alle strutture sanitarie, alle aziende farmaceutiche, ai medici ed ai farmacisti <input type="radio"/> B ai N.A.S. ed agli Ospedali <input type="radio"/> C agli ospedali <input type="radio"/> D ai soli farmacisti in farmacia <input type="radio"/> E ai soli farmacisti ospedalieri	Risposta esatta A
1122	Domanda Cosa sono a rispetto all'altra le due sostanze scottorportate	
	 <input type="radio"/> A lo stesso composto <input type="radio"/> B enantiomeri <input type="radio"/> C diastereoisomeri <input type="radio"/> D isomeri geometrici <input type="radio"/> E biosteri	Risposta esatta D
1123	Domanda Gli antibiotici chinolonici agiscono	
	<input type="radio"/> A inibendo l'enzima DNA-polimerasi <input type="radio"/> B inibendo l'enzima trascrittasi inversa <input type="radio"/> C formando un complesso con la girasi e il DNA <input type="radio"/> D formando un addotto con il ribosoma <input type="radio"/> E nessuna delle indicazioni è corretta	Risposta esatta C
1124	Domanda I requisiti microbiologici stabiliti dalla F.U. per preparazioni non sterili:	
	<input type="radio"/> A sono i medesimi per tutte le preparazioni orali <input type="radio"/> B sono i medesimi per tutti i medicinali a base di piante composte esclusivamente da una o più droghe vegetali <input type="radio"/> C prevedono criteri di accettabilità diversi nel caso di medicinali a base di piante composte esclusivamente da una o più droghe vegetali a seconda che debbano o meno essere aggiunti di acqua bollente prima dell'uso <input type="radio"/> D non sono previsti requisiti specifici per le preparazioni liquide <input type="radio"/> E tutte le indicazioni sono corrette	Risposta esatta C



N°	1125	Domanda	Gli antagonisti dei recettori H2 esercitano il loro effetto	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>inibendo la sintesi delle prostaglandine</div><div>diminuendo la motilità gastrica</div><div>formando una barriera protettiva contro l'acido</div><div>riducendo la secrezione acida gastrica</div><div>per motivi diversi da quelli indicati</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1127	Domanda	Il TSH (tireotropina):	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>è un ormone ipofisario</div><div>è un ormone tiroideo</div><div>è un ormone ipotalamico</div><div>ha come organo bersaglio l'ipofisi</div><div>ha come organo bersaglio l'ipotalamo</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1126	Domanda	Chi approva l'elenco ufficiale delle preparazioni per uso parenterale?	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>il Ministero della Salute</div><div>la Regione o la Provincia</div><div>l'AIFA</div><div>la commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della F.U.</div><div>non è previsto alcun elenco ufficiale delle preparazioni per uso parenterale</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1128	Domanda	Delle seguenti forme farmaceutiche compresse, quali non sono riportate in F.U.	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>intrauterine</div><div>rettali</div><div>vaginali</div><div>compresse per soluzioni e sospensioni rettili</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	B




N°	1129	Domanda	Il principio attivo talidomide è un farmaco della famiglia delle glutarimidi. Esso:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>è stato usato in passato come ipnoinducente</div><div>è teratogeno</div><div>è usato come antileprotico</div><div>è usato come antitumorale</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1131	Domanda	Tra i bloccanti della placca motrice indicati, quale provoca una paralisi muscolare più rapida nell'insorgenza e più breve nella durata?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>Metocurina</div><div>Vecuronio</div><div>Gallamina</div><div>Suametonio</div><div>Pancuronio</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1132	Domanda	La disponibilità farmaceutica di un farmaco che si presenta in due o più forme polimorfe, può essere diversa nella forma farmaceutica di	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>tutte quelle indicate</div><div>compresse</div><div>tutte quelle indicate tranne una</div><div>supposte</div><div>capsule</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1130	Domanda	Modificando opportunamente la struttura della fenetilammina si può raggiungere una maggiore selettività nei confronti del recettore adrenergico b. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>tutte le affermazioni riportate sono corrette</div><div>si deve inserire un ossidrilie sul carbonio a della catena</div><div>si deve avere una configurazione S al carbonio della catena che porta l'ossidrilie</div><div>si deve trasformare la struttura della fenetilammina in ammina secondaria</div><div>si deve sostituire con un gruppo acilico uno degli idrogeni presenti sull'atomo di azoto</div></div>	Risposta esatta	D




N°	1133	Domanda	Quale delle sperimentazioni farmacologiche sottoriportate è maggiormente correlabile al termine di sperimentazione "in doppio cieco"? Quelle	<div><div><input type="checkbox"/> A</div></div> del settore oculistico	<div><div><input type="checkbox"/> B</div></div> in cui si utilizzano farmaco e placebo	<div><div><input type="checkbox"/> C</div></div> in cui il paziente non sa qual è il farmaco e quale il placebo	<div><div><input type="checkbox"/> D</div></div> in cui né il medico né il paziente sanno qual è il farmaco e quale il placebo	<div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> in cui il medico non sa qual è il farmaco e quale il placebo	Risposta esatta	D
N°	1135	Domanda	Quale articolo della Costituzione enuncia la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div></div> art. 1	<div><div><input type="checkbox"/> B</div></div> art. 30	<div><div><input type="checkbox"/> C</div></div> art. 25	<div><div><input type="checkbox"/> D</div></div> art. 38	<div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> art. 32	Risposta esatta	E


N°	1134	Domanda	Le forme farmaceutiche a rilascio prolungato mostrano un rilascio delle sostanze attive rispetto a quello di una forma di dosaggio convenzionale somministrata per la stessa via:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div></div> più lento	<div><div><input type="checkbox"/> B</div></div> più veloce	<div><div><input type="checkbox"/> C</div></div> sequenziale e ripetuto nel tempo	<div><div><input type="checkbox"/> D</div></div> accelerato	<div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> nessuna indicazione è corretta	Risposta esatta	A
N°	1136	Domanda	Il fenilbutazone, di cui è riportata la struttura, è un farmaco FANS appartenente alla famiglia:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div></div> dei pirazolidindioni	<div><div><input type="checkbox"/> B</div></div> dei salicilati	<div><div><input type="checkbox"/> C</div></div> degli acidi arilacetici	<div><div><input type="checkbox"/> D</div></div> degli acidi eteroarilacetici	<div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> degli acidi fenamici	Risposta esatta	A









N°	1137	Domanda	Il clonitene è una miscela di isomeri E e Z. Tra i seguenti saggi: HPLC, dosaggio acidimetrico, ¹ H NMR, rotazione ottica, quale o quali possono determinare la percentuale di isomero Z?	<div><div><input type="radio"/> A</div> solo HPLC</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> rotazione ottica e ¹H NMR</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> HPLC e ¹H NMR</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> ¹H NMR e dosaggio acidimetrico</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> HPLC e rotazione ottica</div>	Risposta esatta	C
<hr/>						
N°	1139	Domanda	Quale dei seguenti farmaci si comporta da antipertensivo ad azione centrale?	<div><div><input type="radio"/> A</div> furosemide</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> clortalidone</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> nitroglicerina</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> clonidina</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> cloproliverne</div>	Risposta esatta	D
<hr/>						
N°	1140	Domanda	L'emolisi indotta dal consumo di fave, in individui predisposti, viene classificata in base al meccanismo d'azione come reazione:	<div><div><input type="radio"/> A</div> da ipersensibilità</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> da idiosincrasia</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> da intolleranze alimentari</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> anafilatoide</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> nessuna delle precedenti</div>	Risposta esatta	B




N°	1141	Domanda	Una siringa preimpressa con NaCl 0,9% ed eparina destinata dal fabbricante al lavaggio di dispositivi medici come ad esempio i cateteri è:	N°	1143	Domanda	Quale tra le classi di sostanze elencate ha effetti astringenti?
		<div><div><div>A</div><div>un dispositivo medico impiantabile non attivo;</div></div><div><div>B</div><div>un dispositivo medico contenente farmaco con funzione ancillare</div></div><div><div>C</div><div>un dispositivo medico diagnostico in vitro</div></div><div><div>D</div><div>una confezione contenente un farmaco ed un dispositivo</div></div><div><div>E</div><div>un presidio medico-chirurgico</div></div></div>				<div><div><div>A</div><div>ciclodestrine</div></div><div><div>B</div><div>destrani</div></div><div><div>C</div><div>tannini</div></div><div><div>D</div><div>saponine</div></div><div><div>E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div>	
Risposta esatta B				Risposta esatta C			
N°	1142	Domanda	Degli accoppiamenti sotto indicati, qual è quello corretto?	N°	1144	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sul metabolismo degli xenobiotici è FALSA?
		<div><div><div>A</div><div>nabumetone - antistaminico</div></div><div><div>B</div><div>ketoprofene - Morfina</div></div><div><div>C</div><div>ketorolac - antinfiammatorio</div></div><div><div>D</div><div>flurbiprofene - antichinetosico</div></div><div><div>E</div><div>nessuno degli accoppiamenti riferiti è corretto</div></div></div>				<div><div><div>A</div><div>i composti che già contengono un gruppo nucleofilo (-OH, -NH₂ ecc.) possono subire direttamente reazioni di fase II</div></div><div><div>B</div><div>ogni xenobiotico è metabolizzato esclusivamente da un unico enzima</div></div><div><div>C</div><div>le reazioni di fase II sono in genere più veloci di quelle di fase I</div></div><div><div>D</div><div>la maggior parte dei metaboliti tossici si forma nelle reazioni di fase I</div></div><div><div>E</div><div>la maggior parte delle reazioni di fase I è catalizzata dal CYP450</div></div></div>	
Risposta esatta E				Risposta esatta B			



N°	1145	Domanda	Quale dei seguenti effetti è prodotto dal verapamil avente la struttura indicata		N°	1147	Domanda	Il farmacista è tenuto ad annotare sull'etichetta, che appone sul recipiente dei medicinali galenici che allestisce in farmacia, se il medicinale deve essere adoperato per uso esterno?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>riduzione dei livelli intracellulari di AMP ciclico</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>riduzione della contrattilità del miocardio</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>accelerazione della riattivazione dei canali del Na⁺</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>riduzione dei livelli intracellulari di K⁺</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>aumento della velocità di conduzione</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>no, solo sull'etichetta che appone sull'involucro</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>sì, sempre</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>sì, ma solo ove possano sorgere dubbi sull'uso del medicinale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>sì, ma solo per i medicinali del formulario nazionale</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>no, ma è comunque tenuto ad informarne il cliente</div>	Risposta esatta	B
N°	1146	Domanda	La vitamina A (retinolo) rappresentata nella struttura indicata svolge importanti ruoli nei processi		N°	1148	Domanda	Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, può essere sciolto?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>di memoria</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>di apprendimento</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>visivi</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>di calcificazione ossea</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>di accrescimento</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>sì, con decreto del Ministero della Salute, sentita la FOI</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>sì, con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la FOI</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>sì, con ordinanza del Sindaco, sentita la FOI</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>sì, con direttiva del Presidente della Regione, sentita la FOI</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>no</div>	Risposta esatta	A

N°	1149	Domanda	La nifedipina esplica il suo effetto antipertensivo:				
				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>bloccando i canali del Na⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>aumentando la conduttanza dei canali del K⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>diminuendo la conduttanza dei canali del K⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>attivando i canali del Ca²⁺</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>bloccando i canali del Ca²⁺ voltaggio-dipendenti (VOC)</div></div>	Risposta esatta	E	
N°	1150	Domanda	Il pioglitazone è un farmaco che appartiene alla classe:				
				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>inibitori del sistema renina-angiotensina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antinfiammatori non steroidei</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>calcio-antagonisti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antidiabetici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>antipertensivi</div></div>	Risposta esatta	D	
N°	1151	Domanda	I fosfonati antivirali agiscono su:				
				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>incorporazione del virus</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>integrazione del virus</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>retrotrascrizione del virus</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>assemblaggio delle proteine virali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>processo di uscita del virus</div></div>	Risposta esatta	C	
N°	1152	Domanda	Il regime di dispensazione dei medicinali a base di nimesulide prevede la prescrizione				
				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>con ricetta ripetibile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>con ricetta non ripetibile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>con ricetta speciale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dipende se la prescrizione è effettuata da un medico ospedaliero</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono valide</div></div>	Risposta esatta	B	



N°	1153	Domanda	Per densità apparente di una polvere si intende:		N°	1155	Domanda	I progestinici possono essere utilizzati:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il rapporto tra la massa di un campione di polvere non compattata ed il suo volume, includendo il contributo dello spazio vuoto interparticellare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>il rapporto tra il peso della particella e il suo volume reale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>il rapporto tra il peso del solido e il suo volume reale sommato a quello dei pori presenti all'interno della particella</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>il rapporto tra la massa di un campione di polvere compattata ed il suo volume</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono errate</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>per diagnosticare un'insufficienza surrenale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>per diagnosticare un'insufficienza ovarica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>come antiedemigeni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>come antidiipidemici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nell'endometriosi</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1154	Domanda	La cosomministrazione di fenobarbital con uno dei farmaci sottoelencati ne diminuisce l'attività: di quale farmaco si tratta?		N°	1156	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce la clindamicina, avente la struttura indicata?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>atenolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>cromoglicato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>difenildantoina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>metformina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>pancuronio</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>acidi nucleici della cellula batterica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>subunità ribosomiale 50S</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>parete cellulare batterica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>unità ribosomiale 30S</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>metabolismo energetico della cellula batterica</div></div>	Risposta esatta	B



N°	1157	Domanda Il Tumor Necrosis Factor alfa (TNF-alfa) si ritiene che svolga un ruolo importante nelle malattie autoimmunitarie ed infiammatorie. Quale tra i seguenti è un anticorpo monoclonale umanizzato che si lega al TNF-alfa e ne inibisce l'azione?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>Etanercept</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>Infliximab</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>Muromonab</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>Siclinus</div></div>
----	------	---	--

☐

E

☐

Talidomide


N°	1158	Domanda Quale delle seguenti affermazioni sulla procaina NON è corretta	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>si utilizza come anestetico locale</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>differisce dalla procainamide per la sostituzione del gruppo ammidico con un gruppo estereo</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>ha una breve durata d'azione</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>si utilizza principalmente come antiaritmico</div></div>
----	------	--	--


☐


E


☐

esistono sue preparazioni per uso topico




N°	1161	Domanda	La oxeftacaina, avente la struttura indicata, svolge azione di natura		
					
			<div><div><input type="radio"/> A</div>spasmolitica</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>anestetica locale</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>procinetica</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>antimetabolica</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>lassativa</div>	Risposta esatta	B
N°	1162	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di diuretici? Farmaci che		
			<div><div><input type="radio"/> A</div>abbassano la pressione arteriosa</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>incrementano la produzione di urina</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>diminuiscono la produzione di urina</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>fanno eliminare acido urico</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>fanno eliminare urea</div>	Risposta esatta	B
N°	1163	Domanda	L'alcalinizzazione dell'urina favorisce l'eliminazione dei farmaci a carattere acido		
			<div><div><input type="radio"/> A</div>aumentandone la ionizzazione</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>diminuendone il riassorbimento tubulare attivo</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>aumentando il flusso urinario</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>aumentandone la lipofilia</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>aumentandone la secrezione tubulare attiva</div>	Risposta esatta	A
N°	1164	Domanda	Quale delle affermazioni riguardanti i saponi è ERRATA		
			<div><div><input type="radio"/> A</div>i saponi modificano la tensione superficiale dell'acqua</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>i tensioattivi possono essere cationici ed anionici</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>i saponi anionici che contengono potassio costituiscono i saponi molli (saponi da barba)</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>il sapone comune è un sapone cationico non contenente azoto</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>il sapone comune è un sapone anionico contenente sodio</div>	Risposta esatta	D




N°	1165	Domanda	Il composto di cui viene riportata di seguito la formula (labelabolo) si scioglie in soluzioni acquose di acido cloridrico per salificazione del gruppo funzionale indicato nella figura con		
			<div><div>A</div>1</div> <div><div>B</div>2</div> <div><div>C</div>3</div> <div><div>D</div>4</div> <div><div>E</div>1 e 4</div>		

N°	1166	Domanda	In un prodotto cosmetico è ammesso l'uso di retinoina?		
		<div><div>A</div>no, perché presente nell'elenco delle sostanze non ammesse</div> <div><div>B</div>si, se il contenuto è inferiore allo 0,2%</div> <div><div>C</div>si, se non produce effetti sistemici.</div> <div><div>D</div>si, sempre</div> <div><div>E</div>più di una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	D	

N°	1167	Domanda	Il prodotto di cui viene riportata di seguito la formula (labelabolo) si scioglie in soluzioni acquose di acido cloridrico per salificazione del gruppo funzionale indicato nella figura con		
			<div><div>A</div>1</div> <div><div>B</div>2</div> <div><div>C</div>3</div> <div><div>D</div>4</div> <div><div>E</div>1 e 4</div>		


N°	1168	Domanda	In un prodotto cosmetico è ammesso l'uso di retinoina?		
		<div><div>A</div>no, perché presente nell'elenco delle sostanze non ammesse</div> <div><div>B</div>si, se il contenuto è inferiore allo 0,2%</div> <div><div>C</div>si, se non produce effetti sistemici.</div> <div><div>D</div>si, sempre</div> <div><div>E</div>più di una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	A	

N°	1167	Domanda	Una crisi ipoglicemica lieve si tratta con:	<div><div>A</div>Glucosio</div> <div><div>B</div>Glucagone</div> <div><div>C</div>Insulina</div> <div><div>D</div>Melformina</div> <div><div>E</div>Glibenclamide</div>
----	------	---------	---	---

N°	1169	Domanda	Quale tra le caratteristiche sotto elencate differenzia maggiormente la struttura chimica della benzidamina da quella della maggioranza dei FANS?	<div><div><input type="radio"/> A</div>l'alto dosaggio necessario</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>le caratteristiche basiche</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>la presenza di due anelli aromatici</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>la presenza di una funzione eteroa</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>la presenza del gruppo diazo</div>	Risposta esatta	B
						
N°	1170	Domanda	Preparazioni galeniche di capsule contenenti prodotti utilizzati per la dieta di soggetti che praticano lo sport sono attualmente molto frequenti in farmacia. Tra i prodotti utilizzati spesso sono inclusi i così detti "amminocidi ramificati" (BCAA). Quale, tra quelli elencati, appartiene a tale categoria?	<div><div><input type="radio"/> A</div>prolina</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>glicina</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>triptofano</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>fenilalanina</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>nessuno di quelli indicati</div>	Risposta esatta	E
N°	1171	Domanda	Preparati a base di biancospino (<i>Crataegus oxyacantha</i> L.) possono dare interazioni farmacologiche con farmaci:	<div><div><input type="radio"/> A</div>prokinetici</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>coleretici</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>digitalici</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>analgesici</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>antiasmatici</div>	Risposta esatta	C
N°	1172	Domanda	Nella miastenia gravis sono impiegati farmaci che	<div><div><input type="radio"/> A</div>stimolano direttamente i recettori nicotinici</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>inibiscono le acetilcolinesterasi</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>potenziano la sintesi di acetilcolina</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>stimolano il sistema immunitario</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>facilitano il reuptake di colina</div>	Risposta esatta	B



N°	1181	Domanda Se il medico non specifica gli eccipienti o indica generalmente "eccipiente", cosa deve essere riportato in etichetta?	<div><div><div><div><div>A</div><div>semplicemente "eccipiente"</div></div><div><div>B</div><div>"miscela" o "altro" se si utilizza una miscela già pronta</div></div><div><div>C</div><div>esplicitamente la denominazione comune di tutti gli eccipienti usati</div></div><div><div>D</div><div>nulla</div></div><div><div>E</div><div>solo il diluente o l'eccipiente di maggior volume</div></div></div></div></div>			
			<div><div><div><div><div>A</div><div>si può usare l'acido dietilbarbiturico</div></div><div><div>B</div><div>si deve usare il feniletilbarbiturato di sodio</div></div><div><div>C</div><div>se si usa il feniletilbarbiturato di sodio, nella tariffazione deve essere calcolato il prezzo dell'acido feniletilbarbiturico</div></div><div><div>D</div><div>si deve usare l'acido feniletilbarbiturico</div></div><div><div>E</div><div>si possono usare indifferentemente il feniletilbarbiturato di sodio e il fenobarbital</div></div></div></div></div>			<div>Risposta esatta</div> <div>D</div>
N°	1182	Domanda Quale dei seguenti composti, utilizzabili come anestetici generali, è liquido a temperatura ambiente e a pressione atmosferica? <div><chem>CN1C=NC2=C1C(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=C3)C(F)=C3)N(C)CC3</chem></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>protossido d'azoto</div></div><div><div>B</div><div>tiopentale sodico</div></div><div><div>C</div><div>midazolam (struttura indicata)</div></div><div><div>D</div><div>nessuno in quanto, dei composti indicati, due sono solidi ed uno gassoso</div></div><div><div>E</div><div>nessuno in quanto i composti indicati sono tutti solidi</div></div></div></div></div>			
			<div><div><div><div><div>A</div><div>la prima tecnica è più pericolosa della seconda</div></div><div><div>B</div><div>la prima tecnica è meno pericolosa della seconda</div></div><div><div>C</div><div>le due tecniche presentano all'incirca il medesimo grado (elevato) di pericolosità</div></div><div><div>D</div><div>le due tecniche non presentano nessuna pericolosità</div></div><div><div>E</div><div>le due tecniche presentano all'incirca il medesimo grado (trascurabile) di pericolosità</div></div></div></div></div>			<div>Risposta esatta</div> <div>C</div>
N°	1183	Domanda Una ricetta galenica prescrive: fenobarbital g 0,2 e lattosio g 0,5. Nella preparazione				
N°	1184	Domanda Dovendo valutare le indagini diagnostiche TAC e Raggi X dal punto di vista dell'eventuale danno che possono provocare all'organismo, si può dire che				



N°	1185	Domanda	L'intervento dell'Organismo notificato è previsto:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>per i dispositivi medici impiantabili attivi;</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>per i dispositivi medici di classe IIa, IIb, III;</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>per i dispositivi medici di classe I sterili e per quelli di classe I con funzione di misura;</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>per tutti i dispositivi menzionati nelle altre risposte ad eccezione dei dispositivi su misura</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>solo per i dispositivi su misura</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1187	Domanda	Il verapamil, avente la struttura riportata a lato, è un farmaco	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>alfa bloccante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>calcio antagonista</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>beta bloccante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>diuretico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>antistaminico</div></div>	Risposta esatta	B


COc1cc(OC)cc(CCN(C)CCN(C)CC2=C(C)C(=C(C)C)C2)c1

N°	1186	Domanda	L'angidensina II è:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un polisaccaride</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>una catecolammina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>un peptide</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>un alcaloide</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1188	Domanda	Quale è la durata di validità di una ricetta ripetibile per medicinali diversi dagli stupefacenti?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>dieci giorni escluso quello di emissione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dieci giorni compreso quello di emissione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>non ha scadenza</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sei mesi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>novanta giorni, salva diversa indicazione del medico e comunque non più di un anno</div></div>	Risposta esatta	D




N°	1189	Domanda	Come devono essere effettuate le annotazioni sul registro entrata e uscita stupefacenti?		N°	1191	Domanda	Per determinare il prezzo di acquisto dei medicinali di fascia A, il termine sconto netto indica:	
		<input type="checkbox"/> A	in ordine cronologico e in alcuni casi anche alfabetico				<input type="checkbox"/> A	la percentuale di sconto da applicare sul prezzo al pubblico	
		<input type="checkbox"/> B	in base alle direttive della Regione				<input type="checkbox"/> B	la percentuale di ricarico da applicare sul costo	
		<input type="checkbox"/> C	a discrezione del farmacista				<input type="checkbox"/> C	la percentuale di sconto da applicare sul prezzo al pubblico derivato	
		<input type="checkbox"/> D	secondo l'ordine stabilito dalla A.S.L.				<input type="checkbox"/> D	il prezzo di cessione applicato dal fornitore	
		<input type="checkbox"/> E	in ordine cronologico				<input type="checkbox"/> E	nessuna delle indicazioni è corretta	
			Risposta esatta	E				Risposta esatta	C

N°	1190	Domanda	Quale, tra quelli indicati, è un effetto collaterale dei farmaci antagonisti dei recettori alfa1 adrenergici?		N°	1192	Domanda	La maprotilina ha la struttura indicata. Quale, tra quelle indicate, è la sua attività farmacologica fondamentale	
		<input type="checkbox"/> A	ipotensione posturale				<input type="checkbox"/> A	Ipnoduceute	
		<input type="checkbox"/> B	aumentato stimolo alla minzione				<input type="checkbox"/> B	Analgesica	
		<input type="checkbox"/> C	bradicardia marcata				<input type="checkbox"/> C	Antimicrobica	
		<input type="checkbox"/> D	costipazione				<input type="checkbox"/> D	Antidepressiva	
		<input type="checkbox"/> E	midriasi				<input type="checkbox"/> E	Antifungina	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	D



N°	1193	Domanda	Quale delle affermazioni riportate è corretta? I due enantiomeri di un farmaco hanno identiche proprietà chimico-fisiche quindi essi NON differiscono per quanto riguarda	<div><div><div><div>A</div><div>il metabolismo</div></div><div><div>B</div><div>l'attività biologica</div></div><div><div>C</div><div>la distribuzione passiva</div></div><div><div>D</div><div>gli effetti secondari</div></div><div><div>E</div><div>la velocità di eliminazione</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>C</div>
N°	1195	Domanda	Possono essere impiegati come antilucera principi attivi compresi nella classe degli:	<div><div><div><div>A</div><div>inibitori della H⁺/K⁺ ATPasi</div></div><div><div>B</div><div>antagonisti del recettore muscarinico M1</div></div><div><div>C</div><div>antagonisti del recettore istaminergico H2</div></div><div><div>D</div><div>tutti quelli indicati</div></div><div><div>E</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>D</div>
N°	1194	Domanda	Con quali sigle si può indicare una diluizione 50 millesimale?	<div><div><div><div>A</div><div>CH</div></div><div><div>B</div><div>LM e 50/M</div></div><div><div>C</div><div>DH</div></div><div><div>D</div><div>K</div></div><div><div>E</div><div>nessuna di quelle indicate</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>
N°	1196	Domanda	L'efficienza dell'attività antibatterica dell'acido benzoico e dei suoi analoghi contenenti un carbossile è molto più alta in ambiente acido che neutro. Questa differenza di attività è dovuta	<div><div><div><div>A</div><div>alla maggiore sensibilità del batterio all'ambiente acido</div></div><div><div>B</div><div>alla maggiore concentrazione di farmaco che si realizza all'interno della cellula</div></div><div><div>C</div><div>alla permeazione della cellula batterica da parte degli idrogenioni</div></div><div><div>D</div><div>alla maggiore stabilità del farmaco in ambiente acido</div></div><div><div>E</div><div>a nessuna delle ragioni indicate</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>




N°	1197	Domanda	I farmaci inibitorilassanti ad azione centrale hanno effetto:	Risposta esatta	
				B	
N°	1199	Domanda	Le PBP (Penicillin Binding Proteins) sono localizzate:	Risposta esatta	
				A	
N°	1200	Domanda	Per quale delle seguenti indicazioni è utilizzabile la calcitonina di salmone?	Risposta esatta	
				E	





N°	1201	Domanda	Le proteine G:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>sono formate da tre subunità uguali, dotate di attività GTPasica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sono formate da tre subunità, a, b, g, tutte in grado di legare GDP o GTP</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sono formate da tre subunità, a, b, g, di cui solo la a è in grado di legare GDP o GTP</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sono formate da 2 subunità a, b, entrambe dotate di attività GTPasica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sono dei monomeri in grado di legare GTP o GDP</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1202	Domanda	Nella preparazione di una emulsione O/A i coloidi idrofili sono impiegati per	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>stabilizzare l'emulsione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>mascherare odori o sapori sgradevoli</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>aumentare la possibile quantità della fase dispersa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>migliorare l'aspetto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>diminuire la consistenza della preparazione</div></div>	Risposta esatta	A

N°	1203	Domanda	L'utilizzazione terapeutica di un principio attivo presuppone in molti casi la presenza di alcuni additivi, privi di attività farmacologica, che sono però necessari per preparare la forma farmaceutica opportuna. Quale, tra gli accoppiamenti seguenti (sostanza-attività specifica), è corretto?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Bentonite - agente levigante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Palmitato di potassio - tensioattivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Iodossido di Alluminio - diluente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Stearato di calcio - lubrificante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni fornite sono corrette tranne una</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1204	Domanda	In quanto tempo un farmacista è tenuto ad eseguire una preparazione galenica magistrale ?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un giorno</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>due giorni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tre giorni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nel tempo strettamente necessario</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>prima possibile, entro il tempo massimo di cinque giorni</div></div>	Risposta esatta	D



N°	1205	Domanda Droghe vegetali contenenti caffeina vengono utilizzate in preparati dimagranti. Quale, tra gli effetti farmacologici indicati, è svolto dalla caffeina:		N°	1207	Domanda Chi autorizza le farmacie alla vendita di sostanze stupefacenti?	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>aumento dell'utilizzazione dei carboidrati</div><div>stimolazione della lipolisi nel tessuto adiposo</div><div>eliminazione delle scorie</div><div>induzione del senso di sazietà</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>il Ministero della Salute</div><div>la Regione</div><div>l'Azienda Sanitaria Locale</div><div>l'Autorità di pubblica sicurezza</div><div>non è necessaria alcuna autorizzazione per le farmacie</div></div>
			Risposta esatta B			Risposta esatta E	

N°	1206	<div><div></div><div>Domanda La cocaina, di cui si riporta la struttura, esplica azioni simpatcominetiche. Quale delle affermazioni seguenti è corretta?</div></div>		N°	1208	Domanda L'angiotensinogeno è:	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>agisce come agonista adrenergico diretto</div><div>inibisce le MAO-A</div><div>inibisce le MAO-B</div><div>impedisce il reuptake neuronale delle ammine biogene</div><div>agisce come agonista colinergico a livello gangliare</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>un farmaco antipertensivo antagonista dell'angiotensina II</div><div>il substrato dell'enzima renina dal quale viene trasformato in angiotensina I</div><div>un frammento inattivo del peptide angiotensina I</div><div>il recettore a livello renale dell'angiotensina II</div><div>il substrato dell'enzima di conversione (ACE)</div></div>
			Risposta esatta D			Risposta esatta B	




N°	1209	Domanda	Quale delle azioni elencate NON si osserva con i diuretici inibitori dell'anidresi carbonica	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>aumento di HCO_3^- nell'urina</div><div>acidosi sistemica</div><div>diminuzione della riserva alcalina</div><div>ipodemia</div><div>ipokaliemia</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1211	Domanda	L'Autorità Competente in materia di cosmetici è:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>il Ministero della Salute</div><div>il Ministero della Salute, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico</div><div>l'Istituto Superiore di Sanità</div><div>il Ministero dello Sviluppo Economico</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1210	Domanda	La Farmacopea Ufficiale riporta una serie di metodiche analitiche per giudicare sulla identità di due sostanze. Tra i metodi sotto indicati quale ha maggiore affidabilità nei casi che si possono presentare più comunemente: la determinazione	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>del punto di fusione in miscela</div><div>dello spettro UV</div><div>della densità</div><div>del potere rotatorio specifico</div><div>dell'indice di rifrazione</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1212	Domanda	I farmaci antidepressivi tricyclici di prima generazione sono CONTROINDICATI in pazienti affetti da ipertrofia prostatica, glaucoma od ileo paralitico a causa di:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>azione antimuscarinica</div><div>una ridotta sintesi di somatostatina</div><div>riduzione della fluidità di membrana</div><div>inibizione del reuptake della serotonina</div><div>antagonismo funzionale dei recettori dopaminergici</div></div></div>	Risposta esatta	A



N°	1213	Domanda	Secondo il decreto del Ministero della Sanità del 15 novembre 2005, entro quanti giorni deve pervenire al Ministero della Salute la segnalazione di incidente con dispositivo medico o con dispositivo medico-diagnostico in vitro da parte dell'operatore sanitario?		N°	1215	Domanda	La somministrazione di bicarbonato può essere utile per	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>dieci giorni dal giorno in cui si è verificato l'evento</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>non è previsto alcun termine</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>venti giorni dal giorno in cui si è verificato l'evento</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>venticinque giorni dal giorno in cui si è verificato l'evento</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>trenta giorni dal giorno in cui si è verificato l'evento</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>acidificare l'urina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>correggere il volume plasmatico in caso di shock emorragico</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>correggere l'acidosi metabolica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>correggere l'alterazione del pH del sangue in seguito ad alcalosi metabolica o respiratoria</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>diminuire la solubilità nell'urina di acidi deboli quali l'acido urico o i sulfamidici</div>	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	C

N°	1214	Domanda	Il concorso per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche è in ambito		N°	1216	Domanda	Un turista straniero chiede informazione in farmacia per conoscere quale specialità medicinale italiana è equivalente a quella in commercio nel suo Paese come contenente un'associazione di principi attivi indicata nella classificazione ATC con S01GA51. Quale, tra i principi attivi che possono corrispondere alle indicazioni sotto riportate, è più simile a quello richiesto?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>nazionale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>regionale</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>provinciale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>comunale</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>più di una indicazione è corretta</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>R01GA51</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>C05AX02</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>S01GX</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>S01GA</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuno di quelli indicati</div>	
			Risposta esatta	E				Risposta esatta	D



N°	1217	Domanda	Quale dei seguenti prodotti antitumorali cerfamente NON agisce mediante abilitazione del DNA
		 A clorambucile B busulfan C procarbazine (struttura indicata) D ciclofosfamide E mercaptopurina	Risposta esatta E
N°	1218	Domanda	L'eritromicina NON è un farmaco elettivo nelle infezioni sostenute da
		A Streptococcus pyogenes B Salmonella typhi C Bordetella pertussis D Mycoplasma pneumoniae E Legionella pneumophila	Risposta esatta B
N°	1219	Domanda	Un "latte di proseguimento" rappresenta:
		A un latte di crescita B componente lattea del regime alimentare diversificato del lattante C un latte addizionato di vitamine e minerali D un baby food E un sostituto del latte materno	Risposta esatta B
N°	1220	Domanda	In un comune con una popolazione di 12.500 abitanti qual è il numero complessivo di farmaci che possono essere istituite sulla base dei diversi criteri previsti dalla legge?
		A 2 B 3 C 4 D 3 se private, 4 se almeno una è pubblica E 3 se private, 4 se almeno 2 sono pubbliche	Risposta esatta C


N°	1221	Domanda	L'ipotensione ortostatica indotta dall'imipramina è causata, almeno in parte, da:	<div><div><div>A</div><div>inibizione dei reuptake della norepinefrina nelle terminazioni simpatiche</div></div><div><div>B</div><div>azione ganglioplegica transitoria</div></div><div><div>C</div><div>blocco dei recettori alfa1 adrenergici</div></div><div><div>D</div><div>riduzione della sintesi di renina</div></div><div><div>E</div><div>blocco dei recettori muscarinici</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>C</div>
----	------	---------	---	--

N°	1222	Domanda	La potenza di un farmaco esprime:	<div><div><div>A</div><div>la durata dell'effetto</div></div><div><div>B</div><div>l'effetto massimo raggiungibile</div></div><div><div>C</div><div>la dose necessaria a ottenere una data intensità di effetto</div></div><div><div>D</div><div>l'indice terapeutico</div></div><div><div>E</div><div>la tossicità</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>C</div>
----	------	---------	-----------------------------------	---


N°	1223	Domanda	Si devono preparare 0,250 l di una soluzione di NaOH al 4% m/v. Entro quale intervallo ricade la quantità di soda caustica da pesare?	<div><div><div>A</div><div>800 - 1200 mg</div></div><div><div>B</div><div>2 - 5 g</div></div><div><div>C</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div><div><div>D</div><div>15 - 25 g</div></div><div><div>E</div><div>10 - 15 g</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
----	------	---------	---	---

N°	1224	Domanda	Il glicerolo (I) e l'urea (II) insieme a isosorbide e mannitolo sono impiegati in terapia come diuretici. Essi appartengono al gruppo dei diuretici	<div><div><div><div><div><div>OH</div><div>OH</div><div>OH</div></div><div><div>CH₂</div><div>CH</div><div>CH₂</div></div><div><div>OH</div><div>NH₂</div><div>OH</div></div></div><div><div>(I)</div><div>(II)</div></div></div><div><div><div>A</div><div>inibitori dell'anidrasi carbonica</div></div><div><div>B</div><div>inibitori del simporto Na⁺, K⁺, 2Cl⁻ (diuretici dell'ansa)</div></div><div><div>C</div><div>inibitori del simporto Na⁺, Cl⁻ (diuretici tiazidici)</div></div><div><div>D</div><div>osmotici</div></div><div><div>E</div><div>inibitori dei canali del Na⁺ dell'epitelio renale (diuretici risparmiatori di K⁺)</div></div></div><div>Risposta esatta</div><div>D</div></div></div>
----	------	---------	---	---

N°	1225	Domanda	Il rituximab si utilizza	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>nei linfomi a cellule B</div><div>nei tumori cerebrali</div><div>nella psoriasi</div><div>nella profilassi del rigetto d'organo</div><div>nel carcinoma prostatico</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1227	Domanda	L'Autorità competente in materia di cosmeovigilanza è	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>Il Ministero della Salute insieme alle autorità sanitarie territoriali</div><div>Il Ministero della Salute, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico</div><div>l'Istituto Superiore di Sanità</div><div>il Ministero dello Sviluppo Economico</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1226	Domanda	Per essere efficiente, secondo le linee guida dell'OMS, un sistema di segnalazione spontanea delle reazioni avverse deve raccogliere almeno:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>1000 segnalazioni di ADR/milione di abitanti</div><div>100 segnalazioni di ADR/milione di abitanti</div><div>250 segnalazioni di ADR/milione di abitanti</div><div>5.000 segnalazioni all'anno</div><div>10.000 segnalazioni all'anno</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1228	Domanda	Qual è l'accoppiamento di sigla e nome più corretto tra quelli sotto riportati e riferiti agli emulsionanti più comuni?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>tween 20 - sorbitano monostearato</div><div>tween 80 - metilcellulosa</div><div>span 40 - poliossietilen sorbitan monooleato</div><div>tween 80 - poliossietilen sorbitan monooleato</div><div>più di una delle affermazioni riportate è corretta</div></div>	Risposta esatta	D




N°	1229	Domanda	Una confezione contenente una siringa preimpianta con farmaco è da considerarsi:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un farmaco di cui la siringa costituisce il contenitore primario</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>un dispositivo medico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>un dispositivo medico combinato con farmaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>una confezione contenente un farmaco ed un dispositivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>un presidio medico-chirurgico</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1231	Domanda	L'amfetamina, avente la struttura indicata, penetra nel sistema nervoso centrale in quanto	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ha un elevato coefficiente di ripartizione lipid/acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>non viene degradata dalle MAO</div></div> <div><div><div><chem>CC(N)Cc1ccccc1</chem></div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>non viene metabolizzata dalle COMT</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è coniugata con acido glicuronico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ha struttura catecolica</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1232	Domanda	Entro quanto tempo dalla richiesta il farmacista ha l'obbligo di procurarsi un medicinale autorizzato in Italia, di cui non sia provvisto?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un giorno</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>due giorni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tre giorni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>entro il periodo di validità della ricetta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nel più breve tempo possibile</div></div>	Risposta esatta	E




N°	1233	Domanda	Entro quale degli intervalli indicati ricade la dose giornaliera di mantenimento della digossina?	<div><div>A</div>0,1 - 0,4 mg/die</div> <div><div>B</div>1 - 2 mg/die</div> <div><div>C</div>20 - 40 mg/die</div> <div><div>D</div>90 - 100 mg/die</div> <div><div>E</div>0,2 - 0,4 mg/die</div>	Risposta esatta	A
N°	1235	Domanda	Quat'è il limite di prescrizione per medicinali stupefacenti della tabella II Sez. A del D.P.R. n. 309/1990 non inseriti nell'Al. II-bis?	<div><div>A</div>una sola confezione di medicinale senza limiti di dosaggio</div> <div><div>B</div>uno o più medicinali purchè con dosaggio globale non superiore a 30 giorni di terapia</div> <div><div>C</div>un solo medicinale per una cura di durata non superiore a 30 giorni</div> <div><div>D</div>si differenzia per preparazioni iniettabili e preparazioni orali</div> <div><div>E</div>si differenzia per l'uso veterinario rispetto all'uso umano</div>	Risposta esatta	C



N°	1234	Domanda	I medicinali soggetti a ricetta medica detta "limitativa" sono quelli	<div><div>A</div>vendibili su presentazione di ricetta ministeriale speciale</div> <div><div>B</div>con prescrizione o impiego riservato a particolari medici o ambienti</div> <div><div>C</div>che contengono sostanze compresse nella Tab. n.°3 della F.U.</div> <div><div>D</div>omeopatici</div> <div><div>E</div>SOP</div>	Risposta esatta	B
N°	1236	Domanda	Il polietilene può essere ottenuto in due tipi principali: ad alta densità e a bassa densità. Quali delle seguenti caratteristiche del polimero aumenta all'aumentare della densità?	<div><div>A</div>punto di fusione</div> <div><div>B</div>durezza</div> <div><div>C</div>impermeabilità ai gas</div> <div><div>D</div>resistenza ai solventi</div> <div><div>E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>	Risposta esatta	E




N°	1237	Domanda	Il naloxone viene impiegato:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>nel trattamento della depressione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>nel trattamento dell'ipertensione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>nella prevenzione della sindrome d'astinenza da morfina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nel trattamento della schizofrenia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nel trattamento dell'overdose da eroina</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1239	Domanda	Degli accoppiamenti indicati, qual è quello corretto?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Metoprololo – antimicotico – beta-bloccante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Econazolo – Antinfettico – forma dei pori nella membrana fungina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Miconazolo – Antinfettico – blocca la sintesi dell'ergosterolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Pantoprazolo – antitubercolare – blocca i recettori dell'istamina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Fluconazolo – antimicotico – blocca la sintesi del DNA fungino</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1240	Domanda	E' necessaria una specifica autorizzazione per detenere in farmacia medicinali costituiti da tossine e allergeni?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>sì, sempre</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no, mai</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>no, ma la detenzione è consentita soltanto nelle farmacie ospedaliere</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>no, se i quantitativi detenuti non superano i limiti di volta in volta fissati dal ministero</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sì, quando la detenzione sia ai fini della somministrazione</div></div>	Risposta esatta	B




N°	1241	Domanda	Si devono preparare 350 ml di una soluzione di acido salicilico al 3% in alcool etilico al 70%. Entro quale intervallo ricade la quantità di acido salicilico da pesare?	<input type="radio"/> A 9 - 11 g <input type="radio"/> B 90 - 110 mg <input type="radio"/> C 90 - 110 dg <input type="radio"/> D 900 - 1100 dg <input type="radio"/> E Più di uno tra quelli indicati	Risposta esatta	E
N°	1243	Domanda	Per quale motivo il rivestimento delle compresse costituito dal prodotto avente la struttura riportata che prende il nome di Eudragit L 100 si solubilizza facilmente a livello intestinale	<input type="radio"/> A per più di uno dei motivi indicati <input type="radio"/> B per nessuno dei motivi elencati <input type="radio"/> C perché ha carattere cationico <input type="radio"/> D perché in ambiente acido si saponifica la funzione esterea <input type="radio"/> E perché in ambiente acido si salifica la funzione carbossilica	Risposta esatta	B
N°	1244	Domanda	Quale di queste sostanze NON è un agente allucinogeno?	<input type="radio"/> A LSD <input type="radio"/> B psilocibina <input type="radio"/> C fenciclidina <input type="radio"/> D dontidina <input type="radio"/> E mescalina	Risposta esatta	D




N°	1245	Domanda Il farmacista può consegnare medicinali assoggettati a prescrizione medica senza presentazione della relativa ricetta?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>si sempre, se il cliente anticipa le spese di porto</div><div>si, purché il cliente produca la ricetta medica entro tre giorni</div><div>no, mai</div><div>si, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa che consente tale consegna in caso di necessità e urgenza</div><div>no, se si tratta di medicinali non compresi nelle liste di equivalenza redatte dall'AIFA</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1246	Domanda I diuretici inibitori dell'anidridasi carbonica provocano ipostauria e ipercalcemia; a ciò consegue	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>iponagnesmia</div><div>compromessa tolleranza ai carboidrati</div><div>iperlipidemia</div><div>diabete insipido</div><div>calcolosi renale</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1247	Domanda La morfina provoca:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>midriasi</div><div>solo dipendenza psichica</div><div>nessuno degli effetti indicati</div><div>dipendenza fisica e psichica</div><div>solo dipendenza fisica</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1248	Domanda I cosmetici commercializzati allo stato sfuso devono essere venduti unitamente a un foglio indicante	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore</div><div>il contenuto nominale al momento del confezionamento, eccetto i monodose e i campioni gratuiti</div><div>l'elenco completo degli ingredienti in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione,</div><div>la funzione del cosmetico, se non risulta dalla presentazione dello stesso</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div></div>	Risposta esatta	E




N°	1249	Domanda	Le penicilline vengono eliminate soprattutto per:	<div><div><div>A</div></div><div>via biliare</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>secrezione tubulare</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>filtrazione glomerulare</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>via cutanea</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>via respiratoria</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1251	Domanda	Indicare il tipo di diuretico impiegato per il trattamento medico della nefrolitiasi (calcoli di fosfato di calcio o ossalato di calcio):	<div><div><div>A</div></div><div>inibitori dell'anidrasi carbonica</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>diuretici osmotici</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>diuretici attivi sull'ansa di Henle</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>diuretici tiazidici</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>antagonisti dell'aldosterone</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1250	Domanda	L'allopurinolo, avente la struttura indicata, è un farmaco ad azione	<div><div><div>A</div></div><div>antineoplastica</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>anti-periferica</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>diuretica</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>antipertensiva</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>antinfiammatoria</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1252	Domanda	La galantamina può essere impiegata	<div><div><div>A</div></div><div>nel morbo di Parkinson</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>nelleplessia temporale</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>nella demenza di Alzheimer</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>nell'anoressia nervosa</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nella depressione endogena</div></div>	Risposta esatta	C



N°	1253	Domanda	Quale delle coppie indicate di aminoacidi, riportati in struttura, appartiene alla categoria dei così detti "aminoacidi ramificati" (BCAA)?	N°	1255	Domanda	Dopo assunzione orale, lo stato fisico dello xenobiotico può influenzare
		<div><div><chem>CC(C)[C@H](O)[C@@H](N)C(=O)O</chem> VALINA (I)</div><div><chem>CC(C)[C@H](O)[C@@H](N)C(=O)O</chem> VALINA (II)</div><div><chem>CC(C)[C@H](O)[C@@H](N)C(=O)O</chem> VALINA (III)</div><div><chem>CC(C)[C@H](O)[C@@H](N)C(=O)O</chem> VALINA (IV)</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div> VALINA (I) e PROLINA (II)</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> VALINA (I) e LISINA (III)</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> LISINA (III) e TREONINA(IV)</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> VALINA (I) e TREONINA (IV)</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> nessuna delle coppie indicate</div>				




N°	1257	Domanda	Una ricetta galenica prevede l'impiego di Bleu di metilene. Il preparato	<div><div><div>A</div></div><div>ha proprietà spasmolitiche</div><div><div>B</div></div><div>è un blando lassativo</div><div><div>C</div></div><div>presenta incompatibilità chimiche</div><div><div>D</div></div><div>comporta una tariffazione che prevede l'aggiunta di diritti addizionali</div><div><div>E</div></div><div>non richiede ricetta medica</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1259	Domanda	In un comune con una popolazione di 7500 abitanti quali è il numero complessivo di farmacie che possono essere istituite sulla base dei diversi criteri previsti dalla legge?	<div><div><div>A</div></div><div>1</div><div><div>B</div></div><div>2</div><div><div>C</div></div><div>3</div><div><div>D</div></div><div>2 se entrambe private, 3 se almeno una è pubblica</div><div><div>E</div></div><div>2 se entrambe private, 3 se almeno 2 sono pubbliche</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1260	Domanda	Le benzodiazepine agiscono come:	<div><div><div>A</div></div><div>agonisti del recettore GABA-B</div><div><div>B</div></div><div>modulatori allosterici del recettore GABA-A</div><div><div>C</div></div><div>antagonisti dei recettori al glutammato</div><div><div>D</div></div><div>bloccanti della sintesi del GABA</div><div><div>E</div></div><div>agonisti dopaminergici</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1258	Domanda	L'apertura di una farmacia succursale può essere autorizzata:	<div><div><div>A</div></div><div>nel caso di mancata apertura della farmacia prevista in pianta organica</div><div><div>B</div></div><div>nel caso di mancata apertura del dispensario farmaceutico</div><div><div>C</div></div><div>nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo con meno di 12.500 abitanti</div><div><div>D</div></div><div>nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo indipendentemente dal numero degli abitanti</div><div><div>E</div></div><div>in più di uno dei casi indicati</div></div>	Risposta esatta	D



N°	1261	Domanda	L'etichetta di un dispositivo medico deve riportare:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1263	Domanda	Con quale dei seguenti recettori interagisce l'LSD?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1262	Domanda	Un farmacista che abbia ceduto le proprie quote di una società per la gestione di una farmacia privata può assumere la gestione provvisoria di una farmacia?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1264	Domanda	Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni d'uso, possono essere dannosi per la salute	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	A




N°	1265	Domanda	Il farmacista è tenuto ad apporre sulle ricette non ripetibili il timbro attestante la vendita del prodotto?	<div><div><div>A</div></div><div>si, sempre</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>no, se viene rilasciato scontrino fiscale</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>no, mai</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>si, ma solo per le ricette del servizio sanitario nazionale</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>si, ma solo per le ricette spedite al fuori del servizio sanitario nazionale</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1267	Domanda	Oltre al timbro e alla data di spedizione, sulla ricetta ripetibile il farmacista deve riportare	<div><div><div>A</div></div><div>il nome dell'acquirente</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>la dose di somministrazione</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>la data possibile per la successiva spedizione</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuno degli elementi indicati</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1266	Domanda	La zidovudina è un antivirale che agisce:	<div><div><div>A</div></div><div>da antimetabolita</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>da inibitore della RNA polimerasi</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>da inibitore della trascrittasi inversa</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>da inibitore della proteasi virale</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>con più d'uno di questi meccanismi</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1268	Domanda	La prescrizione di medicinali destinati all'uomo per la terapia di animali è consentita	<div><div><div>A</div></div><div>in nessun caso</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>soltanto per gli animali da compagnia</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>soltanto per gli animali produttori di alimenti per l'uomo</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>nei casi eccezionali stabiliti dalla legge</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>per le sole specie animali indicate in apposito Decreto Ministeriale</div></div>	Risposta esatta	D




N°	Domanda	N°	Domanda						
1269	Quale delle seguenti definizioni si avvicina maggiormente alla definizione di avitaminosi?	1271	Quale tra i farmaci antimicrobici di seguito riportati provoca inibizione della sintesi proteica ribosomiale?						
<div><div><div>A</div></div><div>malattia causata dalla carenza totale di una o più vitamine nell'organismo</div></div>	<div><div><div>A</div></div><div>trimetoprim</div></div>	<div><div><div>B</div></div><div>carenza di una o più vitamine nella dieta</div></div>	<div><div><div>B</div></div><div>dapsone</div></div>	<div><div><div>C</div></div><div>condizione clinica associata ad una carenza di una o più vitamine nell'organismo</div></div>	<div><div><div>C</div></div><div>cloranfenicolo</div></div>	<div><div><div>D</div></div><div>condizione clinica associata ad un apporto di vitamine non completo e bilanciato</div></div>	<div><div><div>D</div></div><div>penicilline</div></div>	<div><div><div>E</div></div><div>eccesso di vitamine nella dieta</div></div>	<div><div><div>E</div></div><div>nitroimidazoli</div></div>
Risposta esatta A		Risposta esatta C							



N°	Domanda	1270	Domanda	1272	N°
	L'attività antinfiammatoria dell'acido acetilsalicilico è dovuta al fatto che		Se una sostanza si scioglie in olio e NON in acqua, essa sarà verosimilmente		
	<div><div><div>A</div></div><div>è un inibitore specifico delle prostaglandine</div></div>		<div><div><div>A</div></div><div>polare</div></div>		
	<div><div><div>B</div></div><div>inibisce reversibilmente i sistemi enzimatici denominati ciclossigenasi</div></div>		<div><div><div>B</div></div><div>apolare</div></div>		
	<div><div><div>C</div></div><div>acella un gruppo ossidrilico della serina presente sulla ciclossigenasi</div></div>		<div><div><div>C</div></div><div>ionica</div></div>		
	<div><div><div>D</div></div><div>provoca più di uno degli effetti indicati</div></div>		<div><div><div>D</div></div><div>tamponata</div></div>		
	<div><div><div>E</div></div><div>incrementa la concentrazione di trombassano</div></div>		<div><div><div>E</div></div><div>dissociata</div></div>		
	Risposta esatta C		Risposta esatta B		





N°	1273	Domanda	Qual è la legge che disciplina a livello nazionale il settore dei cosmetici?	N°	1275	Domanda	Gli unguenti (detti) sono definiti dalla F.U. come:
		<div><div><div>A</div><div>Legge n. 713/86, successive modifiche e integrazioni</div></div><div><div>B</div><div>D.Lgs 46/97</div></div><div><div>C</div><div>D.Lgs n. 507/92</div></div><div><div>D</div><div>D.Lgs. 37/2010</div></div><div><div>E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div>					<div><div><div>A</div><div>preparazioni le cui basi contengono solitamente acqua, glicerolo o glicole propilenico, gelificati con adatte sostanze</div></div><div><div>B</div><div>preparazioni le cui basi possono assorbire notevoli quantità di acqua e formare emulsioni olio-in-acqua(O/A)</div></div><div><div>C</div><div>preparazioni monofasiche che hanno basi miscibili con l'acqua, quali miscele di macrogol</div></div><div><div>D</div><div>preparazioni multifasiche a base emulsionata con fase acquosa esterna</div></div><div><div>E</div><div>nessuna delle definizioni è corretta</div></div></div>
		Risposta esatta	A			Risposta esatta	C


N°	1274	Domanda	I diuretici provvisti del gruppo funzionale solfammidico sono impiegati comunemente per la cura e la prevenzione del mal di montagna acuto in quanto inibiscono	N°	1276	Domanda	Quale, tra le coppie elencate, appartiene alla categoria dei cosiddetti "amminoacidi ramificati" (BCAA)?
		<div><div><div>A</div><div>il trasporto simultaneo di Na⁺, K⁺, 2Cl⁻</div></div><div><div>B</div><div>il trasporto simultaneo di Na⁺, Cl⁻ del nefrone</div></div><div><div>C</div><div>l'anidasi carbonica del globulo rosso</div></div><div><div>D</div><div>l'anidasi carbonica dei plessi corioidei cerebrali</div></div><div><div>E</div><div>l'anidasi carbonica del nefrone</div></div></div>					<div><div><div>A</div><div>alanina (I) e valina (II)</div></div><div><div>B</div><div>valina (II) e leucina (III)</div></div><div><div>C</div><div>leucina (III) e prolina (IV)</div></div><div><div>D</div><div>alanina (I) e prolina (IV)</div></div><div><div>E</div><div>più di una delle coppie indicate</div></div></div>
		Risposta esatta	D			Risposta esatta	B



N°	1281	Domanda Quale, tra le funzioni azotate sotto riportate, deve essere presente in un farmaco spasmolitico neurotroppo nel quale si vuole circoscrivere l'azione farmacologica esclusivamente a livello intestinale	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>amminica primaria</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>amminica secondaria</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>amminica terziaria</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ammonica quaternaria</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ammidica primaria</div></div>		
N°	1283	Domanda Il diclofenac, dal punto di vista della sua struttura molecolare, è un <div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>derivato dell'acido salicilico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>derivato della serie dei pirazolonici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>prodotto correlato ai pirazolidindoni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ibrido tra acidi fenilacetici e fenamati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>analogo della indometacina</div></div>		Risposta esatta D
N°	1282	Domanda La scopolamina, avente la struttura indicata, è un alcaloide a nucleo <div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>indolico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>imidazolico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tropanico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tropolonico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>benziscolinico</div></div>		Risposta esatta C
N°	1284	Domanda L'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali spetta:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>al titolare o al direttore responsabile o al gestore provvisorio della farmacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>al solo titolare della farmacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>al titolare o al direttore responsabile della farmacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>al solo gestore provvisorio della farmacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>al titolare o al gestore provvisorio della farmacia</div></div>		Risposta esatta A



N°	1285	Domanda	Il sodio cromoglicato ha la struttura indicata. Quale delle affermazioni seguenti è corretta? Tale farmaco
			
		<div><div>A</div>non è attivo sulle riniti allergiche</div> <div><div>B</div>contiene un principio attivo che è un analogo strutturale dell'acido cromoglicico</div> <div><div>C</div>si utilizza per la profilassi dell'asma bronchiale moderato</div> <div><div>D</div>sostituisce adeguatamente i corticosteroidi anche nelle forme asmatiche gravi</div> <div><div>E</div>agisce sui recettori dell'istamina</div>	Risposta esatta C
N°	1286	Domanda	L'acido okadacico, potenziale inquinante di molluschi, induce:
		<div><div>A</div>paralisi</div> <div><div>B</div>epatotossicità</div> <div><div>C</div>convulsioni</div> <div><div>D</div>tossicità gastrointestinale</div> <div><div>E</div>nefrotossicità</div>	Risposta esatta D
N°	1287	Domanda	Quale tra i farmaci elencati oltre a sopprimere l'immunità cellulare, inibisce la sintesi delle prostaglandine e dei leucotrieni?
		<div><div>A</div>Ciclofosfamide</div> <div><div>B</div>Ciclosporina</div> <div><div>C</div>Infliximab</div> <div><div>D</div>Mercaptopurina</div> <div><div>E</div>Prednisone</div>	Risposta esatta E
N°	1288	Domanda	Le soluzioni isotoniche hanno la stessa pressione osmotica. Quale delle soluzioni sotto riportate ha la pressione osmotica più alta se le concentrazioni indicate sono espresse in molalità
		<div><div>A</div>pilocarpina cloridrato 0,05</div> <div><div>B</div>pilocarpina solfato 0,05</div> <div><div>C</div>cloruro di sodio 0,08</div> <div><div>D</div>saccarosio 0,2</div> <div><div>E</div>glucosio 0,1</div>	Risposta esatta D




N°	1289	Domanda	Per l'autorizzazione di stupefacenti per uso professionale urgente, secondo le previsioni del DPR n. 309/1990 il medico può	<div><div><div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div><div><div>più di una indicazione è corretta</div></div><div><div>B</div></div><div><div>involversi direttamente al produttore o al grossista</div></div><div><div>C</div></div><div><div>utilizzare il ricettario in triplice copia autocopiante per gli stupefacenti dell'Allegato III-bis del D.P.R. n. 309/1990</div></div><div><div>D</div></div><div><div>utilizzare anche il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale</div></div><div><div>E</div></div><div><div>deve richiedere i medicinali alla A.S.L. di competenza</div></div></div></div><div>Risposta esatta</div><div>C</div></div>
N°	1291	Domanda	Quale tra quelli elencati è un acido grasso omega-3?	<div><div><div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div><div><div>acido butirrico</div></div><div><div>B</div></div><div><div>acido linoleico</div></div><div><div>C</div></div><div><div>acido alfa-linolenico</div></div><div><div>D</div></div><div><div>acido tartarico</div></div><div><div>E</div></div><div><div>nessuno di quelli indicati</div></div></div></div><div>Risposta esatta</div><div>C</div></div>
N°	1292	Domanda	Qual è l'attività farmacologica che può essere ipotizzata per la cetirizina, di cui si riporta la struttura?	<div><div><div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div><div><div>Adrenergica - alfa1</div></div><div><div>B</div></div><div><div>Adrenergica - alfa2</div></div><div><div>C</div></div><div><div>Antistaminica - H1</div></div><div><div>D</div></div><div><div>Antistaminica - H2</div></div><div><div>E</div></div><div><div>Antispasmodica</div></div></div></div><div>Risposta esatta</div><div>C</div></div>




N°	1293	Domanda	Quale dei seguenti anestetici generali è gassoso a temperatura ambiente e a pressione atmosferica?	<div><div>A</div><div>etere etilico</div></div> <div><div>B</div><div>cloroformio</div></div> <div><div>C</div><div>alotano</div></div> <div><div>D</div><div>etilene</div></div> <div><div>E</div><div>nessuno, in quanto i composti indicati sono tutti liquidi</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1294	Domanda	La maggior parte delle reazioni metaboliche di fase I è operata da:	<div><div>A</div><div>enzimi microsomiali epatici (CYP450)</div></div> <div><div>B</div><div>perossidasi</div></div> <div><div>C</div><div>alcol deidrogenasi</div></div> <div><div>D</div><div>monoamminossidasi</div></div> <div><div>E</div><div>due delle indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	A



N°	1295	Domanda	L'idoxuridina è un antimetabolita analogo della timidina. Quale, tra quelle indicate, non rappresenta una proprietà del farmaco?	<div><div>A</div><div>struttura contenente un alogeno</div></div> <div><div>B</div><div>attività nei confronti di Virus a DNA</div></div> <div><div>C</div><div>uso principale nella cheratite erpetica</div></div> <div><div>D</div><div>uso topico in oftalmologia</div></div> <div><div>E</div><div>uso principale contro il virus influenzale</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1296	Domanda	Tra gli antibiotici elencati, qual è preferibile utilizzare in pazienti con insufficienza renale?	<div><div>A</div><div>doxiciclina</div></div> <div><div>B</div><div>tetraciclina</div></div> <div><div>C</div><div>minociclina</div></div> <div><div>D</div><div>clortetraciclina</div></div> <div><div>E</div><div>metaciclina</div></div>	Risposta esatta	A



N°	1297	Domanda	L'estrazione pressistica di un farmaco somministrato per os consiste in:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1299	Domanda	Un antagonista competitivo è qualunque	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1300	Domanda	La vendita di presidi medico-chirurgici non registrati costituisce un illecito	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	A




N°	1305	Domanda	Quale enzima, tra quelli sotto elencati, viene bloccato dal disulfiram, utilizzato per la disassuefazione degli etilisti.	<div><div>A</div>transpeptidasi</div> <div><div>B</div>alcol deidrogenasi</div> <div><div>C</div>acetilcolinesterasi</div> <div><div>D</div>triplofano 5-idrossilasi</div> <div><div>E</div>aldeide deidrogenasi mitocondriale</div>	Risposta esatta	E
N°	1307	Domanda	Il bilancio aziendale della farmacia è composto:	<div><div>A</div>di due parti essenziali</div> <div><div>B</div>dallo stato patrimoniale e dal conto economico</div> <div><div>C</div>dallo stato patrimoniale e dagli incassi dell'anno solare</div> <div><div>D</div>dal conto economico e dalle tasse pagate</div> <div><div>E</div>più di una risposta è corretta</div>	Risposta esatta	E
N°	1308	Domanda	Su quale dei punti elencati agisce l'eritromicina, avente la struttura indicata?	<div><div>A</div>sintesi proteica ribosomiale</div> <div><div>B</div>membrana citoplasmatica</div> <div><div>C</div>metabolismo energetico della cellula batterica</div> <div><div>D</div>acidi nucleici della cellula batterica</div> <div><div>E</div>parete cellulare batterica</div>	Risposta esatta	A



N°	1309	Domanda	Il vaccino anti epatite B contiene come componente immunogeno:		
		<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>			

N°	1313	Domanda	Il principio attivo avente la struttura chinolonica indicata viene usato come		Risposta esatta	A
----	------	---------	---	--	-----------------	---



☐ A

antibatterico

☐ B

anestetico generale

☐ C

antipidinetico

☐ D

antinfiammatorio

☐ E

anticoncezionale

N°	1314	Domanda	Indicare quale dei seguenti farmaci antipsicotici ha la più lunga emivita		Risposta esatta	E
----	------	---------	---	--	-----------------	---

☐ A

 sulpiride

☐ B

 risperidone

☐ C

 aloperidolo

☐ D

 clozapina

☐ E

 pimozide

N°	1315	Domanda	Quale antibiotico, tra quelli indicati, presenta il più basso legame farmaco-proteina?		Risposta esatta	E
----	------	---------	--	--	-----------------	---

☐ A

 penicilline semisintetiche

☐ B

 tetracicline

☐ C

 cefalosporine di ultima generazione


☐ D

 macrolidi

☐ E

 aminoglicosidi

N°	1316	Domanda	Per quale motivo il rivestimento delle compresse costituito dal prodotto avente la struttura polimetacrilica riportata e che prende il nome di Eudragit E 100 si solubilizza facilmente a livello gastrico? In quanto l'eccezione		Risposta esatta	C
----	------	---------	---	--	-----------------	---



☐ A

 ha carattere acido

☐ B

 ha carattere anfifilico

☐ C

 ha carattere basico

☐ D



 in ambiente acido si saponifica immediatamente


☐ E


 ha carattere anionico



N°	1317	Domanda	I test di tossicità cronica servono per valutare:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div>l'effetto tossico cumulativo di una sostanza</div><div>la DL50 di una sostanza</div><div>l'effetto mutageno di una sostanza</div><div>la tossicità nell'uomo di una sostanza</div><div>l'effetto teratogeno di una sostanza</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1319	Domanda	L'ASL è:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div>un'azienda di diritto privato</div><div>un'azienda dotata di personalità giuridica pubblica</div><div>un ente pubblico economico</div><div>un ente pubblico non economico</div><div>un'azienda speciale</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1320	Domanda	I principali problemi di una formulazione biotecnologica risiedono in	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div>pirogenicità</div><div>presenza di impurezze di sintesi</div><div>insolubilità</div><div>degradabilità</div><div>colorazione</div></div>	Risposta esatta	D




N°	1321	Domanda	Quale dei seguenti farmaci NON attraversa la barriera ematoencefalica?	<input type="radio"/> A carbidopa <input type="radio"/> B metildopa <input type="radio"/> C clonidina <input type="radio"/> D propranololo <input type="radio"/> E più di uno tra quelli indicati	Risposta esatta	A
N°	1323	Domanda	Quale dei seguenti antibiotici è un potente induttore del CYP450?	<input type="radio"/> A Ciprofloxacina <input type="radio"/> B Penicillina <input type="radio"/> C Eritromicina <input type="radio"/> D Tetraciclina <input type="radio"/> E Rifampicina	Risposta esatta	E
N°	1324	Domanda	Qual è l'attività farmacologica più rilevante che può essere ipotizzata per la dofenamina, averte la struttura indicata?	 <input type="radio"/> A adrenergica - alfa1 <input type="radio"/> B adrenergica - alfa2 <input type="radio"/> C antistaminica - H1 <input type="radio"/> D antistaminica - H2 <input type="radio"/> E antimuscarinica	Risposta esatta	C

N°	1325	Domanda	L'imipenem viene spesso utilizzato unitamente ad un secondo farmaco, la cistatina, avente la struttura indicata, allo scopo di
			
			<div><div>A</div>impedire l'ossidazione rapida</div> <div><div>B</div>impedire il metabolismo a livello renale</div> <div><div>C</div>ridurre la tossicità renale</div> <div><div>D</div>impedire la degradazione rapida da parte delle beta-lattamasi</div> <div><div>E</div>aumentare la concentrazione ematica</div>
			Risposta esatta B
N°	1326	Domanda	Quali delle seguenti attività è propria dello psillio (semi di <i>Plantago indica</i> L.)?
			<div><div>A</div>lassativa</div> <div><div>B</div>emetica</div> <div><div>C</div>emostatica</div> <div><div>D</div>diuretica</div> <div><div>E</div>antiaggregante</div>
			Risposta esatta A
N°	1327	Domanda	Nella F.U., la solubilità è definita come il volume approssimativo di solvente (ml) in cui si scioglie un g di sostanza. Qual è l'intervallo di parti di solvente entro il quale una sostanza può definirsi "molto solubile"?
			<div><div>A</div>meno di 1</div> <div><div>B</div>da 1 a 10</div> <div><div>C</div>da 10 a 30</div> <div><div>D</div>da 30 a 100</div> <div><div>E</div>da 100 a 1.000</div>
			Risposta esatta B
N°	1328	Domanda	L'ibuprofene può dare interazioni farmacologiche con:
			<div><div>A</div>acido acetilsalicylico</div> <div><div>B</div><i>ginkgo biloba</i> L.</div> <div><div>C</div>warfarin</div> <div><div>D</div>tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div> <div><div>E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>
			Risposta esatta E


N°	1329	Domanda	Tutte le seguenti sono caratteristiche delle reazioni avverse di tipo A tranne una, indicare quale:	N°	1331	Domanda	L'incorporazione meccanica di un principio attivo in una crema idrofila è possibile:
		<div><div><div>A</div></div><div>sono correlate alla dose di farmaco somministrata</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>solo se il principio attivo è liposolubile</div></div>	
		<div><div><div>B</div></div><div>sono generalmente collegate al meccanismo d'azione del farmaco</div></div>				<div><div><div>B</div></div><div>solo se il principio attivo è fotolabile</div></div>	
		<div><div><div>C</div></div><div>sono imprevedibili</div></div>				<div><div><div>C</div></div><div>sempre</div></div>	
		<div><div><div>D</div></div><div>hanno una bassa mortalità</div></div>				<div><div><div>D</div></div><div>solo se il principio attivo è termolabile</div></div>	
		<div><div><div>E</div></div><div>sono di solito scoperte prima della commercializzazione del farmaco</div></div>				<div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	
			Risposta esatta C				Risposta esatta E
N°	1330	Domanda	Il medico deve indicare la data di prescrizione sulla ricetta	N°	1332	Domanda	Secondo le Norme di Buona Preparazione in Farmacia le preparazioni obbligatoriamente sterili devono essere effettuate in ambienti classificati in conformità a:
		<div><div><div>A</div></div><div>mai, la deve indicare il paziente quando si reca in farmacia</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>l'Allegato I delle Norme di Buona Fabbricazione della Commissione Europea</div></div>	
		<div><div><div>B</div></div><div>sempre, ai fini della validità temporale delle ricette</div></div>				<div><div><div>B</div></div><div>le norme ISO</div></div>	
		<div><div><div>C</div></div><div>quando lo ritiene necessario</div></div>				<div><div><div>C</div></div><div>le norme CEI</div></div>	
		<div><div><div>D</div></div><div>solo nelle ricette da rinnovare volta per volta</div></div>				<div><div><div>D</div></div><div>le norme UNI EN</div></div>	
		<div><div><div>E</div></div><div>è irrilevante</div></div>				<div><div><div>E</div></div><div>le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità</div></div>	
			Risposta esatta B				Risposta esatta A




N°	1333	Domanda	Nei pazienti con funzionalità epatica compromessa la risposta ai farmaci può subire modificazioni per:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>alterazioni nel metabolismo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ipoalbuminemia e conseguenti alterazioni del legame dei farmaci alle proteine plasmatiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alterazioni dell'escrezione renale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1335	Domanda	Il SSN, nel rimborsare alle farmacie aperte al pubblico la distinta contabile repletiva (DOR) dei farmaci spediti in regime di assistenza pubblica, detatta lo 0,9% dell'importo. Tale cifra viene versata	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>all'Ente che gestisce il pagamento delle pensioni riservate ai farmacisti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>alla FOFI</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alla FEDERFARMA</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>all'ENPAF</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1336	Domanda	Qual è la ragione per cui il paratomo NON si somministra per os: <div><chem>CC1(C)C(=O)N(C1)C(=O)N</chem></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>viene degradato a livello gastrico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>non è sufficientemente idrofilo per sciogliersi nel succo gastrico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è sempre ionizzato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>precipita nel succo gastrico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>il suo peso molecolare non ne permette l'assorbimento</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1336	Domanda	In un medicinale è presente la difenilantoina, rappresentata dalla struttura indicata. Tale medicinale viene usato come	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antilepilettico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ipnotico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tranquillante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antidepressivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>muscolorilassante</div></div>	Risposta esatta	A



N°	1341	Domanda	La pubblicità dei prodotti cosmetici	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><div>non è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><div>è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><div>è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute solo se il cosmetico vanta attività terapeutiche</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><div>è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute solo se il cosmetico vanta anche attività diverse da quelle cosmetiche</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div><div><div>è soggetta a controllo preventivo dell'Istituto Superiore di Sanità</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		
				<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><div>20 - 25 mg</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><div>0,215 - 0,250 g</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><div>1 - 3 g</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><div>180 - 200 mg</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div><div><div>Nessuno degli intervalli forniti è corretto</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		Risposta esatta B
N°	1342	Domanda	Soltanto le sostanze elencate nella tabella n.3 della Farmacopea Ufficiale devono essere tenute dal farmacista in armadio chiuso a chiave?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><div>si</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><div>no</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><div>no, anche quelle elencate nella tabella n.1</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><div>no, anche quelle elencate nella tabella n.6</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div><div><div>la Tab. n.3 della Farmacopea Ufficiale non reca l'elenco delle sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		Risposta esatta B
N°	1343	Domanda	Si devono preparare 220 ml di una soluzione idroalcolica di eosina allo 0,1 %. Entro quale intervallo ricade la quantità di eosina da pesare?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><div>20 - 25 mg</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><div>0,215 - 0,250 g</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><div>1 - 3 g</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><div>180 - 200 mg</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div><div><div>Nessuno degli intervalli forniti è corretto</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		Risposta esatta B
N°	1344	Domanda	Nell'annotare il prezzo in etichetta apposta sul recipiente dei medicinali galenici magistrali allestiti in farmacia, il farmacista è tenuto a specificare l'importo analitico dei singoli onorari professionali?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><div>si, sempre</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><div>no, mai</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><div>no, è obbligato ad annotare solo il prezzo complessivo del medicinale</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><div>no, solo sull'etichetta apposta sull'involucro</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div><div><div>no, se il tariffario è esposto al pubblico</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		Risposta esatta B



N°	1345	Domanda	In farmacia è obbligatoria la detenzione del registro di entrata e uscita	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>più di una risposta è corretta</div><div>delle sostanze zuccherine</div><div>degli stupefacenti</div><div>dei mangini medicinali</div><div>dei veleni</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1347	Domanda	Nella struttura della bacampicillina il doppio estere è stato introdotto per	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>aumentare la lipofilia della molecola</div><div>facilitare l'idrolisi enzimatica</div><div>facilitare l'assorbimento</div><div>ridurre l'acidità</div><div>più di una delle indicazioni è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1346	Domanda	Quale, tra quelli sotto indicati, costituisce adempimento di legge per la farmacia che abbia smarrito il registro di entrata e uscita degli stupefacenti?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>inoltrare per iscritto la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e darne comunicazione alla Autorità Sanitaria Locale</div><div>ottemperare, entro 24 ore, a tutti gli adempimenti indicati</div><div>inoltrare denuncia alla più vicina Autorità di Pubblica Sicurezza</div><div>inoltrare denuncia al N.A.S.</div><div>ottemperare entro due giorni a tutti gli adempimenti indicati</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1348	Domanda	In quale caso è consentita la prescrizione ad animali da azienda di sostanze ad azione tireostatica?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>in nessun caso</div><div>in tutti i casi</div><div>esclusivamente per gli animali delle aziende sperimentali</div><div>quando è stata presentata ricetta medico-veterinaria in triplice copia</div><div>nei casi in cui il veterinario ha assunto previamente responsabilità</div></div></div>	Risposta esatta	A



N°	1349	Domanda Quali medicinali iniettabili possono essere consegnati dal farmacista senza presentazione di ricetta medica per prosecuzione della terapia in caso di dimissioni ospedaliere, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa per la consegna di medicinali in caso di necessità e urgenza?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>tutti gli antibiotici monodose</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>solo l'insulina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tutti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>i farmaci per patologie cardiovascolari</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>gli antidolorifici</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1351	Domanda Quale delle seguenti funzioni azotate deve essere presente in un farmaco antinuscaltico perché, dopo assunzione orale, svolga esclusivamente a livello intestinale l'azione farmacologica spasmolitico-neurotrofa?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>la funzione amminica primaria (1)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>quella indicata con la struttura (3)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>più di una tra quelle indicate</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>quella indicata con la struttura (2)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna di quelle indicate</div></div>	Risposta esatta	D

N°	1350	Domanda L'uso concomitante di uno dei seguenti farmaci richiede un'attenta rivalutazione del dosaggio di ciclosporina. Indicare il farmaco responsabile:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>acido acetilsalilico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>amoxicillina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>iperico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ibuprofene</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	C
----	------	---	--	-----------------	---


N°	1352	Domanda I farmaci Ca ²⁺ -antagonisti tipo nifedipina devono la loro azione principalmente al fatto che impediscono	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il legame del Ca²⁺ a specifiche proteine citosoliche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>l'ingresso del Ca²⁺ attraverso tutti i canali di membrana</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tutti gli effetti indicati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>l'ingresso del Ca²⁺ attraverso i canali di membrana voltaggio-dipendenti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>l'accumulo di Ca²⁺ nei siti di deposito intracellulari</div></div>	Risposta esatta	D
----	------	--	--	-----------------	---




N°	1353	Domanda	In che ambito territoriale può svolgere la sua attività l'informatore scientifico del farmaco?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>nell'ambito della A.S.L.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>su tutto il territorio nazionale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>nell'ambito della Provincia in cui è iscritto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nell'ambito della Regione in cui ha sede la ditta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nell'ambito del territorio indicato dall'apposita autorizzazione ministeriale</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1355	Domanda	La resistenza agli antibiotici chinolonici può insorgere per	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>mutazioni della trascrittasi inversa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>mutazioni nella struttura del ribosoma</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>mutazioni nella struttura del peptidoglicano</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>mutazioni nell'enzima girasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1356	Domanda	Il vigabatrin è utilizzato nella terapia antiepilettica. La sua struttura è quella del gamma-vinil-GABA, sotto riportata. Quale dei seguenti meccanismi di azione è ritenuto corretto per questo composto?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>aumento della frequenza di apertura dei canali del Cl⁻</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>blocco dei canali del Na⁺ voltaggio-dipendenti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>blocco dei canali del Ca²⁺ voltaggio-dipendenti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>aumento della durata di apertura dei canali del Cl⁻</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>inibizione irreversibile della GABA transaminasi</div></div>	Risposta esatta	E




N°	1357	Domanda	Una ricetta di un medicinale attribuito alla tabella n. 4 della F.U. e con la prescrizione di due confezioni del medesimo medicinale è valida:		N°	1359	Domanda	Quale dei seguenti farmaci può essere usato per ridurre la pressione intraoculare nel trattamento del glaucoma	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>per una sola dispensazione</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>fino a cinque confezioni in tre mesi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>per cinque dispensazioni di due confezioni in tre mesi</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>per un periodo di sei mesi</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>per un periodo fino ad un anno</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>pilocarpina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>timolo</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>acetazolamide</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>neostigmina</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>tutti</div>	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	E
N°	1358	Domanda	I mangimi rivolti a cani sofferenti di cardiopatie sono poveri di		N°	1360	Domanda	In quale caso ai normali anticonvulsivanti deve essere aggiunto ACTH	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>sodio e cloro</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>vitamine</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>zuccheri</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>fibre</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>proteine</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>nella terapia dello spasmo generalizzato infantile (sindrome di West)</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>nello stato epilepticus</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>nella terapia della schizofrenia</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>nell'anoressia nervosa</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nelle forme intrattabili di parkinsonismo</div>	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	A




N°	1361	Domanda La terapia cronica con analoghi del GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormon) si può associare a tutti i seguenti effetti eccetto:		N°	1363	Domanda In un diabetico sottoposto ad insulino terapia, la somministrazione di un beta-bloccante adrenergico può:	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>vampate di calore</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>trombosi venosa periferica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>secchezza e atrofia vaginale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>impotenza</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>osteoporosi</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>causare ipoglicemia</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>aumentare la pressione arteriosa</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>non avere alcun effetto indesiderato</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>causare iperglicemia</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>avere un effetto inotropo positivo</div>	
		Risposta esatta B				Risposta esatta A	
N°	1362	Domanda In quale degli intervalli indicati si colloca il pH di una soluzione 1x10 ⁻⁹ M di NaOH?		N°	1364	Domanda Le Norme di Buona Preparazione in Farmacia sono pubblicate:	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>7,0 - 7,5</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>6,5 - 7,0</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>8,5 - 9,0</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>9,0 - 9,2</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>più di uno</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>nella Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>negli Annali dell'Istituto Superiore di Sanità</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>nelle Linee Guida della FOI</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>nelle Note dell'Agenzia Italiana del Farmaco</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nelle Note del Ministero della Salute</div>	
		Risposta esatta A				Risposta esatta A	



N°	1365	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni relative al principio attivo granisetron è ERRATA?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>è un antiemetico indicato nella nausea da chemioterapia</div><div>è un antagonista dei recettori serotoninergici 5-HT3</div><div>è un agonista dei recettori dopaminergici D1</div><div>è usato per via orale</div><div>è usato per via inettiva</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1367	Domanda	Alcuni sali inorganici utilizzati in terapia nel passato hanno mantenuto un nome "storico" che risale all'epoca della loro preparazione. Qual è, tra quelli indicati, il nome del composto avente la struttura riportata?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div><chem>HgCl2</chem></div><div>Sublimato corrosivo</div><div>Calomelano</div><div>Sale amaro</div><div>Sale inglese</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1366	Domanda	La somministrazione di un FANS in associazione a clopidogrel può causare:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>ipertensione</div><div>ipotermia</div><div>aumento del rischio di episodi emorragici</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div><div>nessuna interazione</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1368	Domanda	In quale caso è obbligatorio inserire nel messaggio pubblicitario riguardante un medicinale la indicazione della denominazione comune del principio attivo?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>quando il medicinale non contiene più di un principio attivo</div><div>soltanto quando il principio attivo è un generico</div><div>in nessun caso</div><div>quando si voglia indicare il principio attivo che, tra gli altri, ha maggiore rilevanza</div><div>quando il medicinale non contiene eccipienti</div></div></div></div>	Risposta esatta	A



N°	1369	Domanda	La validità di un preparato con un contenuto alcolico superiore al 25% è sempre:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>il 25% dei più breve periodo di validità di tutti i componenti utilizzati e comunque non superiore a 6 mesi</div><div>6 mesi</div><div>1 anno</div><div>3 mesi</div><div>30 giorni</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1371	Domanda	I farmaci bloccanti la placca neuromuscolare sono indicati:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>negli spasmi della muscolatura liscia</div><div>nella miastenia gravis</div><div>nel blefarospasmo</div><div>per rilasciare la muscolatura striata in chirurgia</div><div>in tutte le situazioni descritte</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1370	Domanda	<div></div> <div>I messaggeri chimici si formano da sostanze che vengono immesse nell'organismo con la dieta. Da quale precursore deriva il composto avente la struttura indicata e che prende il nome di dopamina</div>	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>triptofano</div><div>tirosina</div><div>istidina</div><div>serina</div><div>colina</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1372	Domanda	L'inositol 1,4,5-trifosfato è:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>il prodotto di idrolisi dei polifosfoinositidi</div><div>un metabolita dell'acido arachidonico</div><div>il trasmettitore della placca neuromuscolare</div><div>un precursore della sintesi del PAF</div><div>un farmaco Ca2+-antagonista</div></div>	Risposta esatta	A

N°1373

Domanda

Il colesterolo, i cui livelli ematici sono diminuiti dalle statine, è:

A

un alcano/cicloalcano funzionalizzato

B

un derivato antracenico

C

un derivato naftalenico

D

un alcaloide

E

non appartenere a nessuna delle classi di composti indicati

Risposta esatta

A

N°1375

Domanda

Quale dei seguenti principi attivi può dar luogo a liberazione di istamina?

A

morfinina

B

salicilati

C

polimixina B

D

nessuno di quelli indicati

E

tutti quelli indicati

Risposta esatta

E

N°1374

Domanda

Le benzodiazepine agiscono:

A

aumentando la frequenza di apertura del canale ionico associato al recettore A del GABA

B

con meccanismi diversi da quelli indicati

C

antagonizzando i recettori A2 per l'adenosina

D

attivando i recettori GABA-B

E

inibendo irreversibilmente i recettori dopaminergici

Risposta esatta

A

N°1376

Domanda

Per le preparazioni galeniche in farmacia, sono disponibili capsule di gelatina dura individuabili con numeri che corrispondono alla loro capacità in volume. Dovendo preparare capsule contenenti ciascuna una polvere con densità apparente pari a 0,8 g/ml, quale, tra quelli elencati, è il tipo di capsula più opportuno?

N°	Vol (ml)
00	1,0
0	0,7
1	0,5
2	0,4
3	0,3
4	0,2
5	0,1

mg/caps

500

d (g/ml)

0,8

A

doppio zero

B

zero

C

due

D


tre

E


cinque

Risposta esatta


B



N°	1377	Domanda	Quale dei seguenti diuretici agisce con lo stesso meccanismo di azione della furosemide avente la struttura indicata?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>acelazolamide</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>piretanide</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>idrodiorotazide</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>aniloride</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>spironolattone</div>	Risposta esatta	B
----	------	---------	---	---	-----------------	---





N°	1378	Domanda	L'aniacidam, indicato in struttura, è	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>un farmaco antipsicotico a struttura tridolica</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>un antipertensivo ad azione centrale</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>uno stabilizzatore del tono dell'umore</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>un farmaco nootropo a struttura pirrolidonica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>un antipeptidizzante orale</div>	Risposta esatta	D
----	------	---------	---------------------------------------	---	-----------------	---



N°	1379	Domanda	Tra questi farmaci quale è un antinfluenzale?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>aciclovir</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>abacavir</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>tenofovir</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>oseltamivir</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>indinavir</div>	Risposta esatta	D
----	------	---------	---	--	-----------------	---


N°	1380	Domanda	Degli accoppiamenti sotto indicati, qual è quello corretto riguardante il composto avente la struttura indicata?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>paracetamolo - antinfiammatorio</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>diclofenac - antinfiammatorio</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>acido acetilsalicylico - antinfiammatorio</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>flurbiprofene - antinfiammatorio</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>ibuprofen - antinfiammatorio</div>	Risposta esatta	C
----	------	---------	--	---	-----------------	---







N°	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta
1381	Quale delle affermazioni sotto elencate e riguardanti le cefalosporine è corretta? Passando dalle cefalosporine di prima a quelle di terza generazione	1383	Quale tra i farmaci elencati è utilizzato per il trattamento delle infezioni oculari da Herpes simplex?	B
	<div><div><input type="checkbox"/> A</div> si ha un incremento dell'attività antimicrobica verso i batteri Gram-negativi</div>		<div><div><input type="checkbox"/> A</div> acido fusidico</div>	
	<div><div><input type="checkbox"/> B</div> si ha un incremento dell'attività su <i>Pseudomonas</i></div>		<div><div><input type="checkbox"/> B</div> idoxuridina</div>	
	<div><div><input type="checkbox"/> C</div> si ha un decremento del tempo di emivita</div>		<div><div><input type="checkbox"/> C</div> didanosina</div>	
	<div><div><input type="checkbox"/> D</div> più di una delle affermazioni riportate è corretta</div>		<div><div><input type="checkbox"/> D</div> gentamicina</div>	
	<div><div><input type="checkbox"/> E</div> nessuna delle affermazioni riportate è corretta</div>		<div><div><input type="checkbox"/> E</div> sulfadiazina sale di argento</div>	

N°	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta
1382	La cefixima, avente la struttura indicata, è prevalentemente attiva	1384	Tutti i farmaci elencati inducono resistenza con l'ECCEZIONE di:	D
	<div><div><input type="checkbox"/> A</div> sia sugli streptococchi che sugli stafilococchi</div>		<div><div><input type="checkbox"/> A</div> isoniazide</div>	
	<div><div><input type="checkbox"/> B</div> sui germi di tipo <i>Pseudomonas</i></div>		<div><div><input type="checkbox"/> B</div> adriamicina</div>	
	<div><div><input type="checkbox"/> C</div> per via orale</div>		<div><div><input type="checkbox"/> C</div> gentamicina</div>	
	<div><div><input type="checkbox"/> D</div> più di una delle affermazioni riportate è corretta</div>		<div><div><input type="checkbox"/> D</div> difenildantolna</div>	
	<div><div><input type="checkbox"/> E</div> nessuna delle affermazioni riportate è corretta</div>		<div><div><input type="checkbox"/> E</div> metotrexato</div>	




N°	1385	Domanda	Quale dei prodotti sotto elencati viene impiegato come adsorbente nella preparazione della forma farmaceutica compresse
		<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>gel di silice</div><div>dietilftalato</div><div>cloruro di sodio</div><div>benzalconio cloruro</div><div>calcio stearato</div></div>
		Risposta esatta	A
N°	1386	Domanda	Quale dei seguenti è un colinomico ad azione indiretta che penetra rapidamente nel SNC?
		<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>Belanecolo</div><div>Muscarina</div><div>Neostigmina</div><div>Nicotina</div><div>Fisostigmina</div></div>
		Risposta esatta	E
N°	1387	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sulla lidocaina, avente la struttura indicata, è corretta.
		<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><chem>CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C</chem></div>	<div><div>si utilizza principalmente come anestetico locale</div><div>è un agente antiaritmico</div><div>è poco solubile in acqua</div><div>si può solubilizzare come cloridrato</div><div>più di una delle indicazioni date risponde esattamente al quesito</div></div>
		Risposta esatta	E
N°	1388	Domanda	Il meccanismo d'azione del fopotecan prevede:
		<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>l'inibizione delle proteasi</div><div>l'inibizione delle girasi</div><div>l'inibizione della topoisomerasi</div><div>l'inibizioni delle lattamasi</div><div>nessuno di questi meccanismi</div></div>
		Risposta esatta	C

N°	1389	Domanda	In quale delle seguenti patologie può essere utilizzata la bromocriptina avente la struttura indicata?		N°	1391	Domanda	I diuretici tiazidici provocano	
		<div><div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div> morbo di Parkinson</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> miastenia gravis</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> distrofia muscolare</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> piccolo male epilettico</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> schizofrenia</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div> ipoglicemia</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> iperuricemia</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> ipocolesterolemia</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> ipercalcemia</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> iperkalemia</div>	Risposta esatta	A
N°	1390	Domanda	Il goserelin è indicato per:		N°	1392	Domanda	Quali requisiti deve avere il farmacista direttore di una farmacia gestita in forma societaria?	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div> la terapia del carcinoma mammario in donne con età superiore a 50 anni</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> la terapia del carcinoma mammario in donne in pre- e perimenopausa</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> la prevenzione e terapia del carcinoma mammario in donne con età superiore a 50 anni</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> la prevenzione del carcinoma mammario in donne con età inferiore a 50 anni</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> la prevenzione del carcinoma mammario in donne con qualsiasi età</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div> deve essere iscritto all'Ordine dei farmacisti, essere in possesso del requisito di idoneità e, se si tratta di una farmacia privata, deve essere uno dei soci</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> e' sufficiente che sia abilitato e iscritto all'Ordine dei farmacisti</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> deve essere abilitato, iscritto all'Ordine dei farmacisti e, se si tratta di una farmacia comunale, deve aver superato l'esame di idoneità nazionale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> deve essere iscritto all'Ordine dei farmacisti da almeno dieci anni</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> deve aver superato l'esame di idoneità nazionale</div>	Risposta esatta	B	




N°	1393	Domanda	Quale delle seguenti categorie di capsule non è iscritta nella F.U.?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>capsule gastroresistenti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>capsule molli</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>capsule a rilascio modificato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nessuna categoria è iscritta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le categorie sono iscritte</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1395	Domanda	Il Metadone ha la formula sotto indicata. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>e' obbligatorio averlo in farmacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si può spedire con ricetta ripetibile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>e' un derivato fenipiperidinico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>e' ottenuto dalla modifica della morfina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	E

N°	1396	Domanda	Il farmacista che abbia compilato il sessantesimo anno di età può partecipare al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>sì, sempre</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sì, purchè non abbia trasferita la propria farmacia nei dieci anni precedenti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sì, purchè svolga attività professionale in farmacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sì, purchè abbia conseguito l'idoneità in un precedente concorso</div></div>	Risposta esatta	B
----	------	---------	--	--	-----------------	---







N°	1397	Domanda	In quale situazione il farmacista può rifiutare la spedizione di una ricetta medica? Quando	N°	1399	Domanda	Per l'uso di medicinali off label si intende
		<div><div><div>A</div></div><div>lo ritiene opportuno in base a sue valutazioni dello stato di salute del paziente</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>l'impiego di medicinali per un'indicazione o una via di somministrazione diversa da quelle autorizzate</div></div>	
		<div><div><div>B</div></div><div>rileva incongruenze formali e/o sostanziali nella prescrizione</div></div>				<div><div><div>B</div></div><div>l'impiego di medicinali registrati all'estero ma non in Italia</div></div>	
		<div><div><div>C</div></div><div>nella ricetta manca il numero di iscrizione del prescrittore all'Albo dei Medici</div></div>				<div><div><div>C</div></div><div>l'impiego di medicinali per una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quelle autorizzate</div></div>	
		<div><div><div>D</div></div><div>i parenti del paziente hanno chiesto la non spedizione</div></div>				<div><div><div>D</div></div><div>più di una indicazione è corretta</div></div>	
		<div><div><div>E</div></div><div>il paziente non è cliente abituale della farmacia</div></div>				<div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	
			Risposta esatta B				Risposta esatta D


N°	1398	Domanda	Le antraciline sono farmaci:	N°	1400	Domanda	Qual è la durata di validità della ricetta ripetibile che prescrive medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di medici specialisti?
		<div><div><div>A</div></div><div>antibatterici</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>dieci giorni, compreso quello di rilascio</div></div>	
		<div><div><div>B</div></div><div>antimetabolici</div></div>				<div><div><div>B</div></div><div>dieci giorni, escluso quello di rilascio</div></div>	
		<div><div><div>C</div></div><div>antilemetici</div></div>				<div><div><div>C</div></div><div>sempre tre mesi</div></div>	
		<div><div><div>D</div></div><div>antipertensivi</div></div>				<div><div><div>D</div></div><div>sempre centoventi giorni</div></div>	
		<div><div><div>E</div></div><div>antineoplastici</div></div>				<div><div><div>E</div></div><div>la stessa prevista per tutte le altre ricette ripetibili</div></div>	
			Risposta esatta E				Risposta esatta E



N°	1401	Domanda	Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro commercializzati in Italia, le indicazioni fornite dal fabbricante in etichetta e sul foglietto di istruzioni:		N°	1403	Domanda	Per rimuovere il blocco da tubocurarina si può usare	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>devono essere espresse in lingua inglese</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>neostigmina</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>devono essere espresse in lingua italiana</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>adrenalina</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>devono essere espresse sia in italiano che in inglese</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>atropina</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>devono essere espresse in tutte le lingue degli Stati dell'Unione Europea</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>beta-bloccanti</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>devono essere espresse nella lingua del Paese in cui ha sede il fabbricante</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>pancuronio</div>	
				Risposta esatta B					Risposta esatta A
N°	1402	Domanda	Cosa identifica il numero accanto al marchio CE in un dispositivo medico?		N°	1404	Domanda	La zona chemiorecettrice, bersaglio di molti farmaci emetici, è situata:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>l'Organismo Notificato che ha rilasciato il marchio CE</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>nel pavimento del IV ventricolo</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>l'Autorità Competente presso cui il fabbricante si registra</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>nei ventricoli laterali</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>la data di scadenza del dispositivo</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>nell'acquedotto di Silvio</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>la normativa a cui fa riferimento</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>nel III ventricolo</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>nell'ipotalamo</div>	
				Risposta esatta A					Risposta esatta A




N°	1405	<p>Domanda Quale, tra i seguenti enzimi, NON partecipa alla formazione dei neurotrasmettitori serotonergici nell'organismo?</p>	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div> O-acetiltransferasi</div><div> aromatico L-amminoacidi decarbossilasi</div><div> dopamina beta-drossilasi</div><div> triptofan 5-idrossilasi</div><div> più di uno di quelli indicati</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1407	<p>Domanda Le due curve dose-effetto indicate in figura con le lettere A e B si riferiscono ad un farmaco:</p>	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div> da solo (A) e in presenza di un suo antagonista non competitivo (B)</div><div> da solo (A) e in presenza di un suo agonista non competitivo (B)</div><div> da solo (B) e in presenza di un suo agonista non competitivo (B)</div><div> da solo (B) e in presenza di un suo antagonista competitivo (A)</div><div> nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div><div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1408	<p>Domanda Quale è l'attività farmacologica più rilevante che può essere ipotizzata per la struttura parziale indicata riconducibile ad una succinimide</p>	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div> anestetica locale</div><div> neuroletica</div><div> antidepressiva</div><div> anticonvulsivante</div><div> antimuscarinica</div></div></div><div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1406	<p>Domanda L'aldosterone, avente la struttura indicata, ha un'azione prevalentemente</p>	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div> mineralcorticoide</div><div> glucocorticoide</div><div> androgena</div><div> progestinica</div><div> estrogena</div></div></div><div></div></div>	Risposta esatta	A





N°	1409	Domanda Quale dei seguenti farmaci si comporta come inibitore periferico della L-amminoacido aromatico decarbossilasi:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>piracetam</div><div>meprobamato</div><div>benserazide</div><div>felexenadina</div><div>esomeprazolo</div></div>
----	------	---	--

Risposta esatta C




N°	1413	Domanda	Quali possono essere prodotti naturali ad azione antiparassitaria in campo veterinario?	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>organofosforici</div></div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>piretrine</div></div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>DDT</div></div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>fitoterapici derivati dallo <i>Plantago Psyllium</i> L.</div></div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>fitoterapici derivati dal <i>Citrus aurantium</i> sbs <i>amara</i></div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1415	Domanda	L'adrenalina che ha la struttura riportata, è conosciuta anche come	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>epinefrina</div></div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>norepinefrina</div></div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>efedrina</div></div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>pseudoefedrina</div></div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>amfetamina</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1414	Domanda	Il processo di diffusione passiva di un farmaco attraverso una membrana che separa due compartimenti avviene	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>per azione di un ATPasi di membrana</div></div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>attraverso i pori della membrana</div></div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>sotto l'azione di un gradiente di concentrazione</div></div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>contro un gradiente di concentrazione</div></div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>per catalisi enzimatica</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1416	Domanda	Tra i farmaci riportati quale è più indicato nella terapia della sindrome ossessivo-compulsiva?	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>clonidina</div></div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>clonipramina</div></div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>donepazil</div></div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>diazepam</div></div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>idroxyzina</div></div></div></div>	Risposta esatta	B



N°	1417	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce l'ampicillina, avente la struttura indicata?		N°	1419	Domanda	Cos'è la sorveglianza del mercato dei dispositivi medici?	
				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>acidi nucleici della cellula batterica</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>parete cellulare batterica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>metabolismo energetico della cellula batterica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>sintesi proteica ribosomiale</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>membrana citoplasmatica</div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>attività svolta dal Ministero della Salute per verificare l'operato dei fabbricanti di dispositivi medici</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>attività svolta dal Ministero della Salute e dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di verificare l'operato dei fabbricanti dei dispositivi medici</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>attività svolta dal Ministero della Salute per individuare quanti dispositivi medici sono presenti sul mercato</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>attività di inserimento dati su dispositivi medici svolta da personale di un'Amministrazione pubblica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>la valutazione degli incidenti che si verificano con un determinato dispositivo</div>	Risposta esatta	B

N°	1418	Domanda	Quale delle seguenti azioni si ritiene possa contribuire all'effetto antipertensivo dei farmaci beta-antagonisti:		N°	1420	Domanda	L'utilizzazione terapeutica di numerosi principi attivi è correlata alla loro capacità di bloccare particolari sistemi enzimatici. Quale, tra le coppie farmaco - enzima sotto elencate, rappresenta l'enzima ed il corrispondente inibitore?		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>diminuzione dell'attività cardiaca</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>diminuito rilascio di renina</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>diminuito rilascio di aldosterone</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>diminuita liberazione presinaptica di noradrenalina</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>		Risposta esatta	E			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>carbidopa - alcool deidrogenasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>disulfiram - aldeide deidrogenasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>selegilina -MAO-A</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>malathion - idrossimetil glutamyl-CoA-reduttasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>più di una tra quelle indicate</div>	Risposta esatta	B




N°	1421	Domanda	Un farmaco che si lega per più del 90% alle proteine plasmatiche e che si distribuisce uniformemente nei liquidi organici avrà un volume apparente di distribuzione:		N°	1423	Domanda	Quale delle seguenti caratteristiche di un farmaco IMPEDISCE la sua penetrazione nel sistema nervoso centrale:	
		<input type="checkbox"/> A	elevato				<input type="checkbox"/> A	una idrofilia troppo bassa	
		<input type="checkbox"/> B	ridotto				<input type="checkbox"/> B	una lipofilia troppo elevata	
		<input type="checkbox"/> C	indipendente dalla % di farmaco legato				<input type="checkbox"/> C	la presenza di una carica permanente	
		<input type="checkbox"/> D	pari al volume dell'acqua corporea totale				<input type="checkbox"/> D	la scarsa tendenza a dare legami idrogeno	
		<input type="checkbox"/> E	tutte le indicazioni non sono corrette				<input type="checkbox"/> E	più di una delle caratteristiche indicate	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	C


N°	1422	Domanda	Quale delle seguenti modalità di prelievo ematico è corretta ai fini del monitoraggio terapeutico dei farmaci?		N°	1424	Domanda	Il biperidene ed il triresfenidile sono farmaci	
		<input type="checkbox"/> A	dopo un periodo di tempo corrispondente a circa 4-5 emivite del farmaco				<input type="checkbox"/> A	ipocolesferolemizzanti	
		<input type="checkbox"/> B	dopo un'ora dalla somministrazione				<input type="checkbox"/> B	antiaritmici della classe Ic	
		<input type="checkbox"/> C	dopo il pasto				<input type="checkbox"/> C	sedativo-ipnotici	
		<input type="checkbox"/> D	sempre, in ogni momento				<input type="checkbox"/> D	anticolinergici impiegati nella terapia del parkinsonismo	
		<input type="checkbox"/> E	tutte le indicazioni sono corrette				<input type="checkbox"/> E	antipertensivi ad azione centrale	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	D



N°	1425	Domanda	Quale delle seguenti benzodiazepine è dotata della più lunga emivita:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>alprazolam</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>lorazepam</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>oxazepam</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>flurazepam</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>triazolam</div>		
				Risposta esatta	D

N°	1427	Domanda	Gli operatori sanitari che non comunicano un incidente con dispositivo medico al Ministero della Salute:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>non hanno alcuna responsabilità</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>sono soggetti a sanzioni penali</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>sono soggetti a sanzioni amministrative</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>sono soggetti a sanzioni penali e amministrative</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>sono soggetti ad arresto</div>		
				Risposta esatta	D

N°	1426	Domanda	La yohimbina ha la struttura indicata. Essa è un antagonista della noradrenalina sui		
					
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>recettori D1</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>recettori beta2</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>recettori alfa2</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>recettori 5-HT1</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>recettori nicotinici</div>		
				Risposta esatta	C


N°	1428	Domanda	I tiazolidindioni (gliazoni) agiscono in modo favorevole nel controllo dell'omeostasi glucidica:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>attivando il recettore PPAR-gamma (peroxisome proliferator-activated receptor)</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>inibendo il recettore insulinico nel fegato</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>riducendo l'assorbimento intestinale di glucosio</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>aumentando la secrezione insulinica dalle cellule beta pancreatiche</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>stimolando la gluconeogenesi epatica</div>		
				Risposta esatta	A




N°	1429	Domanda	Alcuni principi attivi contenuti nella cannabis sativa (cannapa indiana) sono stati inseriti		N°	1431	Domanda	L'effetto di quale dei seguenti farmaci può essere ridotto in caso di somministrazione contemporanea di preparati iperico (<i>Hypericum perforatum</i> L.)?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>nella Tab. II Sez. B del DPR n. 309/1990</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>nella Tab. II Sez. A del D.P.R. n. 309/1990</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>Nella Tab. I del D.P.R. n. 309/1990</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>non sono più assoggettati alla disciplina del D.P.R. n. 309/1990</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>Ciclosporina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>Indinavir</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>Simvastatina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>Tacrolimus</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>Tutte le indicazioni sono corrette</div>	Risposta esatta	A
N°	1430	Domanda	Il sucralato ha la struttura sotto indicata ed è contenuto in alcuni medicinali utilizzati come antiulcera. Quale delle affermazioni sotto riportate è corretta? Il farmaco		N°	1432	Domanda	Il lisinopril viene spesso associato a	
		 R = SO ₂ Al(OH) ₂	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>riduce la concentrazione di acido cloridrico nello stomaco</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>agisce combinandosi con le proteine del sito ulcerato</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>inibisce la pompa protonica gastrica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>più di una delle indicazioni fornite è corretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>presenta controindicazioni per la basicità posseduta dal composto privo dell'alluminio</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>un farmaco antiulcera</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>un sedativo centrale</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>un anticolinergico</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>un diuretico</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>un farmaco vasocostrittore</div>	Risposta esatta	B


N°	1433	Domanda	E' ammissibile un contratto di associazione in partecipazione tra il titolare di farmacia ed un terzo?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>si, sempre</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>no</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>si, purchè il terzo sia un familiare del titolare</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>si, purchè il terzo conferisca solo capitale</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>si, purchè il terzo sia un farmacista</div>	Risposta esatta	A
N°	1434	Domanda	I test di gravidanza per uso domiciliare, venduti in farmacia, sono classificabili come	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>specialità medicinali da banco (OTC)</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>specialità medicinali SOP</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>articoli sanitari soggetti ad autorizzazione del Ministero della Salute</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>diagnostici in vitro (IDV)</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>presidi medico-chirurgici vendibili soltanto previa autorizzazione del Ministero della Salute</div>	Risposta esatta	D

N°	1435	Domanda	Per quale delle categorie di farmaci sottorportati sono state evidenziate interazioni farmacocinetiche con la diglossina?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antinfiammatori</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>antidepressivi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>bloccanti dei canali del calcio</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>cortisonici</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuna delle categorie riportate</div>	Risposta esatta	C
N°	1436	Domanda	La levodopa, avente la struttura indicata, attraversa la barriera ematoencefalica in quanto	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>è polare</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>è lipofila</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>è altamente legata alle proteine plasmatiche</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>ha un meccanismo di trasporto attivo</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>è amfifila</div>	Risposta esatta	D






N°	1437	Domanda	Gli analoghi del GnRH (Gonadotroph-Releasing Hormon) sono decapeptidi nei quali la modifica di alcuni aminoacidi causa in genere:		N°	1439	Domanda	Quale delle seguenti polveri è più idrofila?	
		<input type="checkbox"/> A	aumento dell'attività farmacologica per migliore biodisponibilità				<input type="checkbox"/> A	Stearato di zinco	
		<input type="checkbox"/> B	aumento dell'attività farmacologica per inibizione del legame alle proteine plasmatiche				<input type="checkbox"/> B	Stearato di alluminio	
		<input type="checkbox"/> C	aumento dell'emivita e dell'attività per riduzione della degradazione e facilitazione del legame recettoriale				<input type="checkbox"/> C	Silicato di zinco e magnesio	
		<input type="checkbox"/> D	riduzione dell'emivita rispetto al GnRH naturale, ma minori effetti collaterali				<input type="checkbox"/> D	Stearato di magnesio	
		<input type="checkbox"/> E	attività farmacologica paragonabile al GnRH naturale, ma minori effetti collaterali				<input type="checkbox"/> E	Carbone vegetale polvere	
			Risposta esatta	C				Risposta esatta	C
N°	1438	Domanda	Quale delle affermazioni che riguardano i principi attivi calcio folinato e levofolinato è ERRATA?		N°	1440	Domanda	L'energia di legame di van der Waals ha un valore medio espresso in KJ mol ⁻¹ compreso tra	
		<input type="checkbox"/> A	sono utilizzati per trattamenti citostatici				<input type="checkbox"/> A	2,1 e 4,2	
		<input type="checkbox"/> B	contengono nella loro struttura un numero definito di residui di acido glutammico				<input type="checkbox"/> B	7,5 e 8,4	
		<input type="checkbox"/> C	hanno un contenuto % di calcio che è diverso nei due principi attivi				<input type="checkbox"/> C	9,2 e 10,5	
		<input type="checkbox"/> D	non vengono usati per sofferie alla carenza di vitamina B ₁₂				<input type="checkbox"/> D	11 e 12	
		<input type="checkbox"/> E	tutte le indicazioni date eccetto una sono corrette				<input type="checkbox"/> E	18,4 e 20,6	
			Risposta esatta	C				Risposta esatta	A






N°	1441	Domanda	Quale dei seguenti farmaci induce sia miotriasi che cicloplegia per applicazione topica oculare?	<div><div><input type="radio"/> A</div>fenilefrina</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>carbocolo</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>atropina</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>prazosina</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>fisostigmina</div>	Risposta esatta	C
N°	1443	Domanda	La ricetta che prescrive medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri è riutilizzabile	<div><div><input type="radio"/> A</div>si, sempre</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>no, mai</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>si, se reca l'espressa indicazione di ripetibilità</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>si, se reca una prescrizione per cura di durata superiore a tre mesi</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>si, se si tratta di medicinali assegnati a ricetta medica ripetibile</div>	Risposta esatta	E
N°	1444	Domanda	I triptani, tra i quali il sumatriptan riportato in struttura, hanno una struttura molecolare riconducibile a quella della:	<div><div><input type="radio"/> A</div>serotonina</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>nor-adrenalina</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>acetilcolina</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>istamina</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>dopamina</div>	Risposta esatta	A



N°	Domanda	Risposta esatta	A
1445	Domanda La piridostigmina, struttura indicata, è usata nella terapia di:	Risposta esatta	B
1447	Domanda Quale delle seguenti è la definizione di reazione grave?	Risposta esatta	E
1448	Domanda Come agisce la fisostigmina avente la struttura riportata?	Risposta esatta	B



N°	Domanda	Risposta esatta	A
1445	Domanda La piridostigmina, struttura indicata, è usata nella terapia di:	Risposta esatta	B
1447	Domanda Quale delle seguenti è la definizione di reazione grave?	Risposta esatta	E
1448	Domanda Come agisce la fisostigmina avente la struttura riportata?	Risposta esatta	B




N°	1449	Domanda	Tra questi farmaci quale è un anticorpo monoclonale?	<div><div><div>A</div></div><div>doxorubicina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>cis-platino</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>ciclofosfamide</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>trastuzumab</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>tamoxifene</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1450	Domanda	Quale dei seguenti recettori e' accoppiato positivamente all'attivita' adenilato ciclasica? Il recettore	<div><div><div>A</div></div><div>H2 per l'istamina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>5-HT3 per la serotonina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>D2 per la dopamina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>muscarinico per l'acetilcolina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>AMPA per gli amminocidi eccitatori</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1451	Domanda	Un principio attivo che presenti polimorfismo può avere una diversa biodisponibilità farmaceutica?	<div><div><div>A</div></div><div>no, mai</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>piu' di una indicazione è corretta</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>si se' in soluzione sterile</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>si se' in fiale per uso orale</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>si se' la forma farmaceutica è una sospensione</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1452	Domanda	Per i cosmetici commercializzati in Italia, le indicazioni fornite dal fabbricante in etichetta e sul foglietto di istruzioni:	<div><div><div>A</div></div><div>devono essere espresse in lingua inglese</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>devono essere espresse in lingua italiana</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>devono essere espresse in tutte le lingue degli Stati dell'Unione Europea</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>devono essere espresse nella lingua del Paese in cui ha sede il fabbricante</div></div>	Risposta esatta	B


N°	1453	Domanda	Quale proprietà, tra quelle sotto riportate, è sicuramente identica per le sostanze polimorfe	<div><div>A</div> durezza</div> <div><div>B</div> formula bruta</div> <div><div>C</div> punto di fusione</div> <div><div>D</div> forma cristallina</div> <div><div>E</div> stabilità agli agenti atmosferici</div>	Risposta esatta	B
N°	1455	Domanda	Tra i sottoelencati registri e libri, NON è obbligatorio tenere in farmacia:	<div><div>A</div> il bollettario buono acquisti</div> <div><div>B</div> registro copia ricette</div> <div><div>C</div> la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali</div> <div><div>D</div> il registro dei verbali di ispezione</div> <div><div>E</div> la farmacopea ufficiale, edizione vigente</div>	Risposta esatta	B



N°	1454	Domanda	In quale classe di farmaci può essere collocato il principio attivo avente la struttura riportata	<div><div>A</div> contraccettivi sistemici ormonali</div> <div><div>B</div> cefalosporine</div> <div><div>C</div> penicilline</div> <div><div>D</div> chinolonici</div> <div><div>E</div> antagonisti beta-adrenergici</div>	Risposta esatta	D
N°	1456	Domanda	Le furocumarine sono contenute in diverse specie botaniche tra cui gli agrumi (<i>Citrus</i> spp.). Quale delle seguenti reazioni avverse possono indurre?	<div><div>A</div> gastroenterite</div> <div><div>B</div> epatite</div> <div><div>C</div> fototossicità</div> <div><div>D</div> danno renale</div> <div><div>E</div> nessuna delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta	C



N°	1457	Domanda	La gelificazione di una crema idrofila può essere affidata a:	<div><div><div>A</div></div><div>alcol cetostearilico</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>cera d'api</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>trietanolamina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>metile p-idrossibenzoato</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>glicerolo</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1459	Domanda	Gli anticorpi ad uso terapeutico si possono umanizzare?	<div><div><div>A</div></div><div>no</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>non ne vale la pena</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>sì</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>raramente</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>solo in casi particolari</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1460	Domanda	Un farmaco avente caratteristiche di elettrolita debole, se somministrato per os, è tanto più assorbito dall'organismo quanto più	<div><div><div>A</div></div><div>è ionizzato</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>è non ionizzato</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>sono polari le specie ionizzate che da esso si originano</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>sono idrofile le specie ionizzate che da esso si originano</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>il farmaco è sensibile all'ambiente acido</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1458	Domanda	Tutte le preparazioni iniettabili si devono spedire in farmacia dietro presentazione di ricetta medica. Le preparazioni contenenti particolari principi attivi o aventi utilizzazione specifiche fanno ECCEZIONE a tale regola. Quale, tra quelle sotto indicate, costituisce l'ECCEZIONE?	<div><div><div>A</div></div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Fenobarbita (antiepilettico)</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Naloxone (antagonista della morfina)</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Flumazenil (antagonista delle benzodiazepine)</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>più di una</div></div>	Risposta esatta	C




N°	1461	Domanda	Tenendo presente l'azione farmacologica e quindi la principale utilizzazione terapeutica, indicare, tra quelli sotto riportati, i presidi sanitari nei quali la FU obbliga la presenza di fenobarbitali, di cui si riporta la struttura
			
			<div><div>A</div>farmacia ospedaliera</div> <div><div>B</div>farmacia urbana</div> <div><div>C</div>farmacia rurale</div> <div><div>D</div>in nessuno dei presidi riportati</div> <div><div>E</div>in tutti i presidi riportati</div>
			Risposta esatta E
N°	1462	Domanda	L'emivita di eliminazione di un farmaco dipende da:
			<div><div>A</div>volume apparente di distribuzione</div> <div><div>B</div>costante di velocità di eliminazione</div> <div><div>C</div>clearance sistemica</div> <div><div>D</div>le tre indicazioni date sono corrette</div> <div><div>E</div>le tre indicazioni date non sono corrette</div>
			Risposta esatta D
N°	1463	Domanda	Il corretto flusso delle comunicazioni prevede che i fabbricanti di dispositivi medici ricevano le segnalazioni di incidenti:
			<div><div>A</div>dai Ministero della Salute</div> <div><div>B</div>dall'operatore sanitario</div> <div><div>C</div>dai propri rappresentanti commerciali presso gli Ospedali</div> <div><div>D</div>dai distributore</div> <div><div>E</div>da uno qualsiasi dei soggetti indicati</div>
			Risposta esatta B
N°	1464	Domanda	Quale dei seguenti antibiotici aminoglicosidici è utilizzato esclusivamente per via topica?
			<div><div>A</div>Tobramicina</div> <div><div>B</div>Gentamicina</div> <div><div>C</div>Neomicina</div> <div><div>D</div>Amikacina</div> <div><div>E</div>nessuno di quelli indicati</div>
			Risposta esatta E




N°	1465	Domanda	La vendita all'utilizzatore finale di medicinali omeopatici veterinari è riservata alle farmacie?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no, è consentita anche ai grossisti autorizzati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no, è consentita anche ai fabbricanti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>no, è consentita anche a fabbricanti e grossisti senza alcuna autorizzazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>non esistono i medicinali omeopatici veterinari</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1467	Domanda	Quale delle seguenti beta-lattamine NON è resistente alle beta-lattamasi?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>sulbactam</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>oxacillina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ac. clavulamico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>amoxicillina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tazobactam</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1468	Domanda	Quali società possono assumere la titolarità di una farmacia?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>solo le società di persone</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>soci le società di persone e le società cooperative</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>qualunque società, purché composta da soci farmacisti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>le società di persone, le società cooperative e, nel caso delle farmacie pubbliche, anche le società di capitali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>le società semplici composte di soli farmacisti</div></div>	Risposta esatta	B




N°	1469	Domanda	Per quali sostanze zuccherine la detenzione in farmacia comporta l'obbligo di munirsi di licenza U.T.F.?		N°	1471	Domanda	Il manuale di istruzioni per l'uso di un dispositivo per test autodiagnostico deve essere fornito:		
		<div><div><div><div>A</div></div><div>zucchero invertito, glucosio, levulosio</div></div><div><div><div>B</div></div><div>saccarosio, glucosio, isoglucosio</div></div><div><div><div>C</div></div><div>nessuna di quelle indicate</div></div><div><div><div>D</div></div><div>tutte quelle indicate</div></div><div><div><div>E</div></div><div>lattosio, fruttosio</div></div></div>		<div><div><div><div>A</div></div><div>con il dispositivo in forma cartacea</div></div><div><div><div>B</div></div><div>con il dispositivo in forma cartacea o su supporto informatico</div></div><div><div><div>C</div></div><div>tramite internet</div></div><div><div><div>D</div></div><div>con il dispositivo su supporto informatico</div></div><div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle indicazioni date è corretta</div></div></div>		Risposta esatta	C		Risposta esatta	A
N°	1470	Domanda	Gli operatori sanitari che omettano di segnalare al Ministero della Salute gli incidenti con i dispositivi medico-diagnostici in vitro:		N°	1472	Domanda	Il meccanismo di azione dei chinoloni è dovuto		
		<div><div><div><div>A</div></div><div>non sono soggetti a sanzioni</div></div><div><div><div>B</div></div><div>sono soggetti solo a sanzione amministrativa</div></div><div><div><div>C</div></div><div>sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e soggetti a sanzione amministrativa</div></div><div><div><div>D</div></div><div>sono soggetti solo a sanzione penale</div></div><div><div><div>E</div></div><div>sono soggetti a segnalazione all'Ordine dei Farmacisti</div></div></div>		<div><div><div><div>A</div></div><div>all'intercalazione della molecola nel DNA batterico</div></div><div><div><div>B</div></div><div>al blocco della RNA sintetasi DNA dipendente</div></div><div><div><div>C</div></div><div>alla disaggregazione della membrana batterica</div></div><div><div><div>D</div></div><div>alla formazione di un complesso con DNA -topoisomerasi batterica</div></div><div><div><div>E</div></div><div>al blocco della sintesi proteica</div></div></div>		Risposta esatta	C		Risposta esatta	D





N°	1473	Domanda	Il morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa caratterizzata da	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>perdita di neuroni dopaminergici</div><div>perdita di neuroni colinergici</div><div>perdita di neuroni adrenergici</div><div>perdita di neuroni serotoninergici</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1475	Domanda	Il farmacista NON è obbligato a tenere in farmacia:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>il registro entrata/uscita stupefacenti</div><div>la tariffa nazionale dei medicinali</div><div>i volumi aggiornati di "medicamenta"</div><div>i volumi della farmacopea ufficiale</div><div>i supplementi e gli aggiornamenti più recenti della f.u.</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1474	Domanda	La superossido dismutasi è un enzima che	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>facilita la digestione</div><div>riduce la viscosità del muco</div><div>controlla l'emosiasi</div><div>agisce su specie radicaliche</div><div>controlla l'uricemia</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1476	Domanda	Quale dei seguenti farmaci è indicato nella terapia dei disturbi bipolari del tono dell'umore?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>carbonato di litio</div><div>fentanile</div><div>carbamazepina</div><div>valproato di sodio</div><div>Ca2+-antagonisti</div></div></div>	Risposta esatta	A



N°	1477	Domanda	La L-diossifenilalanina (L-DOPA), avente la struttura indicata, ha attività antiparkinson in quanto costituisce uno dei precursori	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>
----	------	---------	--	--




N°	1481	Domanda	L'azione vasodilatatrice dei nitrati, aventi struttura del tipo di quella indicata, è principalmente conseguenza di		N°	1483	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il simeticone è corretta?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div> aumento di AMP ciclico</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> aumentata disponibilità cellulare di NO</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> stimolo della guanilato ciclasasi di membrana</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> inibizione della guanilato ciclasasi solubile</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> stimolo della fosfodiesterasi</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div> ha proprietà procinetiche</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> viene facilmente metabolizzato</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> contiene alluminio nella molecola</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> contiene silicio nella molecola</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> sono riportate più affermazioni corrette</div>	Risposta esatta	D
N°	1482	Domanda	Quale di questi farmaci beta-antagonisti NON è cardioselettivo:		N°	1484	Domanda	Il blocco dei recettori α2 presinaptici cardiaci provoca tachicardia perché:	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div> atenololo</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> timololo</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> acebutololo</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> metoprololo</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> esmololo</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div> aumenta la liberazione di noradrenalina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> diminuisce la liberazione di noradrenalina</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> aumenta la liberazione di acetilcolina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> inibisce il reuptake di noradrenalina</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> inibisce il metabolismo della noradrenalina</div>	Risposta esatta	A




N°	1485	Domanda La sindrome di Stevens-Johnson, reazione acuta da ipersensibilità che coinvolge la pelle e le mucose, può verificarsi in corso di trattamento con	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>CAF</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>tetracicline</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sulfamidici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>amminoglicosidi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>beta-lattamine</div></div>	Risposta esatta C
N°	1487	Domanda Una possibile conseguenza farmaco-tossicologica del polimorfismo genetico di un enzima metabolizzante è:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>minore efficacia di un farmaco nei metabolizzatori ultrarapidi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>maggiore tossicità di un farmaco nei metabolizzatori lenti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>minore efficacia di un pro-farmaco, attivato dall'enzima, nei metabolizzatori lenti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>maggiore tossicità di un farmaco con metaboliti tossici, formati dall'enzima, nei metabolizzatori rapidi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta E
N°	1486	Domanda Se con un contagocce il cui capillare ha un diametro esterno di 3 mm, a 20 °C, si ottengono 20 gocce da 1 grammo di acqua, ciò dipende:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>dalla tensione superficiale dell'acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dalla viscosità dell'acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>dalla forma del contagocce</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dalla costante dielettrica dell'acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>dalla tensione di vapore dell'acqua</div></div>	Risposta esatta A
N°	1488	Domanda Indicare quale delle seguenti affermazioni è errata?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>la liquirizia (radice di <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.) è controindicata nei pazienti ipertesi e nei bambini di età inferiore ai 12 anni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>tra gli effetti collaterali della valeriana (radice di <i>Valeriana officinalis</i> L.) vi è un possibile effetto paradosso che è l'insonnia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>l'estratto secco di ananas (frutto di <i>Ananas comosus</i> Merr.) ha azione antinfiammatoria</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>L'olio dei semi di borragine (<i>Borago officinalis</i> L.) contiene acido gamma-linolenico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>l'estratto di kava kava (rizoma e radici di <i>Piper methysticum</i> Forst) è usato come epatoprotettore</div></div>	Risposta esatta E

N°	1489	Domanda	Su quali principi si basano le regole di classificazione dei dispositivi medici?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>durata, invasività, tipo di funzionamento e sede anatomica</div><div>solo durata e invasività</div><div>solo durata, invasività e sede anatomica</div><div>solo sede anatomica</div><div>solo invasività</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1491	Domanda	Il valore di pH è calcolato matematicamente come:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>log della concentrazione di OH-</div><div>log negativo della concentrazione di OH-</div><div>log della concentrazione di H+</div><div>log negativo della concentrazione di H+</div><div>rapporto della concentrazione H+/OH-</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1492	Domanda	Nella cellula muscolare lascia l'aumento di cAMP porta a:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>contrazione per azione diretta</div><div>contrazione in seguito ad aumento dei livelli intracellulari di Ca++</div><div>rilassamento</div><div>attivazione dell'enzima adenilato ciclasi</div><div>attivazione dell'enzima guanilato ciclasi</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1490	Domanda	Quale è l'attività farmacologica più rilevante della tetracaina, avente la struttura indicata	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>adrenergica</div><div>neuroletica</div><div>anticonvulsivante</div><div>anestetica locale</div><div>antistaminica H2</div></div> <div><chem>CCNCCNC(=O)Oc1ccc(NC)cc1</chem></div>	Risposta esatta	D




N°	1493	Domanda	L'uso profilattico di preparati a base di oximetazolina può indurre:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	D
			epatotossicità	A		
			squilibri elettrolitici	B		
			disturbi della coagulazione	C		
			riduzione dell'effetto farmacologico per desensibilizzazione recettoriale	D		
			tossicità renale	E		
N°	1495	Domanda	Le droghe vegetali e i loro derivati possono essere vendute dal farmacista in farmacia	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	A
			indipendentemente dalla loro presentazione come sostanze curative o profilattiche	A		
			soltanto quando hanno alto dosaggio di principi attivi	B		
			se il farmacista ha ottenuto apposita licenza comunale	C		
			soltanto se si presentano in compresse o in altra forma farmaceutica	D		
			soltanto quando sono presentate come aventi proprietà curative o profilattiche	E		

N°	1494	Domanda	Quale tra i seguenti farmaci è utilizzato nel trattamento dell'asma ed ha lunga durata d'azione?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	E
			Clenbuterolo	A		
			Cromoglicato di sodio	B		
			Nessuna delle indicazioni è corretta	C		
			Zafirlukast	D		
			Salmeterolo	E		
N°	1496	Domanda	L'azione dei farmaci glucocorticoidi è mediata dal legame	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	C
			diretto con siti specifici del DNA	A		
			con specifici recettori di membrana	B		
			con specifici recettori citosolici	C		
			diretto con l'enzima fosfolipasi A2	D		
			al citoscheletro della cellula bersaglio	E		




N°	1497	Domanda	La sindrome di Reye, che si verifica, anche se raramente in età pediatrica, è stata associata:		N°	1499	Domanda	Secondo la F.U. in un cerotto transdermico composto da una matrice monostirato o multistirato solida o semisolida, la diffusione dei principi attivi alla pelle è regolata:	
			<div><div>A</div> alla assunzione di acido acetilsalicilico in concomitanza di patologie influenzali o varicella</div>					<div><div>A</div> dalla composizione e dalla struttura della matrice</div>	
			<div><div>B</div> alla assunzione di paracetamolo in concomitanza di patologie influenzali</div>					<div><div>B</div> dall'area della matrice</div>	
			<div><div>C</div> alla assunzione di acido acetilsalicilico in concomitanza di infezioni intestinali</div>					<div><div>C</div> dalla capacità di adesione della matrice alla pelle</div>	
			<div><div>D</div> alla assunzione di paracetamolo in concomitanza di varicella</div>					<div><div>D</div> dall'elasticità della matrice</div>	
			<div><div>E</div> nessuna delle indicazioni è corretta</div>					<div><div>E</div> nessuna indicazione è corretta</div>	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	A

N°	1498	Domanda	Quale dei seguenti diuretici dovrebbe essere più utile in un paziente con edema cerebrale?		N°	1500	Domanda	Quale delle seguenti cefalosporine NON viene assorbita per os?	
			<div><div>A</div></div>					<div><div>A</div></div>	
			<div><div>B</div></div>					<div><div>B</div></div>	
			<div><div>C</div></div>					<div><div>C</div></div>	
			<div><div>D</div></div>					<div><div>D</div></div>	
			<div><div>E</div></div>					<div><div>E</div></div>	
			Risposta esatta	E				Risposta esatta	E




N°	Domanda	1503	Domanda	Risposta esatta	A
1501	Nel ciclo di Krebs l'acido piruvico viene trasformato in	<div><div>A</div>acetylCoA e anidride carbonica</div> <div><div>B</div>acido lattico</div> <div><div>C</div>etanolo</div> <div><div>D</div>anidride carbonica ed acqua</div> <div><div>E</div>gliceraldeide</div>	Nel sistema oftalmico Ocuser® le membrane polimeriche sono costituite da	<div><div>A</div>copolimero etilene/vinile acetato</div> <div><div>B</div>polivinilpirrolidone</div> <div><div>C</div>polivinilpirrolidone reticolato</div> <div><div>D</div>copolimero polivinilpirrolidone/vinile acetato</div> <div><div>E</div>polivinilalcol</div>	Risposta esatta
		A			



N°	Domanda	1504	Domanda	Risposta esatta	C
1502	Quale delle seguenti sostanze attive può essere classificata come acido debole?	<div><div>A</div>caffeina</div> <div><div>B</div>fenobarbital</div> <div><div>C</div>saccarina</div> <div><div>D</div>più di uno</div> <div><div>E</div>tutti</div>	Indicare quale è l'impiego del potassio acesulfame avente la formula indicata: <div><chem>Cc1cc(=O)n([S-](=O)(=O)[O-])c1.[K+]</chem></div>	<div><div>A</div>emulsionante</div> <div><div>B</div>antifungino</div> <div><div>C</div>dolcificante</div> <div><div>D</div>aromatizzante</div> <div><div>E</div>antiossidante</div>	Risposta esatta
		D			





N°	1505	Domanda	Il blocco della trasmissione gangliare provoca:	<div><div><div>A</div></div><div><div>micosi</div></div></div> <div><div><div>B</div></div><div><div>diarrea</div></div></div> <div><div><div>C</div></div><div><div>ipertensione arteriosa</div></div></div> <div><div><div>D</div></div><div><div>stimolo alla minzione</div></div></div> <div><div><div>E</div></div><div><div>aumento del ritorno venoso</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1507	Domanda	Quale tra le seguenti piante medicinali viene utilizzata nel controllo del peso corporeo:	<div><div><div>A</div></div><div><div>Melaleuca viridiflora Sol.</div></div></div> <div><div><div>B</div></div><div><div>Serenoa repens Bar.</div></div></div> <div><div><div>C</div></div><div><div>Garcinia cambogia L.</div></div></div> <div><div><div>D</div></div><div><div>Vaccinium myrtillus L.</div></div></div> <div><div><div>E</div></div><div><div>Passiflora incarnata L.</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1506	Domanda	Quale dei farmaci elencati è anticoagulante per azione antagonista verso la vitamina K	<div><div><div>A</div></div><div><div>dicumarolo</div></div></div> <div><div><div>B</div></div><div><div>eparina</div></div></div> <div><div><div>C</div></div><div><div>tutti tranne uno</div></div></div> <div><div><div>D</div></div><div><div>acenocumarolo</div></div></div> <div><div><div>E</div></div><div><div>warfarin</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1508	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti l'isotretinoina, un farmaco antiacne, è esatta:	<div><div><div>A</div></div><div><div>e' un profarmaco</div></div></div> <div><div><div>B</div></div><div><div>riduce le dimensioni delle ghiandole sebacee e la produzione di sebo</div></div></div> <div><div><div>C</div></div><div><div>inibisce la replicazione di Propionibacterium acnes</div></div></div> <div><div><div>D</div></div><div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div> <div><div><div>E</div></div><div><div>tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div></div></div>	Risposta esatta	B




N°	1509	Domanda	Quali delle seguenti forme farmaceutiche è a rilascio modificato?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>le forme a rilascio prolungato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>le forme a rilascio ritardato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>le forme a rilascio pulsatile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1511	Domanda	La violazione del provvedimento che disciplina i turni e orari della farmacia è un illecito:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>soltanto penale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>soltanto deontologico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>soltanto civile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>soltanto amministrativo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>amministrativo e deontologico</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1512	Domanda	L'azione antiepilettica della fenitoina, avente la struttura indicata, è dovuta principalmente	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>al potenziamento del legame del GABA al suo recettore GABA- A</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>al blocco dei canali del Ca2+ voltaggio-dipendenti del sottotipo L</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>al blocco dei canali del Na+</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>all'aumento della conduttanza per il Cl- attraverso i canali specifici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>all'inibizione dell'ATPasi Ca2+-dipendente della membrana cellulare</div></div>	Risposta esatta	C



N°	1513	Domanda	La oxelacaina è un anestetico locale avente la struttura indicata. Quale delle affermazioni sottorportate è corretta? L' oxelacaina	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>si usa nella anestesia dentaria</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>ha una struttura analoga a quelle della lidocaina</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>ha una struttura analoga a quelle della procaina</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>data la sua potenziale tossicità sistemica, si usa esclusivamente per uso topico</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni fornite è corretta</div></div>	<div><div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1514	Domanda	Quali sono i medicinali omeopatici che possono essere pubblicizzati	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>quelli di produzione nazionale</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>quelli di importazione</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>nessuno</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>quelli in forma di capsule</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>quelli per i quali è prevista la pubblicità nel decreto di autorizzazione al commercio</div></div>	Risposta esatta	C	
N°	1515	Domanda	Per quanto tempo deve essere conservato da parte del farmacista copia del buono acquisto?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>un anno</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>Per due anni dall'ultima registrazione avvenuta sul registro di entrata/uscita</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>cinque anni</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>ililimitatamente</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>per la durata di titolarità della farmacia</div></div>	Risposta esatta	B	
N°	1516	Domanda	La mepivacaina, avente la struttura riportata, esercita la sua azione anestetica locale	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>bloccando i canali del Ca2+</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>aprendo i canali del K+</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>bloccando i canali del Na+ voltaggio-dipendenti</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>determinando una modificazione conformazionale dei recettori alfa</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>attivando una cascata di reazioni di fosforilazione per interazione con specifici recettori</div></div>	<div><div></div></div>	Risposta esatta	C




N°	1517	Domanda	Per quale periodo deve essere conservata una ricetta magistrale a base di una o più sostanze dopanti, soggette a trasmissione dei dati:		N°	1519	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti che riguardano la fexofenadina è corretta?	
			<div><div><div>A</div>6 mesi, in originale o in copia, a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo alla spedizione della ricetta</div><div><div>B</div>2 anni</div><div><div>C</div>5 anni</div><div><div>D</div>6 mesi, inviando copia alla A.S.L. dove ha sede la farmacia</div><div><div>E</div>6 mesi</div></div>	Risposta esatta A				<div><div><div>A</div>non presenta gli effetti collaterali degli antistaminici di prima generazione</div><div><div>B</div>e' classificato come antistaminico di seconda generazione</div><div><div>C</div>in alcuni Paesi fa parte di medicinali utilizzati come ipnotici</div><div><div>D</div>tutte le indicazioni sono corrette</div><div><div>E</div>tutte le indicazioni, tranne una, sono corrette</div></div>	Risposta esatta E
N°	1518	Domanda	La vendita di sostanze velenose per uso diverso da quello terapeutico (industriale, professionale o agricolo), è subordinata alla registrazione della sostanza velenosa da parte del farmacista in un apposito registro?		N°	1520	Domanda	Quale delle seguenti sostanze è la più efficace nell'alleviare i sintomi delle crisi di astinenza negli eroinomani?	
			<div><div><div>A</div>si, e deve essere conforme ad un modello approvato</div><div><div>B</div>no, non è previsto alcun registro</div><div><div>C</div>si, ma non deve essere conforme ad un modello approvato</div><div><div>D</div>si, ma deve essere adottato il "modello" di registro stabilito dall'autorità regionale</div><div><div>E</div>si, ma deve essere soggetto a vidimazione preventiva dell'autorità sanitaria locale</div></div>	Risposta esatta C				<div><div><div>A</div>morfina</div><div><div>B</div>codeina</div><div><div>C</div>paracetamolo</div><div><div>D</div>naloxone</div><div><div>E</div>destrometorfano</div></div>	Risposta esatta A




N°	1521	Domanda	Il meccanismo d'azione della sinvastatina può essere descritto come :
A		inibizione del CYP 2A4	
B		aumento della velocità di sintesi del colesterolo	
C		diminuzione della velocità di sintesi del colesterolo	
D		aumento della velocità di degradazione metabolica del colesterolo	
E		nessuna delle indicazioni è soddisfacente	
		Risposta esatta	C


N°	1522	Domanda	Chi può assumere la titolarità dell'esercizio di una farmacia privata?
A		qualunque farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti	
B		tutti i farmacisti iscritti all'ordine dei farmacisti e le società i cui soci siano farmacisti	
C		i farmacisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché le società di persone o cooperative i cui soci siano farmacisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge	
D		chiunque, purché preponga alla gestione un farmacista abilitato e iscritto all'ordine dei farmacisti	
E		i farmacisti iscritti all'ordine dei farmacisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e le società di capitali con almeno il 51% del capitale detenuto da farmacisti	
		Risposta esatta	C
N°	1523	Domanda	La ricetta medica per la prescrizione di medicinali veterinari è obbligatoria
A		per tutti i medicinali tranne quelli indicati in apposito decreto del Ministro della Salute	
B		per medicinali destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo	
C		per i medicinali erogabili in regime di S.S.N.	
D		sempre	
E		in nessun caso	
		Risposta esatta	A
N°	1524	Domanda	La sulfasalazina ha la struttura indicata. Quale delle affermazioni sotto riportate e ad essa riferite è corretta:
A		subisce metabolismo riduttivo ad acido p-amminosalicilico	
B		viene rapidamente assorbita a livello gastrico	
C		si trova in commercio esclusivamente in forma di supposte e dismi	
D		è un profarmaco	
E		si trova in in commercio in forma di sciroppo ad uso pediatrico	
		Risposta esatta	D

N°	1525	Domanda	I medicinali dispensati in forma di aerosol contengono, generalmente, come propellente	<div><div><div>A</div><div>un liquido basso bollente</div></div><div><div>B</div><div>un liquido alto bollente</div></div><div><div>C</div><div>aria compressa</div></div><div><div>D</div><div>azoto gassoso</div></div><div><div>E</div><div>aria liquida</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1527	Domanda	Quale dei parametri indicati è un indice della potenza di un farmaco:	<div><div><div>A</div><div>la sua selettività</div></div><div><div>B</div><div>la sua qualità</div></div><div><div>C</div><div>la dose che produce il 50% dell'effetto massimo</div></div><div><div>D</div><div>il suo effetto massimo</div></div><div><div>E</div><div>la sua velocità di azione</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1526	Domanda	E' consentito effettuare delle correzioni sul registro di carico e scarico degli stupefacenti?	<div><div><div>A</div><div>si, purchè la correzione venga effettuata con l'ausilio di mezzi coprenti</div></div><div><div>B</div><div>si, purchè del dato corretto rimanga idonea documentazione</div></div><div><div>C</div><div>si, purchè si faccia apposita annotazione in calce</div></div><div><div>D</div><div>si, purchè il dato corretto rimanga sempre leggibile</div></div><div><div>E</div><div>si, purchè la correzione venga segnalata all'A.S.L. di competenza</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1528	Domanda	Per quanto tempo il farmacista è obbligato a conservare copia delle ricette mediche veterinarie non ripetibili rilasciate per animali da compagnia?	<div><div><div>A</div><div>due anni</div></div><div><div>B</div><div>non esiste obbligatorietà</div></div><div><div>C</div><div>sei mesi, ad eccezione delle prescrizioni di stupefacenti di Tabella II sez. B e C</div></div><div><div>D</div><div>tre anni</div></div><div><div>E</div><div>cinque anni</div></div></div>	Risposta esatta	C




N°	1529	Domanda	Per quali medicinali il prezzo di vendita al pubblico è fissato dalla "tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali"?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>per tutti i medicinali per uso umano</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>per tutti i medicinali</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>per i soli medicinali preparati industrialmente</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>per tutti i medicinali non erogabili in regime di S.S.N.</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>per le sole preparazioni eseguite integralmente in farmacia</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>	
N°	1531	Domanda	L'acido acetilsalicilico ha funzione antitrombotica in quanto agisce principalmente:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>impedendo la formazione di prostaglandine</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>non permettendo la sintesi di leucotrieni</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>inibendo la sintesi del trombossano A2</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ralentando la sintesi di prostaciline</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuno dei meccanismi indicati è corretto</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>C</div>	
N°	1532	Domanda	Il nome chimico 1,3,5(10)-estratrien-3,17B-diol (struttura indicata) corrisponde al nome comune di	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>estrano</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>estriolo</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>estradiolo</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>mestranolo</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>etnilestradiolo</div></div></div></div> <div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>C</div>	
N°	1530	Domanda	L'interferone beta 1b si somministra:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>per via orale</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>per via intramuscolare</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>per via sottocutanea</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>per via intradermica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>per nessuna delle vie riportate</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>C</div>	

N°	1533	Domanda	Le forme farmaceutiche a rilascio modificato comunemente indicate come cerotti transdermici sono riportate	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>nel formulario nazionale</div><div>in apposita tabella F.U.</div><div>in F.U. in apposita monografia</div><div>nel Codex della FOFI</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div>		N°	1535	Domanda	Durante il trattamento della depressione con inibitori delle MAO bisogna evitare l'ingestione di cibi contenenti	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>serina</div><div>acido glutammico</div><div>tiramina</div><div>acido citrico</div><div>vitamina B12</div></div>	
					Risposta esatta	C				Risposta esatta	C
N°	1534	Domanda	I bioflavonoidi sono:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>fattori essenziali per l'organismo la cui carenza provoca specifici disturbi</div><div>polifenoli contenuti in molti alimenti</div><div>pigmenti colorati</div><div>derivati del cromone</div><div>tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div></div>		N°	1536	Domanda	Può il farmacista spedire una ricetta medica ripetibile priva della data di prescrizione?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>sì, sempre</div><div>no, mai</div><div>sì, ma deve farne apposita annotazione sulla ricetta</div><div>sì, tranne che per ricette del servizio sanitario nazionale</div><div>sì, tranne che per le ricette che prescrivono stupefacenti</div></div>	
					Risposta esatta	E				Risposta esatta	B




N°	1537	Domanda	La clobetasamide può indurre:	<div><div><input type="radio"/> A</div>cistite emorragica</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>aritmie ventricolari</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>crisi ipertensive</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>anemia emolitica</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>convulsioni</div>	Risposta esatta	A
N°	1539	Domanda	Per ridurre i rischi dell'esposizione ai raggi solari è necessario applicare frequentemente il prodotto per la protezione solare?	<div><div><input type="radio"/> A</div>sì, sempre</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>no, se il solare è descritto come resistente all'acqua</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>solo dopo essersi bagnati</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>solo dopo aver nuotato per un tempo prolungato.</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>dipende dal tipo di pelle</div>	Risposta esatta	A
N°	1540	Domanda	Gli estrogeni si usano:	<div><div><input type="radio"/> A</div>come terapia sostitutiva in menopausa</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>come terapia del nanismo</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>per diagnosticare un'insufficienza ovarica</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>come antiedemigeni</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>come antilipidemici</div>	Risposta esatta	A

N°	1541	Domanda	Qualora venga meno la pluralità di soci in una società di gestione di una farmacia:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è prevista la chiusura della farmacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>il socio superstite deve nominare un nuovo direttore responsabile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel termine perentorio di sei mesi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel termine perentorio di tre mesi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>il socio superstite è obbligato ad associare nuovi soci</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1543	Domanda	Quale dei seguenti rappresenta un possibile effetto indesiderato dell'acido alendronico?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>cefalea</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dolore muscolo scheletrico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>stipsi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>diarrea</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1544	Domanda	Le discinesie tardive sono un effetto della terapia a lungo termine con:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antidolorici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antiepilettici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>antipsicotici "tipici"</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>beta-bloccanti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>inibitori delle MAO</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1542	Domanda	L'antitrombina si usa come:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antibatterico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antivirale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>anticoagulante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antiemetico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>anticonvulsivante</div></div>	Risposta esatta	C



N°	1545	Domanda	Quale, tra gli enzimi seguenti, partecipa alla formazione dell'acetilcolina nell'organismo?	<div><div><div>A</div><div>più di uno</div></div><div><div>B</div><div>COMT</div></div><div><div>C</div><div>acetilcolinesterasi</div></div><div><div>D</div><div>DOPA decarbossilasi</div></div><div><div>E</div><div>O-acetiltransferasi</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1547	Domanda	L'ormone riportato in struttura è l'idrocortisone. Quale delle seguenti indicazioni è esatta	<div><div><div>A</div><div>è un corticosteroide</div></div><div><div>B</div><div>è un glucocorticoide</div></div><div><div>C</div><div>ha attività antinfiammatoria</div></div><div><div>D</div><div>è biosintetizzato a partire dal colesterolo</div></div><div><div>E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div> <div><chem>OCC12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=CC(=O)CC[C@]34C</chem></div>	Risposta esatta	E
N°	1548	Domanda	La pubblicità dei dispositivi medici è	<div><div><div>A</div><div>vietata per quelli soggetti a prescrizione medica o ad utilizzazione con l'assistenza di un operatore sanitario;</div></div><div><div>B</div><div>vietata se è rivolta agli operatori sanitari;</div></div><div><div>C</div><div>consentita per quelli sotto prescrizione medica, solo previa autorizzazione del Ministero;</div></div><div><div>D</div><div>consentita solo se fatta attraverso la carta stampata o internet</div></div><div><div>E</div><div>vietata se è rivolta ai pazienti</div></div></div>	Risposta esatta	A




N°	1549	Domanda Quale tra le affermazioni seguenti riguardanti le sostanze polimorfe sono DIVERSE per quanto attiene	<div><div><input type="checkbox"/> A</div> stato fisico di liquidi</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> stato fisico di gas</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> struttura molecolare</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> conducibilità delle soluzioni</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> biodisponibilità farmaceutica</div>
----	------	---	---

Risposta esatta

E

N°	1553	Domanda	Quale delle sostanze sotto indicate conferisce ai medicinali che le contengono l'attività terapeutica di antiacido	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>simeticone</div><div>dimeticone</div><div>acido alginico</div><div>sucralfato</div><div>nessuno di quelle indicate</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1555	Domanda	Per la formazione di un idrogel a base di polimeri carbossivinilici a carattere acido è indispensabile la presenza di:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>alcol cetostearylco</div><div>cera d'api</div><div>sodio idrossido</div><div>glicerolo</div><div>sodio cloruro</div></div>	Risposta esatta	C

N°	1554	Domanda	Il rivestimento delle compresse si effettua per	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>proteggere il farmaco dalla decomposizione provocata dall'umidità atmosferica</div><div>mascherare odori sgradevoli</div><div>tutti i motivi indicati</div><div>individuare facilmente le stesse quando sono colorate</div><div>tutti i motivi indicati, tranne uno</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1556	Domanda	Per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria il Ministero della Salute si avvale prevalentemente	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>della Guardia di Finanza</div><div>della Polizia di Stato</div><div>delle A.S.L.</div><div>dei Nuclei Specializzati dell'Arma dei Carabinieri</div><div>degli Ordini delle Professioni Sanitarie</div></div>	Risposta esatta	D



N°	1557	Domanda	Il TRH (ormone liberante la tireotropina):	<div><div>A</div><div>è un ormone ipofisario</div></div> <div><div>B</div><div>è un ormone tiroideo</div></div> <div><div>C</div><div>è un ormone ipotalamico</div></div> <div><div>D</div><div>ha come organo bersaglio la tiroide</div></div> <div><div>E</div><div>ha come organo bersaglio l'ipotalamo</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1558	Domanda	Qualora venga meno la pluralità dei soci in una società tra farmacisti per la gestione di una farmacia privata, il socio superstita deve:	<div><div>A</div><div>ricostituire immediatamente la pluralità dei soci, pena la decadenza</div></div> <div><div>B</div><div>ricostituire entro sei mesi la pluralità dei soci</div></div> <div><div>C</div><div>vendere la farmacia</div></div> <div><div>D</div><div>preporre alla gestione della farmacia un direttore assunto a tempo pieno</div></div> <div><div>E</div><div>richiedere all'ordine dei farmacisti la nomina di un commissario scelto in un'apposita lista predisposta</div></div>	Risposta esatta	B

N°	1559	Domanda	Quante farmacie può gestire ciascuna società tra farmacisti per la gestione di farmacie private?	<div><div>A</div><div>non più di quattro per ciascuna provincia</div></div> <div><div>B</div><div>non più di quattro nella provincia</div></div> <div><div>C</div><div>non più di una</div></div> <div><div>D</div><div>tante quanti sono i soci</div></div> <div><div>E</div><div>non vi è limite</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1560	Domanda	Quale dei seguenti farmaci NON produce effetti parasimpaticomimetici diretti o indiretti?	<div><div>A</div><div>betanecolo</div></div> <div><div>B</div><div>neosilgmina</div></div> <div><div>C</div><div>carbacolo</div></div> <div><div>D</div><div>atropina</div></div> <div><div>E</div><div>pilocarpina</div></div>	Risposta esatta	D



N°	1561	Domanda	L'ACTH (corticotropina) si usa per diagnosticare un'insufficienza	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>surrenalica</div><div>ipofisaria</div><div>ipotalamica</div><div>ovarica</div><div>tiroidea</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1563	Domanda	La consistenza di un lipogelo dipende principalmente:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>dal tipo di agente gelificante</div><div>dalla concentrazione di agente gelificante</div><div>dalle condizioni termiche e meccaniche di gelificazione</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div><div>dalla quantità del componente oleoso</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1564	Domanda	Quale vantaggio offre un gel a base di idrossietilcellulosa rispetto a un gel con carbopoli?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>può incorporare, senza variare la consistenza, soluzioni a pH acido</div><div>si spalma meglio e non occorre aggiungere conservanti</div><div>si realizza in poco tempo e si neutralizza più facilmente</div><div>può incorporare il 50% di fase oleosa</div><div>può gelificare anche soluzioni idroalcoliche con grado alcolico superiore al 40%</div></div>	Risposta esatta	A

dal tipo di agente gelificante


dalla concentrazione di agente gelificante

dalle condizioni termiche e meccaniche di gelificazione

tutte le indicazioni sono corrette

dalla quantità del componente oleoso

N° 1562 Domanda Il più comune effetto collaterale dei farmaci Ca2+-antagonisti a struttura diidropiridinica del tipo indicato è



- A

B

C

D

E
- cefalea


effetto cronotropo positivo

effetto inotropo positivo

insonnia o eccitabilità


inappetenza

Risposta esatta A



N°	1569	Domanda	Quale dei meccanismi ricordati è alla base dell'azione della reserpina sulla trasmissione catecolaminergica:		N°	1571	Domanda	Quale delle seguenti definizioni caratterizza meglio una sostanza citotossica?	
			<div><div><div>A</div><div>stimolo dei recettori a postsinaptici</div></div><div><div>B</div><div>deplezione di catecolamine dalle vescicole presinaptiche</div></div><div><div>C</div><div>blocco del reuptake neuronale delle catecolamine</div></div><div><div>D</div><div>stimolo dei recettori a presinaptici</div></div><div><div>E</div><div>inibizione delle MAO</div></div></div>					<div><div><div>A</div><div>causa morte cellulare per necrosi</div></div><div><div>B</div><div>causa morte cellulare per apoptosi</div></div><div><div>C</div><div>causa un danno al genoma</div></div><div><div>D</div><div>causa un danno cellulare di intensità variabile</div></div><div><div>E</div><div>causa perossidazione lipidica</div></div></div>	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	D


N°	1570	Domanda	Quale delle seguenti categorie di sostanze NON è colorata:		N°	1572	Domanda	Chi stabilisce il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali OTC?	
			<div><div><div>A</div><div>metilxantine</div></div><div><div>B</div><div>polleni</div></div><div><div>C</div><div>antrachinoni</div></div><div><div>D</div><div>antodani</div></div><div><div>E</div><div>metalloporfirine</div></div></div>					<div><div><div>A</div><div>l'AIFA</div></div><div><div>B</div><div>il Ministero della Salute</div></div><div><div>C</div><div>il produttore</div></div><div><div>D</div><div>il titolare della farmacia o dell'esercizio commerciale</div></div><div><div>E</div><div>l'associazione dei titolari di farmacia</div></div></div>	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	D




N°	1573	Domanda	L'utilizzazione terapeutica dei nitrofurani antibatterici è stata fortemente ridotta soprattutto a causa della	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>loro tossicità cronica</div><div>loro tossicità acuta</div><div>scoperta di farmaci più potenti</div><div>difficoltà di sintesi</div><div>insolubilità</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1574	Domanda	Il principio attivo donepezil, un inibitore della acetilcolinesterasi, può essere impiegato:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>nella schizofrenia</div><div>nel piccolo male epilettico</div><div>nella demenza di Alzheimer</div><div>nella depressione bipolare</div><div>nell'ulcera gastrica</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1575	Domanda	Gli "inibitori suicidi" sono composti	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>usati per il trattamento di forme maniacali</div><div>che formano legami covalenti con l'enzima inattivandolo</div><div>che si legano reversibilmente ad un enzima</div><div>usati per il trattamento di manie suicide</div><div>che vengono facilmente catabolizzati</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1576	Domanda	Gli antipsicotici atipici	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>inducono sempre effetti extrapiramidali</div><div>sono agonisti serotonergici</div><div>sono antagonizzati dalla apomorfina</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div></div>	Risposta esatta	D


N°	1577	Domanda	Il farmacista deve attribuire al preparato galenico una data limite di utilizzazione		N°	1579	Domanda	I dispositivi medico-diagnostici in vitro destinati alla valutazione delle prestazioni	
		<input type="checkbox"/> A	riportando istruzioni generiche a seconda della forma farmaceutica	<input type="checkbox"/> A			<input type="checkbox"/> A	sono marcati CE	
		<input type="checkbox"/> B	riportando la data limite di utilizzo in etichetta, in ogni caso non deve superare 30 mesi	<input type="checkbox"/> B			<input type="checkbox"/> B	devono recare la dicitura "per uso esclusivo di ricerca"	
		<input type="checkbox"/> C	riportando la data ultima di utilizzazione in etichetta, che non deve oltrepassare 6 mesi dalla data di preparazione	<input type="checkbox"/> C			<input type="checkbox"/> C	non sono marcati CE	
		<input type="checkbox"/> D	riportando la data limite di utilizzo in etichetta, in ogni caso non deve superare 60 giorni	<input type="checkbox"/> D			<input type="checkbox"/> D	non sono progettati e fabbricati per uso diagnostico	
		<input type="checkbox"/> E	riportando la data limite di utilizzo in etichetta, in ogni caso non oltre 1 anno	<input type="checkbox"/> E			<input type="checkbox"/> E	nessuna delle indicazioni è corretta	
			Risposta esatta C					Risposta esatta C	


N°	1578	Domanda	A chi il farmacista è tenuto a trasmettere una copia del buono acquisto stupefacenti conforme al D.M. 18.12.2006?		N°	1580	Domanda	Il sirolimus e la ciclosporina hanno effetti immunosoppressori simili ma diversi profili tossicologici. Il sirolimus più della ciclosporina causa:	
		<input type="checkbox"/> A	al Ministero della Salute, Ufficio Centrale Stupefacenti, in caso di reso	<input type="checkbox"/> A			<input type="checkbox"/> A	reazioni anafilattiche	
		<input type="checkbox"/> B	alla A.S.L. di appartenenza	<input type="checkbox"/> B			<input type="checkbox"/> B	ipertensione	
		<input type="checkbox"/> C	all'Autorità di Pubblica Sicurezza	<input type="checkbox"/> C			<input type="checkbox"/> C	osteoporosi	
		<input type="checkbox"/> D	all'Ordine dei Farmacisti	<input type="checkbox"/> D			<input type="checkbox"/> D	insufficienza renale	
		<input type="checkbox"/> E	Al N.A.S.	<input type="checkbox"/> E			<input type="checkbox"/> E	trombocitopenia	
			Risposta esatta A					Risposta esatta E	




N°	1581	Domanda	I dispositivi per test autodiagnostici:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>possono essere utilizzati a domicilio da profani ma esclusivamente con l'assistenza di un operatore sanitario</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>non possono essere utilizzati a domicilio</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>possono essere utilizzati a domicilio da parte di profani</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>possono essere utilizzati a domicilio ma soltanto da operatori sanitari</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>possono essere utilizzati a domicilio da parte di profani soltanto se questi ultimi hanno ricevuto una formazione adeguata</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1582	Domanda	L'attività intrinseca di un farmaco può assumere	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il valore minimo di zero</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>il valore massimo di 1</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>valori compresi tra zero ed 1</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1583	Domanda	Il paracetamolo è un principio attivo che	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>esiste come tale nei medicinali</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si forma nell'organismo dopo somministrazione di acetanilide</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si forma nell'organismo dopo somministrazione di fenacetina</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>viene in parte metabolizzato per glucuronazione</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni fornite sono corrette</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1584	Domanda	I farmaci antagonisti beta-adrenergici trovano applicazione nella terapia cardiovascolare. In quale dei seguenti gruppi terapeutici possono essere inquadrati?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antiaritmici di classe 1</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antiaritmici di classe 2</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>antiaritmici di classe 3</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antiaritmici di classe 4</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	B



N°	1585	Domanda	Un preparato magistrale veterinario prevede almeno una ricetta.	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>ripetibile cinque volte, validità tre mesi</div><div>non ripetibile, validità trenta giorni</div><div>non ripetibile in triplice copia, validità dieci giorni lavorativi escluso quello di redazione</div><div>ripetibile dieci volte, validità sei mesi</div><div>ministeriale a ricalco, validità trenta giorni</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1587	Domanda	Per quale delle seguenti proprietà la digitale aumenta la forza di contrazione del miocardio?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>riduzione del tono vagale</div><div>aumento della frequenza cardiaca</div><div>riduzione della velocità di conduzione</div><div>aumento del Ca²⁺ intracellulare</div><div>aumento della velocità di conduzione</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1588	Domanda	Il cloramfenicolo presenta nella sua struttura:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div></div><div><div>un centro chirale</div><div>due centri chirali</div><div>nessun centro chirale</div><div>isomeria cis-trans</div><div>nessuna isomeria</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1586	Domanda	Il farmacista, in farmacia, è tenuto a fornirsi di apposito registro di entrata e uscita dei medicinali veterinari?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>no, se conserva per 5 anni la fattura di acquisto o la bolla di consegna (entrata) e la ricetta, recante il numero di lotto del medicinale venduto (uscita).</div><div>sì, per la dispensazione dei medicinali destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo</div><div>sì, per la dispensazione dei medicinali destinati ad animali da compagnia</div><div>sì, per la dispensazione dei medicinali ad azione ormonica o tireostatica</div><div>sì, sempre</div></div>	Risposta esatta	A



N°	1589	Domanda	Gli effetti amministrativi del contratto di trasferimento della farmacia da un farmacista titolare ad altro farmacista decorrono	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>dalla data della stipula del contratto</div><div>dopo un anno dalla stipula del contratto</div><div>dalla data del riconoscimento del contratto da parte dell'autorità amministrativa</div><div>dalla data dell'autorizzazione dell'ordine provinciale dei farmacisti</div><div>dalla data del pagamento della tassa di concessione regionale</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1591	Domanda	In un cosmetico, secondo la Legge 713/86, i coloranti ammessi sono quelli	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>elencati nell'Allegato IV</div><div>riportati in F.U.</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div><div>autorizzati anche per uso alimentare</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1590	Domanda	La codeina è	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>un prodotto ottenibile anche per via chimica dalla morfina</div><div>il glucuronocongiugato della morfina</div><div>un alcaloide dell'oppio solubile in soluzione acquosa di NaOH</div><div>un endocoeide dei recettori oppioidi</div><div>un catabolita della papaverina</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1592	Domanda	A quale classe farmacologica appartiene la terazosina?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>agonisti alfa2-adrenergici</div><div>antagonisti alfa1-adrenergici</div><div>vasodilatatori (liberatori di ossido d'azoto)</div><div>antistaminici anti H1 di 2a generazione, non sedativi</div><div>ipocolesterolemizzanti</div></div></div>	Risposta esatta	B



N°	1593	Domanda	Quale degli effetti riportati si manifesta in caso di intossicazione acuta da alcol etilico	<div><div><div>A</div></div><div>vasocostrizione</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>vasodilatazione</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>stimolazione del respiro</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>riduzione della diuresi</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>miglioramento dei riflessi spinali</div></div>		
					Risposta esatta	B

N°	1595	Domanda	Per quanto tempo gli eredi possono gestire provvisoriamente la farmacia ereditata?	<div><div><div>A</div></div><div>dieci anni</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>fino al trentesimo anno di età dell'erede più giovane e comunque per dieci anni</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>due anni</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>un anno</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>per la durata del corso di studi in farmacia purché l'erede vi sia iscritto.</div></div>		Risposta esatta	C
----	------	---------	--	---	--	-----------------	---

N°	1596	Domanda	Che cosa il farmacista è tenuto ad apporre sui recipienti dei medicinali galenici allestiti in farmacia quando si tratti di rimedi per cura di animali?	<div><div><div>A</div></div><div>nulla</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>la specie animale cui il medicinale è destinato</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>la data di scadenza</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>il timbro della farmacia</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>l'indicazione "per uso veterinario"</div></div>		Risposta esatta	E
----	------	---------	---	---	--	-----------------	---



N° 1599 Domanda A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "iazide" nella Denominazione Comune?

- ☐ A diuretici
- ☐ B anestetici locali
- ☐ C ipolipemizzanti
- ☐ D antivirali
- ☐ E ipoglicemizzanti solfonammidici

Risposta esatta A

N° 1597 Domanda Il propafenone è un farmaco

- ☐ A miocardassante
- ☐ B antiaritmico
- ☐ C ansiolitico
- ☐ D ipoglicemizzante
- ☐ E analgesico narcotico

Risposta esatta B

N° 1598 Domanda Le indagini diagnostiche attraverso la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) utilizzano radiazioni elettromagnetiche che, rispetto ai valori che rientrano nel campo del visibile, sono

- ☐ A ad energia maggiore
- ☐ B a lunghezza d'onda maggiore
- ☐ C a lunghezza d'onda di gran lunga minore
- ☐ D a lunghezza d'onda comparabile
- ☐ E a lunghezza d'onda ed energia maggiori

Risposta esatta B

N° 1600 Domanda Gli utili o le perdite del bilancio di una farmacia possono essere ricavati:

- ☐ A dalla situazione patrimoniale e dal conto economico
- ☐ B dal conto economico analizzando costi e ricavi
- ☐ C dalla situazione patrimoniale senza le passività
- ☐ D dal conto economico e dalle tasse pagate
- ☐ E più di una risposta è corretta


Risposta esatta E




N°	1601	Domanda	Cos'è la ioduria?	<div><div><div>A</div><div>un esame colorimetrico del sangue</div></div><div><div>B</div><div>la carenza di iodio</div></div><div><div>C</div><div>l'escrezione urinaria di sale iodato</div></div><div><div>D</div><div>la concentrazione dello iodio nelle urine</div></div><div><div>E</div><div>il dosaggio urinario degli ormoni tiroidei</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1603	Domanda	La stabilizzazione fisica di una crema idrofoba può essere affidata a:	<div><div><div>A</div><div>sodio tetraborato (borace)</div></div><div><div>B</div><div>polossietilendi derivati del sorbitano esterificati con acidi grassi</div></div><div><div>C</div><div>saponi alcalini</div></div><div><div>D</div><div>esteri del sorbitano con acidi grassi</div></div><div><div>E</div><div>triolanolamina</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1604	Domanda	Quale delle affermazioni sotto elencate e riguardanti le cefalosporine è corretta? Passando dalle cefalosporine di prima a quelle di terza generazione	<div><div><div>A</div><div>aumenta l'attività antimicrobica verso i batteri Gram-positivi</div></div><div><div>B</div><div>la variazioni farmacocinetiche favoriscono i composti assumibili per os</div></div><div><div>C</div><div>aumenta l'attività antimicrobica verso i batteri Gram-negativi</div></div><div><div>D</div><div>più di una delle indicazioni è corretta</div></div><div><div>E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1602	Domanda	Una farmacia viene classificata come "urbana" se situata in un	<div><div><div>A</div><div>comune con popolazione sino a 7.000 abitanti</div></div><div><div>B</div><div>comune o centro abitato con popolazione superiore a 3.000 abitanti</div></div><div><div>C</div><div>comune o centro abitato con popolazione superiore a 5.000 abitanti</div></div><div><div>D</div><div>centro abitato con popolazione fino a 5.000 abitanti</div></div><div><div>E</div><div>comune con popolazione residente sino a 4.500 abitanti</div></div></div>	Risposta esatta	C



N°	1605	Domanda	Nell'interazione farmaco-recettore entrano in gioco legami che possono avere natura diversa. Quale, tra i tipi di legame sotto elencati, si riscontra con maggiore frequenza nei farmaci a più elevata tossicità? Il legame	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>idrofobico</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>ionico</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>dipolare</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>di van der Waals</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>covalente</div>	Risposta esatta	E
N°	1607	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di bersaglio d'azione degli antibiotici beta-lattamici?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>membrana cellulare</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>parete cellulare</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>sintesi proteica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>acidi nucleici</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>enzimi metabolici</div>	Risposta esatta	B

N°	1606	Domanda	Nella struttura dei triptani, tra i quali il rizatriptan riportato in struttura, è presente il biccio:			
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>del tropano</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>della benzodiazepina</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>dell'indolo</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>del benzimidazolo</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>del benzofurano</div>	Risposta esatta	C	
N°	1608	Domanda	Il Tamoxifene si usa per le neoplasie:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>linfatiche</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>emopoietiche</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>epatiche</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>ormone dipendenti</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>renali</div>	Risposta esatta	D

N°	1609	Domanda	Le interazioni farmacologiche tra succo di pompelmo e farmaci possono portare a:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>aumento della biodisponibilità</div><div>riduzione della biodisponibilità</div><div>aumento del metabolismo epatico</div><div>ridotto assorbimento</div><div>effetto additivo</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1611	Domanda	Allo scopo di prolungare l'attività dell'acetazolamide, avente la struttura indicata, per terapie superiori a tre giorni, è necessario provvedere alla somministrazione continua di	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>bicarbonato</div><div>fosfati</div><div>clorati</div><div>calcio</div><div>cloruro di potassio</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1610	Domanda	Quale dei meccanismi elencati NON è proprio della reserpina? Deplezione di	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>catecolamine dalla midollare surrenale</div><div>serotonina dai neuroni serotonergici centrali</div><div>dopamina dai neuroni dopaminergici centrali</div><div>GABA dagli interneuroni del neurasse</div><div>noradrenalina dalle terminazioni simpatiche periferiche</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1612	Domanda	Le interleuchine sono	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>enzimi di restrizione</div><div>granulociti</div><div>cellule staminali</div><div>un particolare tipo di citochine</div><div>molecole che intercalano il DNA</div></div>	Risposta esatta	D





N°	1613	Domanda	Biodisponibilità è un termine utilizzato per indicare	<div><div>A</div>la liberazione del farmaco da un preparato a lento rilascio</div> <div><div>B</div>il livello ematico che il farmaco può raggiungere</div> <div><div>C</div>la percentuale di farmaco che raggiunge la circolazione sistemica</div> <div><div>D</div>l'assorbimento del farmaco</div> <div><div>E</div>lo studio della clearance del farmaco</div>	Risposta esatta	C
N°	1615	Domanda	Il termine porosità per la forma farmaceutica compresse è legato	<div><div>A</div>alla disagregabilità, alla durezza e alla stabilità</div> <div><div>B</div>direttamente alla somma tra il volume apparente ed il volume vero</div> <div><div>C</div>al rapporto tra il volume apparente ed il volume vero</div> <div><div>D</div>al prodotto tra il volume apparente ed il volume vero</div> <div><div>E</div>a nessuna delle indicazioni riportate</div>	Risposta esatta	A

N°	1614	Domanda	Gli enzimi elencati partecipano al metabolismo della dopamina nell'organismo. Quale di essi è responsabile della sua trasformazione in altro neurotrasmettitore?	<div><div>A</div>più di uno di quelli indicati</div> <div><div>B</div>DOPA decarbossilasi</div> <div><div>C</div>Tirosina idrossilasi</div> <div><div>D</div>MAO</div> <div><div>E</div>Dopamina beta-idrossilasi</div>	Risposta esatta	E
N°	1616	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di microbida? Sostanza che	<div><div>A</div>uccide i batteri</div> <div><div>B</div>impedisce la crescita di batteri</div> <div><div>C</div>impedisce la crescita di microorganismi</div> <div><div>D</div>uccide i microorganismi</div> <div><div>E</div>combatte i virus</div>	Risposta esatta	D



N°	1617	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "fibrato" nella Denominazione Comune?	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>Anticolesterolemici inibitori della HMGCoA reduttasi</div></div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>Antilipidici della classe dell'acido fenossibutirrico</div></div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>Antinfiammatori derivati dall'indometacina</div></div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>Bloccanti adrenergici</div></div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>Antistaminici H2</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1619	Domanda	Le norme di attuazione concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>non si applicano ai prodotti cosmetici</div></div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>si applicano solo ai prodotti cosmetici</div></div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>si applicano limitatamente ad alcune categorie di prodotti cosmetici</div></div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>si applicano solo per prodotti cosmetici destinati a permanere sulla pelle</div></div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>si applicano anche ai prodotti cosmetici, ove pertinente</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1620	Domanda	Quali sono le classi di rischio dei dispositivi medici?	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>I e III</div></div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>II e III</div></div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>I, Is, Im IIa, IIb, III</div></div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>I e II</div></div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>I, Is, Im, II</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1618	Domanda	Quale attività avente la struttura indicata?	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>alfa-bloccante</div></div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>beta-bloccante</div></div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>ACE-inibitore</div></div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>antimuscarinica</div></div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>diuretica</div></div></div></div>	Risposta esatta	B



N°	1621	Domanda	Quale delle affermazioni sulla ciproheptadina, avente la struttura indicata, è corretta?		
					
			<div><div><input type="radio"/> A</div>stimola l'appetito</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>ha effetti antistaminici H2</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>è un farmaco OTC</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>si utilizza comunemente come antiemetico</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>le affermazioni precedenti sono tutte corrette tranne una</div>	Risposta esatta	A
N°	1622	Domanda	Quale classe di farmaci, tra quelle elencate, NON trova impiego nella terapia dell'asma bronchiale?		
			<div><div><input type="radio"/> A</div>antagonisti del recettore H1 istaminergico</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>agonisti del recettore beta2 adrenergico</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>cortisonici</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>antagonisti dei recettori muscarinici</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>più di una di quelle indicate</div>	Risposta esatta	A
N°	1623	Domanda	Molti sali utilizzabili come purganti salini ad azione osmotica hanno mantenuto un nome "storico" che risale all'epoca della loro prima preparazione. Qual è quello riferibile al tartrato di sodio e potassio?		
			<div><div><input type="radio"/> A</div>sale mirabile di Glauber</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>sale di Seignette</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>sale amaro</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>sale inglese</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>sale di Epsom</div>	Risposta esatta	B
N°	1624	Domanda	Quale, tra gli effetti elencati, può essere provocato da dosi elevate di barbiturici?		
			<div><div><input type="radio"/> A</div>anestesia generale</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>manifestazioni psicotiche</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>eccitazione incontrollabile</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>aggressività</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>iperattività del sistema nervoso vegetativo</div>	Risposta esatta	A

N°	1625	Domanda	Nelle psicosi maniacodepressive si usa:	<div><div><div>A</div></div><div><div>levodopa</div></div></div> <div><div>B</div></div> <div><div>teofillina</div></div>
----	------	---------	---	---

C

sali di litio

D

anfelmmina


E

stricnina



1631	N°	Domanda	L'insulina glargine rispetto all'insulina isofano NPH (Neutral Protamin Hagedorn) :	<div><div><div><div><div></div><div>ha una minore durata d'azione</div></div><div><div></div><div>ha una maggiore durata d'azione</div></div><div><div></div><div>aumenta il rischio di episodi ipoglicemici notturni</div></div><div><div></div><div>fa aumentare maggiormente il peso corporeo</div></div><div><div></div><div>non è indicata nel diabete di tipo 2</div></div></div></div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	B
1632	N°	Domanda	Un farmaco ha un ridotto indice terapeutico quando	<div><div><div><div><div></div><div>la DE50 e la DL50 hanno valori molto simili</div></div><div><div></div><div>la DL50 ha valori molto più alti della DE50</div></div><div><div></div><div>non ha alcun effetto tossico alle dosi somministrate</div></div><div><div></div><div>la DL50 ha valori inferiori alla DE50</div></div><div><div></div><div>il rapporto tra DL50 e DE50 è maggiore di 1000</div></div></div></div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	A

N°	1633	Domanda	I diuretici tiazidici sono controindicati nei pazienti che assumono Li+ in quanto	<div><div>A</div> aumentano la clearance renale di Li+</div> <div><div>B</div> modificano la distribuzione di Li+</div> <div><div>C</div> incrementano la litemia</div> <div><div>D</div> interferiscono con l'assorbimento intestinale di Li+</div> <div><div>E</div> interferiscono con il legame di Li+ alle proteine plasmatiche</div>	Risposta esatta	C
<hr/>						
N°	1634	Domanda	Gli integratori alimentari possono essere immessi in commercio a seguito di :	<div><div>A</div> autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute</div> <div><div>B</div> autorizzazione rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio</div> <div><div>C</div> notifica dell'etichetta al Ministero della Salute</div> <div><div>D</div> notifica dell'etichetta alla A.S.L. competente per territorio</div> <div><div>E</div> nessun adempimento</div>	Risposta esatta	C
<hr/>						
N°	1635	Domanda	Quale delle seguenti rappresenta una controindicazione all'uso dei bifosfonati?	<div><div>A</div> esofagite</div> <div><div>B</div> ipocalcemia</div> <div><div>C</div> diabete</div> <div><div>D</div> tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div> <div><div>E</div> tutte le indicazioni sono corrette</div>	Risposta esatta	D
<hr/>						
N°	1636	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni è corretta per i glicosidi digitali?	<div><div>A</div> hanno un elevato indice terapeutico</div> <div><div>B</div> hanno un basso indice terapeutico</div> <div><div>C</div> il rapporto tra DE50 e DL50 è molto elevato</div> <div><div>D</div> il rapporto tra DE50 e DL50 è abbastanza elevato</div> <div><div>E</div> nessuna affermazione è corretta</div>	Risposta esatta	B




N°	1637	Domanda	Un alimento in capsule contenente solo vitamine e minerali è:
A		un integratore alimentare	
B		un alimento funzionale	
C		un alimento addizionato di vitamine e minerali	
D		un alimento di uso corrente	
E		un nutraceutico	
Risposta esatta A			

N°	1639	Domanda	Il sodio cromoglicato ha la struttura indicata. Quale delle seguenti affermazioni riguarda il medicinale antiasmatico che lo contiene è errata: il principio attivo
A		viene somministrato come solido in forma di aerosol	
B		la somministrazione può provocare effetti quali sapore sgradevole ed irritazione nasale	
C		è più efficace nei soggetti giovani	
D		manifesta effetti clinici immediatamente dopo l'inizio della terapia	
E		viene assorbito con difficoltà e quindi, solo raramente, provoca effetti collaterali	
Risposta esatta D			


CC(=O)Oc1ccc(OCC2C=C(C(=O)OC)c3ccccc23)cc1

N°	1640	Domanda	La Leshmania può contagiare l'uomo?
A		sì	
B		no	
C		solo in determinate situazioni	
D		solo se associata a Filaria	
E		solo se associata a Toxoplasmosi	
Risposta esatta A			


N°	1641	Domanda	Il suffisso "setron" è tipico della classe dei farmaci:			
		<div><div>A</div>antagonisti dei recettori adrenergici beta 1</div>				
		<div><div>B</div>antagonisti dei recettori serotoninergici 5-HT3</div>				
		<div><div>C</div>antagonisti dei recettori muscarinici m1</div>				
		<div><div>D</div>antagonisti dei recettori dopaminergici D2</div>				
		<div><div>E</div>antagonisti dei recettori istaminergici H2</div>				
		Risposta esatta B				
N°	1642	Domanda	E' consentita l'importazione di medicinali non autorizzati all'immissione in commercio in Italia?			
		<div><div>A</div>no, mai</div>				
		<div><div>B</div>si è sufficiente vi sia l'autorizzazione del Ministero della Salute</div>				
		<div><div>C</div>si a condizione che il medicinale sia regolarmente autorizzato nel paese di provenienza e che l'impiego avvenga nel rispetto delle condizioni d'uso autorizzate</div>				
		<div><div>D</div>si ma solo da Paesi dell'Unione Europea</div>				
		<div><div>E</div>si, previo nulla-osta dell'A.S.L.</div>				
		Risposta esatta C				
N°	1643	Domanda	E' consentita la pubblicità delle farmacie?			
		<div><div>A</div>no, è vietata</div>				
		<div><div>B</div>si, con l'autorizzazione del Sindaco e previo nulla osta dell'Ordine dei Farmacisti</div>				
		<div><div>C</div>si, nel rispetto dei principi indicati dal codice deontologico</div>				
		<div><div>D</div>si, purché nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza</div>				
		<div><div>E</div>si, nel rispetto delle norme dettate dal regolamento sulla pubblicità adottato dalla FOI</div>				
		Risposta esatta C				
N°	1644	Domanda	La vaselina bianca è costituita da:			
		<div><div>A</div>una miscela di mono-, di- e trigliceridi semisolidi di origine naturale minerale</div>				
		<div><div>B</div>una miscela di idrocarburi semisolidi di origine naturale vegetale</div>				
		<div><div>C</div>una miscela di idrocarburi semisolidi di origine naturale minerale</div>				
		<div><div>D</div>una miscela di mono-, di- e trigliceridi semisolidi di origine naturale vegetale</div>				
		<div><div>E</div>due indicazioni sono corrette</div>				
		Risposta esatta C				



N°	1645	Domanda	La vaselina bianca si definisce come:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>una base idrosolubile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>una base emulsionante acqua</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>una miscela, purificata e decolorata, di idrocarburi ottenuti per trattamento dei residui della raffinazione del petrolio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>una base emulsionata</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>due indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1647	Domanda	L'acido 7-ACA è costituito dalla fusione di due anelli, uno è beta-lattamico, l'altro è	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>pirrolidinico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>tiazolidinico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>dilidrotiazinico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>triazinico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ossazolinico</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1648	Domanda	In un comune con una popolazione di 10.000 abitanti qual è il numero complessivo di farmacie che possono essere istituite sulla base dei diversi criteri previsti dalla legge?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>2</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>3</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>1</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>1 se privata, 2 se almeno una è pubblica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>2 se privata, 3 se almeno una è pubblica</div></div>	Risposta esatta	B



N°	1649	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti, riguardanti la cascata dell'acido arachidonico, è errata? L'azione della	<div><div>A</div>ciclossigenasi provoca la formazione di prostaglandine</div> <div><div>B</div>ciclossigenasi provoca liberazione di acido arachidonico</div> <div><div>C</div>ciclossigenasi provoca la formazione di trombossani</div> <div><div>D</div>lipossigenasi provoca la formazione di radicali dell'ossigeno</div> <div><div>E</div>lipossigenasi provoca la formazione di leucotrieni</div>	Risposta esatta	B
N°	1650	Domanda	Lo spironolattone, avente la struttura indicata, è un farmaco ad azione	<div><div>A</div>diuretica</div> <div><div>B</div>antiasmatica</div> <div><div>C</div>antivirale</div> <div><div>D</div>antiprotozoaria</div> <div><div>E</div>antibatterica</div>	Risposta esatta	A



N°	1651	Domanda	Quanti mesi dura la fase di continuazione del trattamento antitubercolare?	<div><div>A</div>2 mesi</div> <div><div>B</div>4 mesi</div> <div><div>C</div>6 mesi</div> <div><div>D</div>8 mesi</div> <div><div>E</div>10 mesi</div>	Risposta esatta	B
N°	1652	Domanda	Molti sali di calcio trovano applicazione in terapia. Tra le sequenze di sali sotto indicate qual è quella che esprime un contenuto DECRESCENTE di calcio quando si somministrano quantità equiponderali dei sali riportati?	<div><div>A</div>formiato-carbonato-glutammato</div> <div><div>B</div>carbonato-glutammato-cloruro</div> <div><div>C</div>glutammato-carbonato-formiato</div> <div><div>D</div>carbonato-formiato-glutammato</div> <div><div>E</div>bicarbonato-glutammato-carbonato</div>	Risposta esatta	D


C₉H₂CaO₄

formiato


C₁₀H₁₆CaN₂O₈

glutammato

PM = 332

CC12CCC3C(C1CC4=C(C(=C(C=C4)C(=O)OCC)C)C)C(C3)OC(=O)C


N°	1653	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti corrisponde maggiormente alla definizione di "finestra di selettività farmacologica": l'intervallo di concentrazione entro il quale il farmaco	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>presenta il massimo di attività</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>presenta un'attività intermedia tra la minima e la massima</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>presenta il minimo di attività</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>passa da un minimo ad un massimo di attività</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>non presenta gli effetti collaterali riscontrabili a dosaggi più elevati</div></div>		N°	1655	Domanda	Le proteine timeriche che legano il GTP (proteine G):	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>trasducono i segnali dei recettori di membrana</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sono necessarie per l'azione degli ormoni con recettore citosolico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>mediano l'azione dei fattori di crescita</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sono implicate nella biosintesi delle proteine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sono necessarie per il metabolismo energetico della cellula</div></div>	
				Risposta esatta	E					Risposta esatta	A
N°	1654	Domanda	Il monossido di carbonio è un inquinante ambientale prodotto principalmente dal traffico veicolare. Quali degli effetti descritti possono essere indotti da questa sostanza?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>problemi respiratori</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>problemi cardiaci e polmonari</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alterazioni visive e dei riflessi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutti quelli indicati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutti quelli indicati tranne uno</div></div>		N°	1656	Domanda	Un medicinale, oltre ai principi attivi comunemente utilizzati per la terapia dell'acidità gastrica, contiene anche diclofenac. Questo composto, avente la struttura chimica indicata, svolge azione adiuvante di natura	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antispasmodica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>anticolinergica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>parassimpaticolitica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>colagoga</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di una tra quelle indicate</div></div>	
				Risposta esatta	D					Risposta esatta	E






N°	1657	Domanda	La durata complessiva della sostituzione del titolare di farmacia per infermità NON può superare un periodo continuativo di:	<div><div><div>A</div></div><div>tre anni</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>cinque anni, ovvero di sei anni per decennio</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>due anni, ovvero di tre anni per decennio</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>diciotto mesi</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>cinque mesi</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1659	Domanda	La tossicità del clorfeniridolo nell'adulto è a carico del:	<div><div><div>A</div></div><div>S.N.C.</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>cuore</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>fegato</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>rene</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>midollo osseo</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1660	Domanda	La levodopa, avente la struttura indicata, presenta attività antiparkinson in quanto	<div><div><div>A</div></div><div>agisce come anticolinergico</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>produce un falso trasmettitore</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>blocca l'enzima triptofano decarbossilasi</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>aumenta la concentrazione di dopamina a livello centrale</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>inibisce l'enzima monoammino ossidasi</div></div>	Risposta esatta	D




N°	1661	Domanda	Il prodotto finale della glicolisi è	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1663	Domanda	I diuretici inibitori dell'andrasa carbonica sono impiegati comunemente per la cura del glaucoma in quanto	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1662	Domanda	La formulazione di preparati allestibili in multiplo in farmacia deve essere necessariamente riportata:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1664	Domanda	La tachifilassi è :	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	A




N°	1665	Domanda	Quale, tra i farmaci antimicrobici seguenti, agisce sulla parete cellulare batterica?	<div><div>A</div>tutti</div> <div><div>B</div>Teloplanina</div> <div><div>C</div>Carbapenem</div> <div><div>D</div>Cicloserina</div> <div><div>E</div>Cefalosporine</div>	Risposta esatta	A
N°	1666	Domanda	Il disulfiram, indicato nella struttura, è in grado di bloccare un particolare sistema enzimatico. Quale, tra quelli sotto elencati?	<div><div>A</div>Aldeide deidrogenasi</div> <div><div>B</div>Alcool deidrogenasi</div> <div><div>C</div>ACE</div> <div><div>D</div>Triptofano 5-idrossilasi</div> <div><div>E</div>Acetilcolinesterasi</div>	Risposta esatta	A


N°	1669	1670	1671	1672
Domanda	Le due strutture sotto riportate appartengono alla classe degli estrogeni. Esse rappresentano	La cocaina, rappresentata in struttura, ha caratteristiche	La separazione degli enantiomeri dell'ibuprofene (struttura indicata) è possibile, ma la utilizzazione come principio attivo del medicinale di uno dei due enantiomeri NON è frequente in quanto	Quale delle indicazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di [pervitaninosi]?
				
	<input type="radio"/> A due enantiomeri <input type="radio"/> B due diastereoisomeri <input type="radio"/> C due isomeri geometrici <input type="radio"/> D due diastereoisomeri <input type="radio"/> E lo stesso composto	<input type="radio"/> A acide <input type="radio"/> B basiche <input type="radio"/> C neutre <input type="radio"/> D anfotere <input type="radio"/> E di zwitterione	<input type="radio"/> A i due enantiomeri hanno la stessa attività <input type="radio"/> B la separazione dei due enantiomeri, pur essendo possibile, è molto difficile ottenere <input type="radio"/> C un enzima presente nel plasma trasforma l'isomero meno attivo R nell'isomero attivo S <input type="radio"/> D in vivo c'è una rapida racemizzazione <input type="radio"/> E i due enantiomeri sono poco stabili, se presenti come tali, nelle forme farmaceutiche	<input type="radio"/> A assenza di una o più vitamine nella dieta <input type="radio"/> B carenza di una o più vitamine nella dieta <input type="radio"/> C mancanza di assorbimento di vitamine <input type="radio"/> D apporto non bilanciato di vitamine <input type="radio"/> E conseguenza dell'eccesso di assunzione di alcune vitamine
Risposta esatta	E	B	C	E




N°	1673	Domanda	La classificazione ai fini della fornitura del medicinale onepatoo in commercio perché presenti sul mercato italiano alla data del 6/6/1995 prevede:	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>obbligo di ricetta medica ripetibile</div></div><div><div><div>B</div></div><div>obbligo di ricetta medica da rinnovare volta per volta</div></div><div><div><div>C</div></div><div>non soggetto a prescrizione medica</div></div><div><div><div>D</div></div><div>obbligo di ricetta medica specialistica</div></div><div><div><div>E</div></div><div>medicinale di automedicazione</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1675	Domanda	I diuretici osmotici sono impiegati in tutte le condizioni indicate tranne una: indicare quale	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>ipertensione endocranica</div></div><div><div><div>B</div></div><div>insufficienza cardiaca cronica</div></div><div><div><div>C</div></div><div>ipertensione endoculare</div></div><div><div><div>D</div></div><div>insufficienza renale acuta</div></div><div><div><div>E</div></div><div>ematoma subdurale traumatico</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1674	Domanda	Di cosa deve essere dotata la farmacia ove si preparino medicinali galenici iniettabili	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>di tutte le sostanze indicate nella F.U.</div></div><div><div><div>B</div></div><div>dei mezzi atti ad assicurare una accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto</div></div><div><div><div>C</div></div><div>di aghi e di siringhe</div></div><div><div><div>D</div></div><div>di specifica autorizzazione dell'A.S.L.</div></div><div><div><div>E</div></div><div>di apposito registro</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1676	Domanda	Quale dei seguenti composti può agire come "scavenger" dei radicali liberi?	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>cisteina</div></div><div><div><div>B</div></div><div>lutina</div></div><div><div><div>C</div></div><div>quercetina</div></div><div><div><div>D</div></div><div>tutti</div></div><div><div><div>E</div></div><div>nessuno</div></div></div></div>	Risposta esatta	D




N°	1677	Domanda	I farmaci "localiti" sono farmaci che	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>inibiscono la motilità dell'intestino</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>stimolano la motilità dell'intestino</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>inibiscono la motilità dell'utero</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>stimolano la motilità dell'utero</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>stimolano il rilassamento vescicale</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1678	Domanda	La morfina provoca:	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>aumento della peristalsi intestinale</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>eccitazione del centro respiratorio</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>disturbi della accomodazione (ciotopia)</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>anestesia generale</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>miiosi</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1679	Domanda	Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti che vengono aggiunti alle polveri allo scopo di far raggiungere alla compressa un peso congruo prendono il nome di "diluenti". Quale tra le sostanze sotto indicate rientra in tale categoria	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>catolino</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>mannitolo</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>agar</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>silice colloidale</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>più di una delle sostanze indicate</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1680	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi è impiegato nei confronti di Pseudomonas aeruginosa ?	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>penicillina G</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>amoxicillina</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>ticarcillina</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>flucloxacillina</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>sulbactam</div></div></div></div>	Risposta esatta	C


1681	N°	Domanda	Quale, tra i diuretici elencati, NON modifica la capacità del rene di concentrare le urine?	<input type="radio"/> A Furosemide <input type="radio"/> B Clortalidone <input type="radio"/> C Acido etacrinico <input type="radio"/> D Torasemide <input type="radio"/> E Bumetanide	Risposta esatta	B
1682	N°	Domanda	Il cloramfenicolo, avente la struttura indicata, nella terapia a lungo termine provoca come principale effetto collaterale	 <input type="radio"/> A sonnolenza <input type="radio"/> B eruzioni cutanee <input type="radio"/> C cristalluria <input type="radio"/> D reazioni di ipersensibilità <input type="radio"/> E pancitopenia	Risposta esatta	E
1683	N°	Domanda	Quale delle classi di farmaci elencate presenta effetti poglicemizzanti?	<input type="radio"/> A sulfoniluree e biguanidi <input type="radio"/> B benzodiazine <input type="radio"/> C antagonisti H2 <input type="radio"/> D Ca2+-antagonisti <input type="radio"/> E beta2-Agonisti	Risposta esatta	A
1684	N°	Domanda	I sali di litio vengono utilizzati	<input type="radio"/> A in nessuna delle patologie indicate <input type="radio"/> B nella terapia del morbo di Alzheimer <input type="radio"/> C nella terapia delle sindromi maniacali e nella depressione bipolare <input type="radio"/> D nella terapia antiepilettica <input type="radio"/> E nel trattamento dell'ipertensione	Risposta esatta	C

N°	1685	Domanda	I sartani agiscono come antipertensivi in quanto sono:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>antagonisti del recettore AT1 dell'angiotensina II</div><div>agonisti del recettore AT1 dell'angiotensina II</div><div>antagonisti del recettore AT2 dell'angiotensina II</div><div>attivatori della conversione di angiotensina I in angiotensina II</div><div>inibitori della conversione di angiotensina I in angiotensina II</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1687	Domanda	Gli analoghi del GnRH (Gonadotroph-Releasing Hormon) (leuporelin, goserelin, triptorelin, buserelin) si somministrano in genere per via:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>intramuscolare o sottocutanea</div><div>endovenosa</div><div>orale</div><div>orale in compresse gastroresistenti</div><div>endoarteriosa</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1686	Domanda	Oltre che nell'ipertensione arteriosa gli ACE-inibitori sono indicati:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>nella cardiopatia ischemica e nello scompenso cardiaco congestizio cronico</div><div>nella cardiopatia ischemica ma non nello scompenso cardiaco congestizio cronico</div><div>nello scompenso cardiaco congestizio cronico ma non nella cardiopatia ischemica</div><div>nella tosse secca persistente</div><div>in nessuna delle precedenti patologie</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1688	Domanda	Quale dei seguenti sali fornirà più verosimilmente una soluzione acquosa con un pH inferiore a 7 ?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>solfato di magnesio</div><div>morfina cloridrato</div><div>penicillina sale di potassio</div><div>cloruro di potassio</div><div>salicilato di sodio</div></div>	Risposta esatta	B




N°	1689	Domanda	Modifiche della Acetilcolina hanno portato a farmaci come		N°	1691	Domanda	In un prodotto cosmetico è ammesso l'uso di glucocorticoidi?		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>atropina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>no, perché presenti nell'elenco delle sostanze non ammesse</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>betanecolo</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>si, se il contenuto è inferiore allo 0,2%</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>pilocarpina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>si, se non produce effetti sistemici.</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>muscarina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>si, sempre</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>L-DOPA</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>più di una indicazione è corretta</div>		
				Risposta esatta	B				Risposta esatta	A

N°	1690	Domanda	I Tweens sono esteri di sorbitani, aventi la struttura indicata, dove uno o più gruppi R1, R2 ed R3 corrispondono a residui poliossietilici e R a residui acilici di diversa natura. I Tween sono individuabili con un numero che varia al variare di R. Quale delle combinazioni seguenti è corretta?		N°	1692	Domanda	La distruzione degli stupefacenti scaduti deve essere sempre effettuata dall'A.S.L. di appartenenza della farmacia?		
								<div><div><input type="checkbox"/> A</div>si, sempre</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>acido laurico - Tween 40</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>dipende dalle direttive di ciascuna A.S.L.</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>acido oleico - Tween 80</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>può essere effettuata anche da una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>acido stearico - Tween 85</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>dipende dal quantitativo di medicinali da distruggere</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>acido palmitico - Tween 65</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>dipende dalle direttive emanate dal Comando dei N.A.S.</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuna di quelle indicate</div>						Risposta esatta	C
				Risposta esatta	B					







N°	1693	Domanda	Quali è la via di somministrazione impiegata per le sulfaniluree (I) e le biguanidi (II)?
			<div><div><div><div><div><div>O</div><div>S</div><div>O</div></div><div><div>C=O</div><div>N</div><div>H</div></div></div><div><div>R</div><div>c1ccc(cc1)N(C(=O)N)C(N)=O</div></div></div><div>(I)</div><div><div><div>H</div><div>H</div><div>NH₂</div></div><div><div>R</div><div>N</div><div>NH</div></div><div><div>NH</div><div>NH</div><div>NH</div></div></div><div>(II)</div></div></div>
			<div><div><div>A</div><div>Intramuscolare</div></div><div><div>B</div><div>orale</div></div><div><div>C</div><div>endovenosa</div></div><div><div>D</div><div>slinguale</div></div><div><div>E</div><div>sottocutanea</div></div></div>
			Risposta esatta B
N°	1694	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti è errata: i sistemi enzimatici deputati al metabolismo dei farmaci sono localizzati
			<div><div><div>A</div><div>nell'epitelo gastrintestinale</div></div><div><div>B</div><div>nel fegato</div></div><div><div>C</div><div>nel rene</div></div><div><div>D</div><div>nel tessuto adiposo</div></div><div><div>E</div><div>nel polmone</div></div></div>
			Risposta esatta D
N°	1695	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti, riguardanti le sostanze utilizzate per impedire la crescita di muffe nelle preparazioni acquose farmaceutiche, è corretta?
			<div><div><div>A</div><div>molti composti aventi tale attività appartengono alla classe dei tensioattivi anionici</div></div><div><div>B</div><div>molti composti (strutture indicate a lato) aventi tale attività si usano in miscela tra loro</div></div><div><div>C</div><div>molti composti aventi tale attività appartengono alla classe degli acidi grassi Insaturi</div></div><div><div>D</div><div>molti composti aventi tale attività sono costituiti da eleri elicili dell'acido alginico</div></div><div><div>E</div><div>nessuna delle affermazioni riportate è corretta</div></div></div> <div><div><div><div><div><div>OH</div><div>c1ccc(cc1)C(=O)OC(R)CC(C)(C)C</div></div><div>R = -(CH₂)_n-CH₃ n = 0-3</div></div></div></div></div>
			Risposta esatta B
N°	1696	Domanda	In un prodotto cosmetico deve essere indicata sulla confezione la durata minima?
			<div><div><div>A</div><div>si, sempre</div></div><div><div>B</div><div>no, mai</div></div><div><div>C</div><div>no, per i prodotti che abbiano una durata minima superiore ai 30 mesi</div></div><div><div>D</div><div>no, eccetto i dentifrici</div></div><div><div>E</div><div>no, eccetto per i prodotti che sono destinati a venire a contatto con le mucose</div></div></div>
			Risposta esatta C



N°	1697	Domanda Quale dei seguenti agenti è un antagonista selettivo della serotonina e previene la nausea e il vomito provocato da trattamenti chemioterapici	<input type="radio"/> A sumatriptan <input type="radio"/> B sertralina <input type="radio"/> C promazina <input type="radio"/> D ondansetron <input type="radio"/> E simvastatina	Risposta esatta D
<hr/>				
N°	1698	Domanda La levodopa è un farmaco utilizzato nella terapia:	<input type="radio"/> A del morbo di Parkinson <input type="radio"/> B della schizofrenia <input type="radio"/> C del morbo di Alzheimer <input type="radio"/> D della depressione <input type="radio"/> E dell'ipertensione	Risposta esatta A
N°	1699	Domanda Quale tra le sostanze elencate è responsabile delle interazioni farmacologiche dell'iperico (<i>Hypericum perforatum</i> L.)	<input type="radio"/> A kaempferolo <input type="radio"/> B iperforina <input type="radio"/> C quercetina <input type="radio"/> D luteina <input type="radio"/> E tutte le indicazioni tranne una sono corrette	Risposta esatta E
N°	1700	Domanda La simvastatina induce una diminuzione dei livelli di colesterolo plasmatico in quanto	<div style="text-align: center;">  </div> <input type="radio"/> A è un inibitore della sintesi endogena del colesterolo <input type="radio"/> B lega gli acidi biliari presenti nel lume intestinale <input type="radio"/> C aumenta il catabolismo delle HDL <input type="radio"/> D aumenta la sintesi di VLDL <input type="radio"/> E aumenta la sintesi di lipasi lipoproteica	Risposta esatta A

N°	1701	Domanda	I maggiori effetti collaterali della colestiramina e dei farmaci della classe a cui appartiene sono	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>insonnia, cefalee</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>affaticamento, epatiti reversibili</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>aumento degli enzimi epatici, miagia, cefalea</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>ulcera duodenale, vomito</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>disturbi gastrointestinali, ridotto assorbimento di farmaci e vitamine liposolubili</div></div></div></div></div></div>	N°	1703	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il prefisso "sulfu" nella Denominazione Comune?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>Diuretici</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>Solfonammidi ad azione antimicrobica</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>Tobarbiturici</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>Sulfoniluree</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>Ipoipicizzanti solfonammidici</div></div></div></div></div></div>	N°	1702	Domanda	Al fini della qualità di una preparazione galenica magistrale costituiscono parametri critici:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>la definizione delle procedure tecniche di preparazione</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>la corretta gestione della documentazione cartacea prevista dalle Norme di Buona Preparazione</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>la definizione di protocolli di pulizia della strumentazione, dei locali e del piano di lavoro da eseguire prima e dopo le operazioni di preparazione</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>più di una indicazione è corretta</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div></div></div></div>	N°	1704	Domanda	L'acidificazione dell' urina favorisce l'eliminazione dei farmaci a carattere basico perché:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>ne diminuisce la ionizzazione</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>ne aumenta la ionizzazione</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>ne aumenta la lipofilia</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>ne aumenta la secrezione tubulare attiva</div></div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>ne diminuisce il riassorbimento tubulare attivo</div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	E	Risposta esatta	B
----	------	---------	---	---	----	------	---------	--	---	----	------	---------	--	--	----	------	---------	--	---	-----------------	---	-----------------	---

N°	1705	Domanda	Il labetalolo ha la struttura indicata. Esso contiene nella catena		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>tre centri chirali (CHOH, NH, CHCH₃)</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>due centri chirali (CHOH, NH)</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>due centri chirali (CHOH, CHCH₃)</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>un solo centro chirale (CHCH₃)</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>un solo centro chirale (NH)</div>	Risposta esatta	C
N°	1706	Domanda	La trinitroglicerina, avente la struttura indicata, è usata nel trattamento dell'angina pectoris. La sua attività è dovuta al fatto che nell'organismo libera		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>ossido di carbonio</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>monossido d'azoto</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>glicerina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>aldeide acetica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>acido glicerico</div>	Risposta esatta	B
N°	1707	Domanda	La colchicina è un		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antinfiammatorio efficace soltanto contro l'artrite gotosa</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>antinfiammatorio efficace soltanto contro l'artrite reumatoide</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>analgesico e antipiretico</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>alcaloide che aumenta l'attività motoria dell'utero</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>analogo dell'ipoxantina che inibisce la biosintesi dell'acido urico</div>	Risposta esatta	A
N°	1708	Domanda	Le benzodiazepine agiscono sulla trasmissione		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>colinergica</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>GABA-ergica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>dopaminergica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>serotoninergica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>noradrenergica</div>	Risposta esatta	B




N°	1709	Domanda Gli analoghi del GnRH (Gonadotroph-Releasing Hormon) (leuprorelin, goserelin, triptorelin, buserelin) sono:		N°	1711	Domanda Possono essere commercializzati i prodotti cosmetici che vantano in etichetta proprietà terapeutiche?	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div> antagonisti non competitivi sul recettore del GnRH</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> antagonisti competitivi sul recettore del GnRH</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> agonisti che causano desensibilizzazione del recettore del GnRH a livello ipofisario</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> agonisti che causano ipersensibilizzazione dei recettori del GnRH a livello gonadico</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> antagonisti che causano ipersensibilizzazione dei recettori del GnRH a livello ipofisario</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div> sì</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> no, in quanto tale commercializzazione costituisce un illecito amministrativo</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> no, in quanto tale commercializzazione costituisce un illecito penale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> sì, ma solo in farmacia</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> sì, soltanto quando siano stati registrati dal Ministero della Salute come aventi tali proprietà</div>	
			Risposta esatta C				Risposta esatta C
N°	1710	Domanda La pericolosità di un farmaco durante l'allattamento è determinata da:		N°	1712	Domanda Un farmaco acido ha un $pK_a = 5$. Quando esso entra in una cellula dove il valore numerico del pH è identico rispetto a quello del fluido extracellulare, la concentrazione della forma non ionizzata	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div> concentrazione di farmaco nel latte</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> concentrazione di metaboliti attivi nel latte</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> farmacocinetica del farmaco nel lattante</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> farmacodinamica del farmaco nel lattante</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> tutte le indicazioni sono corrette</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div> si dimezza rispetto a quella presente nel fluido extracellulare</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> aumenta rispetto a quella presente nel fluido extracellulare</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> si raddoppia rispetto a quella presente nel fluido extracellulare</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> nessuna delle indicazioni fornite è corretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> non cambia rispetto a quella presente nel fluido extracellulare</div>	
			Risposta esatta E				Risposta esatta E




N°	1713	Domanda	I bersagli molecolari di un farmaco sono costituiti da:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>enzimi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>recettori di membrana</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>canali ionici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono errate</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1715	Domanda	L'introduzione di un metile nella posizione 17alfa del testosterone rappresentato dalla struttura	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>elimina l'effetto androgeno per lasciare solo quello anabolizzante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>riduce la tossicità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>lo rende somministrabile per via orale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>stabilizza il legame con le proteine plasmatiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>aumenta l'attività ormonale</div></div>	Risposta esatta	C

CC12CCC3=C1C(=C(C=C3)O)CCC4=CC(=O)CC[C@]42C

N°	1714	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sulle Tinture Madri (TM) è ERRATA:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>sono sempre ottenute da droga secca</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la loro concentrazione è di 1 parte di droga, calcolata disidratata, in 10 parti di TM</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si ottengono da materie prime animali, vegetali e minerali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>contengono concentrazioni ponderali di droga di partenza</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>hanno grado alcolico di 45° - 65°</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1716	Domanda	Il concetto di enantioselettività è legato al fatto che un enantiomero	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è più attivo dell'altro</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>presenta maggiore affinità recettoriale dell'altro</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>da una migliore interazione con il bersaglio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	D





N°	1717	Domanda I farmaci la cui denominazione comune ha come suffisso "ac" appartengono ad una medesima classe di composti aventi una funzione carbossilica. Indicare quale classe di acidi tra quelli sotto indicati possiede il suffisso "ac"	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>antiossiacetici</div><div>antiacetici</div><div>beta-antipropionici</div><div>antiossacetici</div><div>alfa-antipropionici</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1719	Domanda Quale delle seguenti azioni metaboliche delle ammine simpaticomimetiche viene antagonizzata, almeno in parte, dai farmaci beta-antagonisti:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>glicogenolisi</div><div>lipolisi</div><div>ipokaliemia</div><div>liberazione di insulina dal pancreas endocrino</div><div>tutte quelle indicate</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1720	Domanda La preparazione dei cosmetici in farmacia prevede	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>un'autorizzazione ministeriale preventiva</div><div>una comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione competente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'attività</div><div>la nomina di un direttore tecnico e la comunicazione scritta dell'inizio dell'attività al Ministero della Salute e alla Regione competente</div><div>la possibilità di condividere gli stessi locali destinati al laboratorio galenico</div><div>la comunicazione alla sola A.S.L. di competenza</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1718	Domanda Innanzi a quale autorità può essere promosso ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio direttivo dell'Ordine dei Farmacisti?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>al Prefetto</div><div>al Procuratore della Repubblica</div><div>al Ministro della Salute</div><div>alla F.O.F.I.</div><div>alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie</div></div></div>	Risposta esatta	E




N°	1721	Domanda	La vincristina, alcaloide dotato di attività antineoplastica, esplica il suo effetto mediante:			
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>intercalazione tra due paia adiacenti di basi di guanina-citosina del DNA</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>induzione di una topoisomerasi Il che provoca rottura del DNA</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>inibizione della polimerizzazione della tubulina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>inibizione della diidrolfolico reduttasi con blocco della sintesi di tetraidrofolato</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>alchilazione di componenti del DNA</div>			
					Risposta esatta	C

N°	1722	Domanda	Le preparazioni oncopatiche usano spesso come prodotti di partenza le tinture madri che possono essere di origine vegetale o animale. Quale delle affermazioni seguenti è corretta: il rapporto in peso tra la tintura madre di origine vegetale rispetto a quella animale è pari a			
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>20</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>2</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>0,2</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>200</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>0,02</div>			
					Risposta esatta	B


N°	1724	Domanda	Caffeina, teofillina e teobromina sono inibitori delle fosfodiesterasi e corrispondono alle strutture xantiche indicate con (1), (2) e (3) rispettivamente. Quale di questi composti NON riesce a salificare un composto basico quale l'etilendiammina?			
		<div><div></div><div><div>(1) $R^1 = R^2 = R^3 = CH_3$</div><div>(2) $R^1 = R^2 = CH_3, R^3 = H$</div><div>(3) $R^1 = H, R^2 = R^3 = CH_3$</div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>il composto (1)</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>il composto (2)</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>il composto (3)</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>i composti (1) e (2)</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>i composti (2) e (3)</div>			
					Risposta esatta	A




N°	1725	Domanda Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti che vengono aggiunti alle polveri allo scopo di evitare l'adesione ai punzoni ed alle matrici dei macchinari industriali vengono indicati come	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>leganti</div><div>disintegranti</div><div>lubrificanti</div><div>glidanti</div><div>diluenti</div></div>	Risposta esatta C
N°	1727	Domanda Gli organofosforici provocano diarrea. Quale dei seguenti meccanismi ne è responsabile?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>stimolazione diretta della muscolatura liscia intestinale</div><div>diminuzione dell'assorbimento intestinale di acqua e sali</div><div>inibizione dell'acetilcolinesterasi</div><div>aumento delle secrezioni intestinali di acqua e sali</div><div>attivazione dell'acetilcolinesterasi</div></div>	Risposta esatta C
N°	1726	Domanda L'allergia ai farmaci è una reazione avversa	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>derivata da precedenti sensibilizzazioni al farmaco</div><div>imputabile a fattori diversi da quelli elencati</div><div>non mediata dal sistema immunitario</div><div>che si manifesta immediatamente dopo la prima somministrazione del farmaco</div><div>legata esclusivamente alla somministrazione di antibiotici</div></div>	Risposta esatta A
N°	1728	Domanda Il prezzo dei medicinali SOP e OTC deve essere uguale tra tutte le farmacie?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>sì, nell'ambito del comune</div><div>sì, se hanno raggiunto un accordo in tal senso i titolari delle farmacie</div><div>sì, le farmacie devono praticare il prezzo univoco stabilito dall'AlFA, salvo lo sconto fino al 20% che ritengono di praticare ai clienti</div><div>no, sono obbligate a praticare uno sconto fino al 20%</div><div>no, in quanto il prezzo è liberamente stabilito dalla farmacia</div></div>	Risposta esatta E




N°	1729	Domanda	Le bilance per neonati possono essere vendute in farmacia?	<div><div>A</div>no</div> <div><div>B</div>si, purché la bilancia sia stata omologata dal Ministero della Salute</div> <div><div>C</div>si, purché il farmacista sia in possesso dell'autorizzazione dell'A.S.L.</div> <div><div>D</div>si, purché il farmacista sia in possesso dell'autorizzazione comunale al commercio</div> <div><div>E</div>si, sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia</div>	Risposta esatta	C
N°	1731	Domanda	Il blocco dei recettori α_1 adrenergici delle strutture oculari provoca:	<div><div>A</div>spasmo dell'accomodazione</div> <div><div>B</div>miosi</div> <div><div>C</div>cicloplegia</div> <div><div>D</div>miosi</div> <div><div>E</div>cicloplegia e miotisi</div>	Risposta esatta	D
N°	1730	Domanda	Somministrato per via parenterale il mannitolo agisce richiamando acqua dal compartimento intracellulare a quello extracellulare. Somministrato per via orale esso provoca	<div><div>A</div>espansione del volume del liquido extracellulare e iponatriemia</div> <div><div>B</div>aumento della diuresi con disidratazione e ipernatriemia</div> <div><div>C</div>diarrea e disidratazione</div> <div><div>D</div>peggioramento dello scompenso cardiaco congestizio</div> <div><div>E</div>edema polmonare</div>	Risposta esatta	C
N°	1732	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il prefisso "cef" nella Denominazione Comune?	<div><div>A</div>antraciline</div> <div><div>B</div>derivati dell'acido 6-aminopenicillanico</div> <div><div>C</div>antibatterici correlati all'acido nalidissico</div> <div><div>D</div>derivati dell'acido 7-aminocefalosporanico</div> <div><div>E</div>a nessuna di quelle indicate</div>	Risposta esatta	D




N°	1733	Domanda Quale dei meccanismi elencati è responsabile dell'interazione tra Iperico (<i>Hypericum perforatum</i> L.) e cidoespina?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>induzione degli enzimi microsomiali epatici (citocromo P-450)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>inibizione delle monamminossidasi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>inibizione degli enzimi microsomiali epatici (Citocromo P-450)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>formazione di complessi insolubili</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div></div>	N°	1735	Domanda Per un bambino di età inferiore ai 6 anni è consigliabile l'utilizzo di un dentifricio contenente dallo 0,1% al 0,5% di fluoro espresso in fluoruro?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sì</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sì, ma solo nel caso di non assunzione contemporanea di fluoruri da altre fonti.</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1734	Domanda Estratti di serenoa (frutto di <i>Serenoa repens</i> Small.) vengono utilizzati nel trattamento dell'iperplasia prostatica benigna. Quale dei seguenti meccanismi si ritiene coinvolto nell'effetto terapeutico?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>blocco dei recettori alfa-adrenergici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>inibizione della 5alfa-reduttasi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>inibizione della cidossigenasi e della lipossigenasi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>azione antiproliferativa</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutti i meccanismi indicati</div></div></div></div>	N°	1736	Domanda La qualità microbiologica delle preparazioni galeniche magistrali semisolide non sterili costituisce un requisito particolarmente critico:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>per unguenti idrosolubili a base di miscele di macrogol</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>per preparazioni a veicolo emulsionato</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>per unguenti a base di eccipienti lipofili</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>per preparazioni a base di qualunque miscela di eccipienti</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>è in ogni caso trascurabile per preparazioni semisolide per applicazione cutanea</div></div></div></div>	Risposta esatta	B



N°	1737	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni è corretta? L'alcalinizzazione delle urine con bicarbonato di sodio	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>aumenta la velocità di eliminazione dei farmaci basici</div><div>aumenta la velocità di eliminazione dei farmaci acidi</div><div>aumenta la velocità di eliminazione di tutti i farmaci</div><div>facilita il riassorbimento dell'acqua</div><div>non ha alcuna influenza sulla composizione delle urine</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1739	Domanda	A quale classe di farmaci, tra quelle riportate, appartiene la Lorazadina, rappresentata in struttura?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>nootropici</div><div>antistaminici</div><div>anticonvulsivanti</div><div>antimalarici</div><div>antimicrobici</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1740	Domanda	Quale dei seguenti effetti indesiderati NON è tipico degli antibiotici aminoglicosidi?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>nefrotossicità</div><div>neurotossicità</div><div>ototossicità (danno cocleare)</div><div>ototossicità (danno vestibolare)</div><div>epatotossicità</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1738	Domanda	La tossina botulinica interferisce con la trasmissione	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>noradrenergica</div><div>colinergica</div><div>dopaminergica</div><div>peptidergica</div><div>GABA-ergica</div></div>	Risposta esatta	B




N°	1741	Domanda Tra le caratteristiche chimiche e/o chimico-fisiche sotto riportate quale è quella che si dovrebbe più frequentemente riscontrare per le molecole dei farmaci classificabili come anestetici generali	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>analogia strutturale</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>elevato coefficiente di ripartizione olio-acqua</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alto peso molecolare</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>basso coefficiente di ripartizione acqua-olio</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di una delle indicazioni fornite è corretta</div></div></div></div>	N°	1743	Domanda Gli effetti avversi più pericolosi della cocaina interessano:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>l'apparato riproduttivo</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>l'apparato gastrointestinale</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>la cute</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>l'apparato cardiovascolare</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>la funzionalità renale</div></div></div></div>	Risposta esatta	E	Risposta esatta	D
N°	1742	Domanda Tra i nuovi servizi che le farmacie potranno erogare nell'ambito del SSN in base al DLgs 153/2009, è prevista l'effettuazione di iniezioni da parte del farmacista?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si, ma solo se ha seguito un apposito corso di formazione professionale</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, purché coadiuvato da un infermiere</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>no</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>solo nelle farmacie rurali sussidiate</div></div></div></div>	N°	1744	Domanda A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "onide" nella Denominazione Comune	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>derivati del 5-nitrofurano</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antibiotici derivati dal 6-APA</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>steroidi con gruppi acetilici per uso topico</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>diuretici tiazidici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>diuretici steroidici</div></div></div></div>	Risposta esatta	D	Risposta esatta	C



N°	1745	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sul baclofene, avente la struttura indicata, è ERRATA?
		 <chem>N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O</chem>	
		<div><div>A</div>e' strutturalmente correlato all'acido g-aminobutirrico</div> <div><div>B</div>ha azione stimolante in quanto analogo dell'amfetamina</div> <div><div>C</div>e' un miorilassante ad azione centrale</div> <div><div>D</div>agisce come agonista sul recettore di tipo B del GABA</div> <div><div>E</div>presenta un pronunciato effetto sedativo</div>	Risposta esatta B
N°	1746	Domanda	Due soluzioni acquose del medesimo sale presentano lo stesso punto di ebollizione. In base a questa constatazione si può affermare che la prima soluzione rispetto alla seconda risulta essere
		<div><div>A</div>isomodica</div> <div><div>B</div>isolonica</div> <div><div>C</div>con identica concentrazione molale</div> <div><div>D</div>corrispondente a nessuna delle indicazioni riportate</div> <div><div>E</div>corrispondente a tutte le indicazioni riportate</div>	Risposta esatta E
N°	1747	Domanda	Il disulfiram si impiega per ridurre l'assunzione di
		<div><div>A</div>eroina</div> <div><div>B</div>cocaína</div> <div><div>C</div>etanolo</div> <div><div>D</div>benzodiazepine</div> <div><div>E</div>marijuana</div>	Risposta esatta C
N°	1748	Domanda	Quale delle seguenti azioni è propria delle mucilagini?
		<div><div>A</div>lassativa</div> <div><div>B</div>diuretica</div> <div><div>C</div>espettorante</div> <div><div>D</div>eupeptica</div> <div><div>E</div>più di una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta A

N°	1749	Domanda	L'attività inibitrice del diazepam è legata a un'azione sulla trasmissione:		N°	1751	Domanda	A parità di dosaggio, quale benzodiazepina, tra quelle riportate, è più indicata come ipnotico?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>GABA-ergica</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>diazepam</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>glutammatergica</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>bronzepam</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>muscarinica</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>triazolam</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>nicotinic</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>alprazolam</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>glicinergica</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>clordiazepossido</div>	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	C

N°	1750	Domanda	Le reazioni avverse di tipo B:		N°	1752	Domanda	I farmaci ganglioplegici determinano:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>vergono individuate soprattutto nel corso della sperimentazione clinica</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>ipertensione posturale</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>sono dose-dipendenti</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>aumento della sudorazione</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>sono frequenti</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>sciagore</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>hanno un meccanismo patogenetico incerto</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>aumento della secrezione lacrimale</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>sono riproducibili sperimentalmente</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>depressione</div>	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	A





N°	1753	<div>Domanda</div> <div>I due farmaci A e B mostrano le curve dose-effetto in figura. Quale delle affermazioni sotto elencate è corretta: il farmaco A rispetto al farmaco B</div>	<div><div><div><div>Farmaco A</div><div>Farmaco B</div></div><div>Log dose</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ha la stessa potenza e la stessa efficacia</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ha la stessa potenza e diversa efficacia</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ha la stessa efficacia e diversa potenza</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>provoca lo stesso effetto solo quando è a concentrazioni più elevate rispetto a B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ha diversa efficacia e diversa potenza</div></div></div></div>	<div>Risposta esatta</div> <div>E</div>	N°	1755	<div>Domanda</div> <div>Chi autorizza la produzione di gas medicinali?</div>	<div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>non è necessaria alcuna autorizzazione</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la Regione o la Provincia Autonoma</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>l'AIFA</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la A.S.L.</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>il Sindaco, previa nulla osta dei Vigili del Fuoco</div></div></div>
----	------	--	---	---	----	------	--	---



N°	1757	Domanda	L'EPO è un	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>polisaccaride</div><div>acido nucleico</div><div>acido grasso</div><div>glicopeptide</div><div>lipopeptide</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1759	Domanda	Gli antipertensivi ad azione centrale devono la loro azione a	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>antagonismo dei recettori muscarinici</div><div>stimolo dei recettori beta adrenergici</div><div>stimolo dei recettori alfa1</div><div>stimolo dei recettori alfa2 presinaptici</div><div>inibizione della trasmissione glutammatergica</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1758	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi NON dovrebbe essere somministrato a pazienti asmatici	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>atropina</div><div>solalolo</div><div>adrenalina</div><div>noradrenalina</div><div>ipatropio bromuro</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1760	Domanda	I vaccini ricombinanti	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>richiedono l'impiego di un adiuvante</div><div>non richiedono l'impiego di un adiuvante</div><div>sono costituiti da un polisaccaride legato ad una proteina trasportatrice</div><div>sono privi di tossicità</div><div>provocano frequentemente fenomeni di sensibilizzazione</div></div>	Risposta esatta	A

N°	1761	Domanda	Quale tra le seguenti patologie si può considerare una zoonosi emergente?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div>leishmaniosi filiasi rickettsiosi toxoplasmosi malaria</div>	Risposta esatta	A
N°	1762	Domanda	Quando la farmacia presta servizio di turno, sono dovuti i diritti addizionali previsti dalla "Tariffa nazionale dei medicinali" per la dispensazione di medicinali durante le ore di chiusura diurna?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div>no, mai si, sempre si, ma solo per le farmacie rurali sussidiate si, tranne che per le ricette dichiarate urgenti dal medico no, sono dovuti solo per le preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia</div>	Risposta esatta	B
N°	1763	Domanda	Il valore di HLB può essere valutato con formule empiriche del tipo di quella sotto riportata, dove E rappresenta la % del peso molecolare della porzione idrofila rispetto al peso molecolare dell'emulsionante in toto. Quale delle affermazioni riguardanti la formula indicata è corretta	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div>a parità di numero di funzioni esteree, E diminuisce al diminuire del PM dell'acido e diminuisce con l'aumento del numero delle funzioni esteree e diminuisce all'aumentare del PM della porzione idrofila i valori di HLB aumentano all'aumentare del PM della porzione lipofila della molecola le affermazioni sono tutte corrette</div> <div>$HLB = \frac{E}{S}$</div>	Risposta esatta	B
N°	1764	Domanda	I farmaci bloccanti dei recettori alfa1 adrenergici provocano ipotensione posturale in quanto	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div>diminuiscono il tono dei vasi di resistenza aumentano il tono venoso diminuiscono il tono dei vasi di capacità determinano tachicardia riflessa diminuiscono il postcarico</div>	Risposta esatta	C




N°	1765	Domanda La deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo tenuto dall'Ordine dei Farmacisti, è impugnabile?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>no</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>si, ma solo innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>si, ma solo innanzi al Ministero della Salute</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>si, ma solo innanzi al Prefetto</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>si, ma solo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale</div>	Risposta esatta B	
N°	1767	Domanda La capacità di un farmaco di sopprimere le manifestazioni della sindrome da astinenza da un altro farmaco e di mantenere lo stato di dipendenza viene definita come	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antagonismo competitivo</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>tolleranza fisica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>farmacodipendenza</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>dipendenza crociata</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>antagonismo parziale</div>	Risposta esatta D	
N°	1768	Domanda Il propranololo, avente la struttura indicata, presenta attività:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>beta-bloccante non selettiva</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>miorellassante</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>antipsicotica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>antiasmatica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>solo due indicazioni sono corrette</div>	Risposta esatta A	<div></div>




N°	1769	Domanda	Quale dei seguenti acidi, aventi i valori di pKa indicati, presenta il più elevato grado di ionizzazione quando si trova in soluzione acquosa a parità di concentrazione?	N°	1771	Domanda	Sull'etichetta di alcune preparazioni galeniche sono stati riportati i prezzi sotto indicati. In quale caso la tariffazione è errata
		<div><div>A</div>Benzilpenicillina (pKa = 2,8)</div>				<div><div>A</div>€ 5,91</div>	
		<div><div>B</div>Aspirina (pKa = 3,5)</div>				<div><div>B</div>€ 8,71</div>	
		<div><div>C</div>Indometacina (pKa = 4,5)</div>				<div><div>C</div>€ 11,21</div>	
		<div><div>D</div>Ibuprofen (pKa = 5,2)</div>				<div><div>D</div>€ 6,20</div>	
		<div><div>E</div>Fenobarbita (pKa = 7,4)</div>				<div><div>E</div>€ 7,749</div>	
			Risposta esatta A				Risposta esatta E

N°	1770	Domanda	Quale delle seguenti sostanze NON ha proprietà antiossidanti?	N°	1772	Domanda	Per valutare l'indice di rotazione di un magazzino di farmacia, i parametri che possono incidere sono:
		<div><div>A</div>acido benzoico</div>				<div><div>A</div>la stagionalità dei prodotti</div>	
		<div><div>B</div>3-tert-butil-4-nitossifenolo</div>				<div><div>B</div>la convenienza del costo di acquisto</div>	
		<div><div>C</div>acido ascorbico</div>				<div><div>C</div>la possibilità di effettuare scorte preventive</div>	
		<div><div>D</div>α-tocoferolo</div>				<div><div>D</div>più di una indicazione è corretta</div>	
		<div><div>E</div>gallato di etile</div>				<div><div>E</div>nessuna indicazione è corretta</div>	
			Risposta esatta A				Risposta esatta D






N°	1773	Domanda	Può essere effettuata da parte degli informatori scientifici pubblicità presso i farmacisti di medicinali vendibili solo su presentazione di ricetta medica?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si, senza particolari limitazioni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no, a meno che non si tratti di farmacisti ospedalieri</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, solo per le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, ad eccezione degli stupefacenti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>no, senza autorizzazione ministeriale</div></div>		Risposta esatta	C
N°	1774	Domanda	In quale dei casi seguenti si devono utilizzare particolari cautele nella somministrazione di oppioidi?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>attacchi di asma</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>trauma cranico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>enfisema</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutti quelli indicati meno uno</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutti quelli indicati</div></div>		Risposta esatta	E


N°	1775	Domanda	I principi attivi aventi struttura analoga a quella rappresentata potrebbero essere utilizzati come	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antibatterici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>anestetici locali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>anticoagulant</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>decongestionanti nasali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>stimolanti della crescita dei capelli</div></div>	<div><chem>NCC1CCN(C1)c2cc(F)c3c(c2)c(=O)c(O)c3n4C5CC6C(C5)CCN(C6)CC4</chem></div>	Risposta esatta	A
N°	1776	Domanda	Quanto tempo devono essere conservate le copie delle ricette ripetibili magistrali, escluse le ricette contenenti sostanze stupefacenti o dopanti?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>non vanno conservate</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>30 giorni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>un anno</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>due mesi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sei mesi</div></div>		Risposta esatta	E



N°	1777	Domanda	Gli isomeri configurazionali di tipo "geometrico"	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>occupano livelli energetici diversi separati tra loro da barriere energetiche molto elevate</div><div>non posseggono elementi di simmetria</div><div>possono modificare la loro disposizione spaziale per favorire l'interazione con il recettore</div><div>presentano attività ottica</div><div>hanno di norma la medesima attività biologica</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1779	Domanda	Secondo la F.U. in un cerotto transdermico composto da un serbatoio semisolido un lato del quale è costituito da una membrana, il rilascio e la diffusione dei principi attivi alla pelle può essere regolata:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>dalle caratteristiche della membrana</div><div>dalla capacità del serbatoio</div><div>dalla composizione del serbatoio</div><div>dall'altezza del serbatoio</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1778	Domanda	I farmaci possono essere somministrati attraverso molteplici vie. Quale, tra quelle sotto indicate, evita il cosiddetto "metabolismo di primo passaggio"?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>orale</div><div>sublinguale</div><div>transdermica</div><div>vaginale</div><div>tutte quelle indicate, tranne una</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1780	Domanda	Come si può configurare il resto di comparaggio da parte del farmacista:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>vendita di medicinali a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta</div><div>vendita di preparazioni con stupefacenti oltre il termine temporale prescritto dalla ricetta</div><div>ricevere denaro o altra utilità al fine di agevolare la vendita di determinati medicinali</div><div>esercizio abusivo della professione</div><div>violazione del segreto professionale</div></div></div>	Risposta esatta	C




N°	1781	Domanda	La metoclopramide ha la struttura indicata. Quale delle affermazioni sottoriportate è errata : la metoclopramide	N°	1783	Domanda	I fluorochinoloni inibiscono
		<div><div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è un farmaco avente caratteristiche basiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è contenuta in associazione nei medicinali per le terapie dell'acidità gastrica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>presenta effetti centrali di tipo neurolettico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la sua struttura è correlabile a quella dei butirofenoni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ha attività antiemetica</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>la DNA girasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la RNA polimerasi DNA dipendente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>gli enzimi coinvolti nella sintesi degli steroli</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la diidrofollato reductasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>la sintesi proteica</div></div>	
			Risposta esatta D				Risposta esatta A
N°	1782	Domanda	Dilatazione dei vasi muscolari, costrizione dei vasi cutanei, aumento della frequenza e della forza di contrazione cardiache sono tutti effetti provocati da	N°	1784	Domanda	L'antimicrobico avente la struttura chinolonica indicata è la ciprofloxacina. Indicare quale delle affermazioni sotto riportate è corretta
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>adrenalina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>isoproterenolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>istamina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>acetilcolina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>clonidina</div></div>				<div><div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>per la presenza del fluoro agisce esclusivamente sui batteri Gram-positivi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>per la presenza del fluoro agisce esclusivamente sui batteri Gram-negativi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è riservato alla terapia pediatrica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>gli antiacidi che contengono idrossidi di Al favoriscono l'assorbimento del farmaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>gli antiacidi che contengono idrossidi di Mg riducono l'assorbimento del farmaco</div></div>
			Risposta esatta A				Risposta esatta E




N°	1785	Domanda Tra i principi attivi utilizzati per la terapia del Parkinson si trovano riportati il deprenil e la selegilina. Quale delle seguenti affermazioni è corretta	N°	1787	Domanda Nel processo di coagulazione del sangue intervengono, tra gli altri, trombina, fibrina e fibrinogeno. Quale di questi composti presenta attività enzimatica
		<div><div>A</div>il (-)(R)-deprenil rappresenta il distomero della selegilina</div> <div><div>B</div>il (+)(L)-deprenil è l'eutomero della selegilina</div> <div><div>C</div>il deprenil è un inibitore specifico della COMT</div> <div><div>D</div>la selegilina è un inibitore specifico delle MAO-A</div> <div><div>E</div>il nome selegilina corrisponde al levo- deprenil</div>			<div><div>A</div>la fibrina</div> <div><div>B</div>il fibrinogeno</div> <div><div>C</div>la trombina</div> <div><div>D</div>tutti e tre</div> <div><div>E</div>nessuno dei tre</div>
		Risposta esatta E			Risposta esatta C


N°	1786	Domanda Per biosimilari si intendono farmaci biotecnologici:	N°	1788	Domanda L'estratto di pigoio africano (<i>Prunus africana</i> Koim.) è utilizzato nel trattamento di:
		<div><div>A</div>identici al farmaco di riferimento</div> <div><div>B</div>simili ai biotecnologici originali, verso i quali hanno dimostrato di possedere efficacia terapeutica, qualità e profilo di sicurezza comparabili</div> <div><div>C</div>approvati senza studi clinici</div> <div><div>D</div>che hanno diverse indicazioni terapeutiche rispetto al farmaco di riferimento</div> <div><div>E</div>ottenuti per sintesi</div>			<div><div>A</div>insufficienza venosa</div> <div><div>B</div>slipsi</div> <div><div>C</div>iperplasia prostatica benigna</div> <div><div>D</div>infezioni delle vie urinarie</div> <div><div>E</div>ipercolesterolemia</div>
		Risposta esatta B			Risposta esatta C



N°	1789	Domanda Quale delle seguenti caratteristiche è comune a tutti i recettori muscarinici umani fino ad ora clonati (M1 - M5)?	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>il numero di aminoacidi che costituiscono le molecole proteiche</div><div>l'accoppiamento con la adenilato ciclasi</div><div>l'accoppiamento con la fosfolipasi C</div><div>il numero dei domini transmembrana</div><div>l'antagonismo da parte della pirenzepina</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1791	Domanda Quale delle seguenti classi di farmaci antimicrobici NON agiscono per alterazione della permeabilità della membrana cellulare?	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>polimixine</div><div>pollenici</div><div>imidazoli</div><div>chinoloni</div><div>tutti quelli indicati</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1790	Domanda Oltre al fegato quale altro organo tra quelli elencati ha capacità di metabolizzare i farmaci?	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>polmone</div><div>milza</div><div>pancreas</div><div>nessuna indicazione è corretta</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1792	Domanda L'antitrombina è prodotta usando:	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>sintesi chimica</div><div>semisintesi organica</div><div>cellule di lievito</div><div>cellule di procarioti</div><div>animali transgenici</div></div></div>	Risposta esatta	E




N°	1793	Domanda	Il betametazone si somministra in caso di travaglio prematuro per:	<div><div><div>A</div><div>rallentare il travaglio</div></div><div><div>B</div><div>accelerare lo sviluppo dei polmoni del feto</div></div><div><div>C</div><div>accelerare la maturazione dei reni del feto</div></div><div><div>D</div><div>accelerare la maturazione del fegato del feto</div></div><div><div>E</div><div>accelerare il travaglio</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1795	Domanda	In quale delle seguenti intossicazioni è di comune riscontro un danno alla retina per azione lesiva selettiva?	<div><div><div>A</div><div>intossicazione da metanolo</div></div><div><div>B</div><div>intossicazione da FANS</div></div><div><div>C</div><div>intossicazione da beta-bloccanti</div></div><div><div>D</div><div>intossicazione da omeprazolo</div></div><div><div>E</div><div>intossicazione da ticlopidina</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1796	Domanda	L'ipratropio bromuro, avente la struttura indicata, viene impiegato	<div><div><div>A</div><div>nell'asma bronchiale</div></div><div><div>B</div><div>nella stipsi</div></div><div><div>C</div><div>nel glaucoma</div></div><div><div>D</div><div>nella ritenzione urinaria da ipertrofia prostatica</div></div><div><div>E</div><div>nella xerostomia</div></div></div> <div><chem>CN(C)C1CCC2C3C(C1)OC(=O)C(C2)C(O)C3c4ccccc4</chem></div>	Risposta esatta	A
N°	1794	Domanda	E' consentita la pubblicità presso il pubblico di medicinali omeopatici per uso umano assoggettati a procedura semplificata di autorizzazione?	<div><div><div>A</div><div>si, sempre</div></div><div><div>B</div><div>si, ma soltanto per quelli vendibili senza presentazione di ricetta medica</div></div><div><div>C</div><div>si, ma è necessaria una specifica autorizzazione ministeriale</div></div><div><div>D</div><div>no, è vietata</div></div><div><div>E</div><div>si, ma soltanto per quelli destinati ad essere somministrati per via orale o esterna</div></div></div>	Risposta esatta	D




N°	1797	Domanda	Tutte le seguenti sono caratteristiche delle reazioni avverse di tipo B tranne una, indicare quale:	N°	1799	Domanda	La reserpina può essere impiegata come farmaco
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>non sono correlate alla dose di farmaco somministrata</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>non sono collegate al meccanismo d'azione del farmaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sono prevedibili</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>hanno un'alta mortalità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sono di solito scoperte dopo la commercializzazione del farmaco</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antilucera</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antipertensivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>antidiarroico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>miolico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>antiparkinson</div></div>	
			Risposta esatta C				Risposta esatta B

N°	1798	Domanda	Volendo preparare una soluzione omeopatica corrispondente a 5CH, senza procedere alle diluizioni successive secondo Hahnemann, in quale volume di solvente si dovrebbe sciogliere 1 grammo di ceppo solido	N°	1800	Domanda	A quali, tra i seguenti soggetti, il Comune può vendere la farmacia?
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>100 milioni di litri</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>1 milione di litri</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>10 mila litri</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>10 milioni di litri</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>1000 litri</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>solo a farmacisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>solo a farmacisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e a società di persone o cooperative i cui soci siano farmacisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alle aziende speciali, ai consorzi tra comuni e a società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che prestino servizio presso farmacie Comunali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>a società a responsabilità limitata di cui il Comune sia socio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>a società di capitali</div></div>	
			Risposta esatta D				Risposta esatta B



N°	1801	Domanda	Che cosa indica la tabella n.7 della Farmacopea Ufficiale?
		A	gli apparecchi e gli utensili obbligatori in farmacia
		B	i medicinali da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica
		C	i medicinali da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile
		D	le sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave
		E	gli stupefacenti e le sostanze psicotrope
		Risposta esatta	E

N°	1802	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni è corretta? I Ca ²⁺ -antagonisti possono
		A	rilasciare la muscolatura scheletrica
		B	contrarre la muscolatura scheletrica
		C	aumentare l'automatismo cardiaco
		D	ridurre la contrattilità del miocardio
		E	aumentare la velocità di conduzione del nodo atrioventricolare
		Risposta esatta	D


N°	1803	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce l'eritromicina, avente la struttura indicata?
			
		A	inibizione della DNA girasi
		B	membrana citoplasmatica
		C	subunità ribosomiale 50S
		D	subunità ribosomiale 30S
		E	didropirato sintetasi
		Risposta esatta	C

N°	1804	Domanda	L'acqua per preparazioni iniettabili può essere ottenuta per
		A	ebollizione di trenta minuti
		B	filtrazione attraverso carbone attivo
		C	trattamento con cloro
		D	trattamento con resine a scambio ionico
		E	distillazione
		Risposta esatta	E

N°	1805	Domanda	Le reazioni avverse di tipo A:						
			<div><div>A</div>sono dose-indipendenti</div> <div><div>B</div>sono poco frequenti</div> <div><div>C</div>non sono riproducibili sperimentalmente</div> <div><div>D</div>sono generalmente correlate al meccanismo d'azione del farmaco</div> <div><div>E</div>vengono individuate soprattutto dopo la commercializzazione</div>						
								Risposta esatta	D

N°	1807	Domanda	Quale di queste definizioni è corretta:						
			<div><div>A</div>gli allergeni sono medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una modificazione acquisita specifica della risposta immunitaria verso un agente allergizzante.</div> <div><div>B</div>un medicinale immunologico è costituito da vaccini, tossine, sieri o allergeni</div> <div><div>C</div>più di una definizione è corretta</div> <div><div>D</div>nessuna definizione è corretta</div> <div><div>E</div>un radiofarmaco è un medicinale che, quando è pronto per l'uso, include uno o più radionuclidi (isotopi radioattivi) incorporati a scopo sanitario</div>						
								Risposta esatta	C

N°	1808	Domanda	La alfuzosina esplica il suo effetto antipertensivo mediante						
			<div><div>A</div>blocco dei recettori alfa1 adrenergici a livello vasale</div> <div><div>B</div>attivazione dei recettori alfa1 adrenergici a livello vasale</div> <div><div>C</div>blocco dei recettori beta1 cardiaci</div> <div><div>D</div>attivazione dei recettori beta1 cardiaci</div> <div><div>E</div>attivazione dei recettori D2 vasali</div>						
								Risposta esatta	A





N°	1809	Domanda	Uno degli effetti collaterali più gravi delle statine è:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>l'ulcera gastrica</div><div>la stitichezza</div><div>l'inappetenza</div><div>la miopatia</div><div>nessuno di questi</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1811	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti gli agenti emulsionanti è ERRATA?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>i tensioattivi "solubilizzanti" hanno HLB nell'intervallo 10-13</div><div>i tensioattivi lipofili hanno HLB inferiore a 10</div><div>i tensioattivi "antischiuma" hanno HLB nell'intervallo 1-3</div><div>i tensioattivi "detergenti" hanno HLB nell'intervallo 13-16</div><div>il valore di HLB tiene conto del rapporto in peso tra le porzioni idrofila e lipofila</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1810	Domanda	L'acetazolamide, un inibitore dell'anidrase carbonica, può determinare alcalinizzazione delle urine che può diminuire la velocità di escrezione di alcuni farmaci come	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>antidepressivi triciclici</div><div>barbiturici</div><div>salicilati</div><div>diclofenamide</div><div>tutte le risposte sono corrette</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1812	Domanda	Gli analoghi del GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormon) sono ormoni:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>steroidi agenti a livello di recettore nucleare</div><div>steroidi agenti a livello di recettore solubile citoplasmatico</div><div>steroidi agenti a livello di recettore localizzato sulla membrana cellulare</div><div>peptidici agenti a livello di recettore nucleare</div><div>peptidici agenti a livello di recettore localizzato sulla membrana cellulare</div></div></div>	Risposta esatta	E




N°	1813	Domanda	La pubblicità dei dispositivi medici è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero della Salute?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no mai</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si sempre</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>no quando non vanti proprietà di specifici dispositivi medici individuati da un marchio commerciale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si previo parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti (FOFI)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1815	Domanda	Un farmaco basico nella sua forma protonata ha un $pK_a = 7$. Quando esso entra in una cellula dove il valore del pH è inferiore di una unità rispetto a quello del fluido extracellulare, la concentrazione della forma ionizzata	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si raddoppia rispetto a quella presente nel fluido extracellulare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si dimezza rispetto a quella presente nel fluido extracellulare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>rimane costante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dipende dal volume di fluido che si trova all'interno della cellula</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>non si può calcolare in quanto mancano i valori numerici del pH nei due distretti</div></div>	Risposta esatta	E

N°	1816	Domanda	La struttura riportata è riconducibile alla classe delle biguanidi. Qual è la corrispondente indicazione terapeutica?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antiasmatica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antichinetosica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ipoglicemizzante orale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antiparkinson</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>anticolinergica</div></div>	Risposta esatta	C
----	------	---------	---	--	-----------------	---




N°	1817	Domanda	Quale farmaco, tra quelli elencati, è un induttore farmaco-metabolico?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Rifampicina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Acido valproico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Cimetidina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Fenitoina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di uno di quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1819	Domanda	L'acidificazione dell'urina favorisce l'eliminazione dei farmaci a carattere basico	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>diminuendone la ionizzazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>aumentandone la ionizzazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>aumentandone la lipofilia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>aumentandone la secrezione tubulare attiva</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>diminuendone il riassorbimento tubulare attivo</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1820	Domanda	La fenilefrina, avente la struttura indicata, può essere applicata alla mucosa nasale per indurre	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>blocco dei recettori istaminergici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>blocco dei recettori beta adrenergici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>blocco dei recettori alfa adrenergici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>vasodilatazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>vasocostrizione</div></div>	Risposta esatta	E



N°	1821	Domanda	Quale dei farmaci elencati NON appartiene alla classe degli antidepressivi tridici	<div><div><div>A</div><div>clomipramina</div></div><div><div>B</div><div>amitriptilina</div></div><div><div>C</div><div>desipramina</div></div><div><div>D</div><div>dosulepina</div></div><div><div>E</div><div>fluoxetina</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1822	Domanda	I preparati ufficiali su scala ridotta si possono allestire:	<div><div><div>A</div><div>solo in farmacia, e non viene specificato nessun limite di peso del formulato</div></div><div><div>B</div><div>non solo in farmacia, la consistenza numerica è quella ottenibile da una massa compresa tra 3000 e 6000 g di formulato</div></div><div><div>C</div><div>solo in farmacia, la consistenza numerica è quella ottenibile da una massa non superiore ai 3000 g di formulato</div></div><div><div>D</div><div>se presenti unicamente nel capitolo Preparazioni Farmaceutiche Specifiche della FU in vigore</div></div><div><div>E</div><div>se presenti nel Formulario Nazionale della FU X edizione</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1823	Domanda	A chi viene proposto "in primis" l'affidamento di un dispensario farmaceutico?	<div><div><div>A</div><div>al Comune</div></div><div><div>B</div><div>al titolare della farmacia più vicina, anche se di altro Comune</div></div><div><div>C</div><div>al farmacista vincitore di apposito concorso</div></div><div><div>D</div><div>ad un dipendente dell'A.S.L. di competenza con laurea in farmacia</div></div><div><div>E</div><div>nessuna delle indicazioni fornite</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1824	Domanda	Da chi è stabilito il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali per uso umano rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale?	<div><div><div>A</div><div>dal Ministero della Salute</div></div><div><div>B</div><div>il prezzo coincide con il prezzo medio europeo</div></div><div><div>C</div><div>dalla contrattazione tra AIFA e Produttori</div></div><div><div>D</div><div>dalla Regione</div></div><div><div>E</div><div>dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Finanze</div></div></div>	Risposta esatta	C




N°	1825	Domanda	Il naloxone possiede la struttura indicata e costituisce il principio attivo di un medicinale in commercio in forma di fiale iniettabili. Quale delle affermazioni seguenti sul medicinale in questione è corretta?
			
		<div><div>A</div>e' una sostanza che si comporta da agonista sul recettore della morfina</div> <div><div>B</div>come tutte le forme iniettabili può essere consegnato in farmacia solo con ricetta medica</div> <div><div>C</div>pur essendo una forma iniettabile può essere consegnato senza ricetta medica</div> <div><div>D</div>necessita di ricetta medica non ripetibile</div> <div><div>E</div>necessita di ricetta medica speciale</div>	Risposta esatta C
N°	1826	Domanda	La lanolina andrà si definisce come:
		<div><div>A</div>una base idrosolubile</div> <div><div>B</div>una base emulsionante acqua</div> <div><div>C</div>una base emulsionata</div> <div><div>D</div>più di una indicazione è corretta</div> <div><div>E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>	Risposta esatta B
N°	1827	Domanda	Le sostanze elencate nella tabella n.2 della F.U. devono essere tenute dal farmacista in armadio chiuso a chiave?
		<div><div>A</div>sì</div> <div><div>B</div>sì, ma anche quelle elencate nella tabella n.3</div> <div><div>C</div>no, solo quelle elencate nella tabella n.5</div> <div><div>D</div>no, solo quelle elencate nella tabella n.8</div> <div><div>E</div>la Tab. n.2 della F.U. non reca l'elenco delle sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave</div>	Risposta esatta E
N°	1828	Domanda	L'operatore sanitario è tenuto ad inviare la segnalazione di incidente con dispositivi medici diagnostici in vitro:
		<div><div>A</div>all'Organismo Notificato che ha rilasciato il certificato CE relativo al dispositivo</div> <div><div>B</div>al Ministero della Salute</div> <div><div>C</div>al Ministero dello Sviluppo Economico</div> <div><div>D</div>alla Commissione Europea</div> <div><div>E</div>a tutti gli Stati Membri</div>	Risposta esatta B


N°	1829	Domanda	Secondo la F.U. la densità da compattazione si ottiene compattando meccanicamente un campione di polvere contenuto in:		N°	1831	Domanda	Quale dei seguenti farmaci può più facilmente indurre dilatazione bronchiale?	
			<div><div>A</div>un compattatore a rulli</div>					<div><div>A</div>noradrenalina</div>	
			<div><div>B</div>un cilindro graduato</div>					<div><div>B</div>fenilefrina</div>	
			<div><div>C</div>un recipiente di pesata</div>					<div><div>C</div>clonidina</div>	
			<div><div>D</div>una sola indicazione è corretta</div>					<div><div>D</div>salbutamolo</div>	
			<div><div>E</div>più di una indicazione è corretta</div>					<div><div>E</div>metacollina</div>	
				Risposta esatta E				Risposta esatta D	
N°	1830	Domanda	Il trimetoprim, la pirimetamina, il metotrexato, in qualità di inibitori delle diidrotolati riduttasi, sono usati rispettivamente come antibatterico, antiprotozario e antitumorale. La loro selettività è dovuta a		N°	1832	Domanda	Warfarina e eparina sono due farmaci ad azione anticoagulante e	
			<div><div>A</div>divergente meccanismo di azione</div>					<div><div>A</div>entrambi passano la barriera placentare e non devono essere usati in gravidanza</div>	
			<div><div>B</div>divergente farmacocinetica</div>					<div><div>B</div>solo warfarina non attraversa la barriera placentare e può essere usata in gravidanza</div>	
			<div><div>C</div>esistenza di isoenzimi della diidrotolati riduttasi in batteri, protozoi, mammiferi</div>					<div><div>C</div>solo eparina non attraversa la barriera placentare e può essere usata in gravidanza</div>	
			<div><div>D</div> differenze citologiche tra le cellule di batteri, protozoi, mammiferi</div>					<div><div>D</div>entrambi non passano la barriera placentare e possono essere usati in gravidanza</div>	
			<div><div>E</div>ragioni a tutt'oggi sconosciute</div>					<div><div>E</div>nessuno dei due presenta pericoli di malformazioni fetali</div>	
				Risposta esatta C				Risposta esatta C	



N°	1833	Domanda	Il ricettario in triplice copia a ricalco è obbligatorio per le prescrizioni di stupefacenti		N°	1835	Domanda	E' un ormone ipotalamico.	
		<div><div>A</div>per tutti</div>					<div><div>A</div>la ciproptadina</div>		
		<div><div>B</div>della tabella II Sez. A,B e C del D.P.R. n. 309/1990</div>					<div><div>B</div>l'ormone liberante le gonadotropine (GnRH)</div>		
		<div><div>C</div>della Tabella II Sez. A del D.P.R. n. 309/1990</div>					<div><div>C</div>la insulina</div>		
		<div><div>D</div>più di una indicazione è corretta</div>					<div><div>D</div>la bromocriptina</div>		
		<div><div>E</div>per tutti i medicinali dell'Allegato III bis nella terapia del dolore</div>					<div><div>E</div>la melencefalina</div>		
			Risposta esatta C					Risposta esatta B	
N°	1834	Domanda	L'impiego sugli animali di una preparazione estemporanea preparata dal farmacista conformemente alle indicazioni della prescrizione veterinaria è consentito		N°	1836	Domanda	Il vantaggio dei fosfonati antivirali risiede	
		<div><div>A</div>in nessun caso</div>					<div><div>A</div>nel miglioramento dell'assorbimento</div>		
		<div><div>B</div>solo per la terapia di animali da compagnia</div>					<div><div>B</div>nella maggiore velocità d'azione</div>		
		<div><div>C</div>solo per la terapia di animali produttori di alimenti per l'uomo</div>					<div><div>C</div>nei dosaggi ridotti</div>		
		<div><div>D</div>nei casi in cui la terapia riguarda più di quindici capi</div>					<div><div>D</div>nell'inibizione irreversibile</div>		
		<div><div>E</div>in tutti i casi</div>					<div><div>E</div>nei minori effetti collaterali</div>		
			Risposta esatta E					Risposta esatta D	



N°	1837	Domanda	Quali farmaci sono utili nelle infezioni epatiche?	<div><div><div>A</div></div><div>Macrolidi</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Antivirali</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Cefalosporine</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Penicilline</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Vancomicina</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1839	Domanda	Secondo la Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali spetta al farmacista un diritto aggiuntivo quando in una preparazione magistrale sono presenti	<div><div><div>A</div></div><div>sostanze velenose</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>sostanze stupefacenti</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>sostanze corrosive</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>sostanze coloranti</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1840	Domanda	In che cosa si differenziano le sulfoniluree di II generazione da quelle di I generazione?	<div><div><div>A</div></div><div>divergente via di somministrazione</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>minori effetti collaterali</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>indicazione clinica differente</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>maggiore potenza</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>maggiore selettività tissutale</div></div>	Risposta esatta	D




N°	1841	Domanda	Non è consentito allestire preparazioni magistrali se contenenti:		N°	1843	Domanda	A quale delle definizioni seguenti corrisponde, con maggior approssimazione, il termine "biodisponibilità" riferito ad un farmaco:		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>dosaggi presenti in medicinali di origine industriale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>principi attivi non presenti in un medicinale industriale, né in una Farmacopea della UE o se ritirati per motivi attinenti i rischi d'impiego</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>lattosio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>formulazioni con eccipienti uguali a quelli presenti sul mercato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>principi attivi presenti nella Farmacopea Europea</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>velocità con cui viene escreto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>facilità con cui viene metabolizzato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>facilità con cui viene biosintetizzato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>quantità di farmaco che raggiunge la circolazione sistemica senza subire modificazioni chimiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>velocità con cui passa in soluzione</div></div>			
				Risposta esatta	B				Risposta esatta	D


N°	1842	Domanda	In un medicinale il principio attivo ketorolac si trova associato alla trometamina avente la struttura sotto indicata. Quale delle affermazioni riportate è corretta: la trometamina		N°	1844	Domanda	I glucosidi cardiotattivi diminuiscono la frequenza sinusale del cuore in scompenso per		
		<div><chem>NC(CO)C(O)CO</chem></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>stabilizza la forma farmaceutica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ha attività sinergica con il principio attivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>costituisce materiale del tutto inerte</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>favorisce la solubilità in acqua del principio attivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>azione diretta sul nodo del seno</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>stimolazione vagale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>complementarietà di tutti i meccanismi ricordati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>diminuzione dell'ipertono simpatico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>miglioramento emodinamico</div></div>			
									Risposta esatta	C

N°	1845	Domanda	Nella schistosomiasi il trattamento eiettivo è con:		
			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>Praziquantel</div></div></div>		
			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>Ceftriaxone</div></div></div>		
			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>Metronidazolo</div></div></div>		
			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>Mebendazolo</div></div></div>		
			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>Dietilcarbamazina</div></div></div>		
				Risposta esatta	A
N°	1846	Domanda	L'uso di oximetazolina in associazione a farmaci anti-MAO può esporre a rischio di:		
			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>crisi ipoglicemiche</div></div></div>		
			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>disturbi neurologici</div></div></div>		
			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>crisi vagali</div></div></div>		
			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>cataratta</div></div></div>		
			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>crisi ipertensive</div></div></div>		
				Risposta esatta	E

N°	1849	Domanda	Quali fra le seguenti condizioni consente al farmacista, in caso di necessità e urgenza, di consegnare un medicinale assoggettato a prescrizione medica senza presentazione della relativa ricetta?	N°	1851	Domanda	Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti che vengono aggiunti alle polveri allo scopo di far raggiungere alla compressa un peso congruo si definiscono
			<div><div>A</div> paziente affetto da patologia acuta</div> <div><div>B</div> paziente con invalidità</div> <div><div>C</div> più di uno dei casi indicati</div> <div><div>D</div> paziente che necessita di non interrompere un trattamento terapeutico</div> <div><div>E</div> paziente residente all'estero</div>				<div><div>A</div> leganti</div> <div><div>B</div> nessuno dei termini indicati</div> <div><div>C</div> lubrificanti</div> <div><div>D</div> glidanti</div> <div><div>E</div> disaggreganti</div>
			Risposta esatta D				Risposta esatta B
N°	1850	Domanda	I nitrati organici riducono la richiesta cardiaca di O ₂ in quanto	N°	1852	Domanda	NON volendo modificare il contenuto qualitativo dei cationi presenti in un preparato antiacido, con quale dei prodotti sotto indicati contenuto in una specialità medicinale, si potrebbe sostituire una specialità medicinale contenente magnesio e alluminio?
			<div><div>A</div> hanno azione cronotropa negativa</div> <div><div>B</div> hanno azione inotropia negativa diretta</div> <div><div>C</div> aumentano il riempimento dei ventricoli</div> <div><div>D</div> potenziano il tono arteriolare</div> <div><div>E</div> riducono il ritorno venoso</div>				<div><div>A</div> Al₂O₃</div> <div><div>B</div> sucralfato</div> <div><div>C</div> glucaltrato</div> <div><div>D</div> Mg(OH)₂</div> <div><div>E</div> nessuno dei composti indicati</div>
			Risposta esatta E				Risposta esatta E



N°	1853	Domanda	Le polimixine provocano
A		distruzione della membrana cellulare e morte della cellula	
B		inibizione della sintesi proteica	
C		inibizione della sintesi di acidi nucleici	
D		inibizione della sintesi del parete	
E		inibizione di processi metabolici	
Risposta esatta A			
N°	1854	Domanda	Quale farmaco tra quelli indicati è attualmente utilizzato nella terapia di disassuefazione dalla tossicodipendenza da oppiacei?
A		ossicodone	
B		naloxone	
C		metadone	
D		nalorfina	
E		naltrexone	
Risposta esatta C			
N°	1855	Domanda	Le proprietà tossicomaniogene della morfina vengono esaltate prevalentemente da:
A		metilazione del gruppo -OH fenolico	
B		metilazione del gruppo -OH alcoliolo	
C		ossidazione del gruppo -OH alcoliolo	
D		metilazione dei gruppi -OH fenolico ed alcoliolo	
E		acilazione dei gruppi -OH alcoliolo e fenolico	
Risposta esatta E			
N°	1856	Domanda	Quale delle affermazioni riportate riguardanti la "plantaggine" è corretta. La "plantaggine" è costituita:
A		dai semi di Plantago ovata	
B		dai semi di Plantago psyllium	
C		dalle parti aeree di Plantago lanceolata	
D		dalle foglie di Plantago ciliata	
E		dalle parti aeree di Plantago palmata	
Risposta esatta C			

N°	1857	Domanda	La fenilefrina, avente la struttura indicata, è dotata degli effetti elencati, con l'ECCEZIONE dell'azione:		
					
		<input type="checkbox"/> A	rilascente la muscolatura liscia bronchiale		
		<input type="checkbox"/> B	decongestionante delle mucose		
		<input type="checkbox"/> C	midriatica		
		<input type="checkbox"/> D	vasocostrittore		
		<input type="checkbox"/> E	ipertensiva		
				Risposta esatta	A
N°	1858	Domanda	I fimoletici sono		
		<input type="checkbox"/> A	farmaci che agiscono sul timo		
		<input type="checkbox"/> B	farmaci antidepressivi		
		<input type="checkbox"/> C	farmaci tranquillanti		
		<input type="checkbox"/> D	farmaci omeopatici		
		<input type="checkbox"/> E	una sottoclasse di anestetici		
				Risposta esatta	B
N°	1859	Domanda	Il meccanismo di azione degli antidepressivi triciici è dovuto a:		
		<input type="checkbox"/> A	stimolazione diretta dei recettori muscarinici		
		<input type="checkbox"/> B	blocco del reuptake di noradrenalina e serotonina		
		<input type="checkbox"/> C	antagonismo competitivo dei recettori alla adrenergici		
		<input type="checkbox"/> D	effetto stabilizzante di membrana		
		<input type="checkbox"/> E	blocco della sintesi di dopamina		
				Risposta esatta	B
N°	1860	Domanda	Si devono preparare 350 ml di "Alcool Iodio-salicilico" soluzione idroalcolica al 5% di Iodio. Entro quale intervallo ricade la quantità di Iodio da pesare?		
		<input type="checkbox"/> A	1500 - 2500 mg		
		<input type="checkbox"/> B	più di uno di quelli indicati		
		<input type="checkbox"/> C	10 - 14 g		
		<input type="checkbox"/> D	15 - 25 g		
		<input type="checkbox"/> E	nessuno di quelli indicati		
				Risposta esatta	D

N°	1861	Domanda	La Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali prevede un diritto addizionale quando nel medicamento sono presenti sostanze
A	infiammabili	B	in due casi di quelli riportati
C	edulcoranti	D	coloranti
E	in due casi di quelli riportati, raddoppiando l'importo se sono presenti entrambi	Risposta esatta	D

N°	1862	Domanda	Le indagini diagnostiche attraverso i Raggi X utilizzano radiazioni elettromagnetiche che, rispetto ai valori che rientrano nel campo del visibile, sono
A	a lunghezza d'onda più bassa e ad energia più elevata	B	a lunghezza d'onda molto più grande
C	a lunghezza d'onda ed energia molto più basse	D	a valori di lunghezza d'onda confrontabili
E	ad energia minore	Risposta esatta	A

N°	1863	Domanda	La Tab.2 della F.U. elenca "le sostanze di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste". Alcune di esse possono essere tenute come preparazioni farmaceutiche. Entro quale delle classi di sostanze riportate dalla Tab.2 potrebbe rientrare il medicinale contenente la sostanza avente la struttura riportata?
A	contraccettivi sistemici ormonali	B	cefalosporine
C	penicilline	D	chinelonici
E	antagonisti beta-adrenergici	Risposta esatta	B


N°	1864	Domanda	Quale dei seguenti farmaci induce tolleranza?
A	Lidocaina	B	Amiodarone
C	Lito	D	Atenoloio
E	Diazepam	Risposta esatta	E

N°	1865	Domanda	In quale tipo di shock l'adrenalina rappresenta il farmaco più indicato	<div><div><div>A</div>da ustione</div><div><div>B</div>da emorragia</div><div><div>C</div>anafattico</div><div><div>D</div>settico</div><div><div>E</div>cardiogeno</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1867	Domanda	Per valutare adeguatamente l'ottimizzazione delle scorte in un magazzino di farmacia, i fattori da considerare sono:	<div><div><div>A</div>la tipologia dei clienti se di passaggio o residenti</div><div><div>B</div>la posizione della farmacia in funzione al traffico pedonale o veicolare</div><div><div>C</div>La tipologia degli orari seguiti</div><div><div>D</div>più di una indicazione è corretta</div><div><div>E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	D

N°	1866	Domanda	Quale delle seguenti caratteristiche della penicillina G NON corrisponde alla realtà? La penicillina G	<div><div><div>A</div>è attiva prevalentemente sui batteri Gram-positivi</div><div><div>B</div>è rapidamente degradata in ambiente acido</div><div><div>C</div>non può essere somministrata a dosi eccedenti i quattro grammi/die</div><div><div>D</div>è rapidamente eliminata</div><div><div>E</div>ha scarsa resistenza alla penicillinasi</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1868	Domanda	Qual è l'importo del diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali per la dispensazione di medicinali durante il turno di apertura festivo?	<div><div><div>A</div>e' a discrezione del farmacista</div><div><div>B</div>euro 1,55 per le farmacie urbane, Euro 2,07 per le farmacie rurali sussidiate</div><div><div>C</div>non è previsto alcun diritto addizionale a tale titolo</div><div><div>D</div>euro 3,87 per le farmacie urbane, Euro 4,91 per le farmacie rurali sussidiate</div><div><div>E</div>euro 2,07 per le farmacie urbane, Euro 1,55 per le farmacie rurali sussidiate</div></div>	Risposta esatta	C





Risposta esatta



D




1869	N°	Domanda E' obbligatorio per il farmacista riportare gli estremi del verbale di distruzione degli stupefacenti nel relativo registro entrata e uscita?	<div><div>A</div><div>no, è sufficiente indicare la data dell'avvenuta distruzione</div></div> <div><div>B</div><div>si, ma solo per gli stupefacenti precedentemente ricevuti in custodia</div></div> <div><div>C</div><div>si, ad eccezione degli stupefacenti precedentemente ricevuti in custodia</div></div> <div><div>D</div><div>si, sempre</div></div> <div><div>E</div><div>no, è sufficiente indicare l'avvenuta distruzione</div></div>	Risposta esatta	D
1870	N°	Domanda Qual è l'intervallo di tempo massimo entro il quale le commissioni ispettive debbono ispezionare le farmacie (fatta eccezione per le ispezioni veterinarie)?	<div><div>A</div><div>un anno</div></div> <div><div>B</div><div>un triennio</div></div> <div><div>C</div><div>un biennio</div></div> <div><div>D</div><div>un quinquennio</div></div> <div><div>E</div><div>un quadriennio</div></div>	Risposta esatta	C
1871	N°	Domanda I composti metoprololo (I) e clenbuterolo (II) agiscono sul sistema orosimpatico. Quale delle affermazioni elencate è corretta? Il composto	<div><div>A</div><div>(I) è un antagonista non selettivo beta</div></div> <div><div>B</div><div>(II) è un agonista beta2</div></div> <div><div>C</div><div>(I) è un agonista beta1</div></div> <div><div>D</div><div>(II) è un agonista non selettivo beta</div></div> <div><div>E</div><div>(I) è un antagonista non selettivo alfa</div></div>	Risposta esatta	B
1872	N°	Domanda L' impiego più comune di Ipratropio, avente la struttura indicata, prevede la somministrazione per via	<div><div>A</div><div>sottocutanea</div></div> <div><div>B</div><div>intramuscolare</div></div> <div><div>C</div><div>inalatoria</div></div> <div><div>D</div><div>rettale</div></div> <div><div>E</div><div>orale</div></div>	Risposta esatta	C

N°	1873	Domanda	La vendita all'utilizzatore finale di medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medica è riservata alle farmacie	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>esclusivamente</div><div>ed è consentita anche al fabbricante</div><div>ed è consentita anche al grossista ed al fabbricante senza alcuna autorizzazione</div><div>ed è consentita anche negli esercizi commerciali previsti dall'art.5 del D.L. 223/2006 e al grossista autorizzato</div><div>e può essere effettuata anche dal veterinario</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1875	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni su <i>Serenoa repens</i> Smal. è corretta.	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>può essere utilizzata nel trattamento dell'alopecia androgenetica</div><div>contiene alcaloidi</div><div>ha effetti antiapoptotici</div><div>possiede effetti di stimolazione alfa adrenargica</div><div>induce la 5-alfa riduttasi</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1876	Domanda	Il primidone è usato come anticonvulsivante. Quale delle seguenti affermazioni è vera?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>viene in parte trasformato in fenobarbitale</div><div>e' già attivo come tale</div><div>può generare anemia megaloblastica</div><div>tutte le affermazioni sono corrette</div><div>solo una delle affermazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	D



N°	1877	Domanda	L'acido benzoico viene metabolizzato per coniugazione con la glicina a	<div><div><div>A</div><div>acido salicilico</div></div><div><div>B</div><div>acido salicilurico</div></div><div><div>C</div><div>acido nicotinurico</div></div><div><div>D</div><div>acido glucuronico</div></div><div><div>E</div><div>acido ippurico</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	1879	Domanda	L'amfotericina B, avente la struttura indicata, è il farmaco di scelta per il trattamento di	<div><div><div>A</div><div>schizofrenia</div></div><div><div>B</div><div>ulcera peptica</div></div><div><div>C</div><div>ipertensione</div></div><div><div>D</div><div>pirosi gastrica</div></div><div><div>E</div><div>micosi sistemiche</div></div></div> <div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	1880	Domanda	La codina può essere somministrata per os in quanto	<div><div><div>A</div><div>presenta un basso coefficiente di ripartizione lipidi/acqua</div></div><div><div>B</div><div>è assorbita tramite un carrier specifico</div></div><div><div>C</div><div>è assorbita per trasporto attivo</div></div><div><div>D</div><div>il gruppo metilico sull'ossidrilite fenolico ne impedisce la glucuronazione epatica</div></div><div><div>E</div><div>ha l'ossidrilite alcoolico protetto sotto forma di etere</div></div></div> <div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>D</div>



N°	1881	Domanda Il farmacista è tenuto a conservare copia del buono-acquisto stupefacenti conforme al DM 18.12.2006?	<div><div><div>A</div>si</div><div>Bnon è un obbligo normativamente previsto</div><div>Csì, ma solo per gli stupefacenti della Tabella II Sez. A</div><div>Dsì, ma solo qualora acquisti direttamente dal produttore</div><div>E sì, ma solo qualora acquisti , eccezionalmente, da altre farmacie</div></div>		N°	1883	Domanda Tutti i farmaci elencati NON inducono resistenza, TRANNE:	<div><div><div>A</div>displatino</div><div>Bfenobarbital</div><div>Cdortalidone</div><div>Ddigossina</div><div>E cimetidina</div></div>	Risposta esatta A
N°	1882	Domanda I recettori NMDA:	<div><div><div>A</div>sono inibiti dall'atropina</div><div>Bsono attivati dall'acido glutammico</div><div>Csono accoppiati positivamente all'adenilato ciclasi</div><div>Dsono localizzati esclusivamente negli organi bersaglio del Sistema Nervoso Autonomo</div><div>E sono attivati dalla Sostanza P</div></div>		N°	1884	Domanda Il farmacista è tenuto ad apporre l'etichetta sugli involucri dei medicinali galenici allestiti in farmacia?	<div><div><div>A</div>no,mai</div><div>Bsì, ma solo se si tratta di medicinali galenici preparati in base a ricetta medica</div><div>Csì, ma solo se si tratta di preparazioni contenenti sostanze ad azione stupefacente</div><div>Dsì, sempre</div><div>E sì, ma solo per i medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile</div></div>	Risposta esatta D




N°	1885	Domanda	I vaccini si possono ottenere in vari modi. Quale delle seguenti risposte è errata:	Risposta esatta	E
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>vaccini da germi attenuati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>vaccini da anatossine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>vaccini da subunità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>vaccini da prodotti microbici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>vaccini da antitossine</div></div>	Risposta esatta	A

N°	1886	Domanda	Quale delle seguenti sostanze è usata come agente di viscosità?	Risposta esatta	A
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>carbossiopolimetilene</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>polietilenglicole 400</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alcol benzilico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>cellulosa microcristallina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>polisorbato 80</div></div>	Risposta esatta	A


N°	1887	Domanda	In un prodotto cosmetico è ammesso l'impiego di tetracaina?	Risposta esatta	A
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no, perché presenti nell'elenco delle sostanze non ammesse</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sì, se il contenuto è inferiore allo 0,2%</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sì, se non produce effetti sistemici.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sì, sempre</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	A

N°	1888	Domanda	Il pH di una soluzione 10^{-3} M di HCl è pari a	Risposta esatta	C
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>9</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>11</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>3</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>6</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>4</div></div>	Risposta esatta	C



N°	1889	Domanda	L'indicazione della funzione del prodotto cosmetico:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>può non essere redatta in lingua italiana</div><div>nessuna indicazione è corretta</div><div>deve essere redatta almeno in lingua inglese</div><div>è facoltativa</div><div>è obbligatoria se non desumibile dalla sua presentazione</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1891	Domanda	I farmaci diuretici furosemide e pretanide inibiscono il trasporto Na ⁺ , K ⁺ , 2Cl ⁻ . Ciò avviene a livello del	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>glomerulo</div><div>tubulo contorto prossimale</div><div>tratto ascendente dell'ansa di Henle</div><div>tubulo contorto distale</div><div>tubulo collettore</div></div>	Risposta esatta	C


N°	1890	Domanda	Al sensi della Legge 713/86 il contenuto nominale al momento del confezionamento del prodotto cosmetico deve essere indicato	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>sempre, salvo i casi previsti dalla legge</div><div>in nessun caso</div><div>solo per i prodotti ad uso professionale</div><div>a discrezione del produttore</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1892	Domanda	Quale attività farmacologica, tra quelle indicate, può essere ipotizzata per la lidocaina, avente la struttura indicata	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>adrenergica</div><div>neurolettica</div><div>anticonvulsivante</div><div>anestetica locale</div><div>antimuscarinica</div></div>	Risposta esatta	D




N°	1893	Domanda	Il principale effetto collaterale delle antracicline è:	<div><div><div>A</div><div>la cardiotoxicità</div></div><div><div>B</div><div>la nefrotossicità</div></div><div><div>C</div><div>l'epatotossicità</div></div><div><div>D</div><div>la neurotossicità</div></div><div><div>E</div><div>l'ototossicità</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	1895	Domanda	Quale delle affermazioni riguardanti il rocuronio, la cui struttura è sotto riportata, è corretta	<div><div><div>A</div><div>è un bloccante neuromuscolare usato in chirurgia addominale</div></div><div><div>B</div><div>si può utilizzare come anestetico generale</div></div><div><div>C</div><div>si utilizza in associazione nei preparati anticoncezionali</div></div><div><div>D</div><div>è in grado di bloccare la lipossigenasi</div></div><div><div>E</div><div>si comporta da muscolorilassante centrale non sedativo</div></div></div>	Risposta esatta	A


CN1CCCC1[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4[C@H](C(=O)N(C)C)[C@H](C)[C@H]5[C@@H](C)[C@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@H]3C2

N°	1894	Domanda	Tra gli antagonisti muscarinici troviamo degli alcaloidi come la	<div><div><div>A</div><div>pilocarpina</div></div><div><div>B</div><div>D-tubocurarina</div></div><div><div>C</div><div>scopolamina</div></div><div><div>D</div><div>reserpina</div></div><div><div>E</div><div>galantamina</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1896	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti l'amfetamina è corretta?	<div><div><div>A</div><div>aumenta lo stato di veglia</div></div><div><div>B</div><div>possiede tutte le caratteristiche indicate</div></div><div><div>C</div><div>diminuisce il senso di fame</div></div><div><div>D</div><div>possiede solo due delle caratteristiche indicate</div></div><div><div>E</div><div>l'eulomero più attivo a livello del SNC corrisponde alla forma d</div></div></div>	Risposta esatta	B




N°	1897	Domanda	Il prezzo riportato sulla confezione dei medicinali per uso veterinario è il prezzo massimo al quale il medicinale può essere venduto al pubblico, anche da parte dei farmacisti in farmacia?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si, per tutti i medicinali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si, esclusivamente per i medicinali assoggettati a ricetta medico-veterinaria</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, per tutti i medicinali con l'eccezione degli omeopatici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>in nessun caso</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si, ma solo per i medicinali destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo</div></div>	Risposta esatta	A
N°	1898	Domanda	Il flumazenil	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>riduce i livelli di HDL nel plasma</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>viene utilizzato nella terapia dell'intossicazione da benzodiazepine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è il più potente antagonista dei recettori D3 per la dopamina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è un farmaco antiepilettico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>viene utilizzato nella terapia dell'insufficienza miocardica</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1899	Domanda	Quale dei seguenti prodotti NON viene usato come isotonizzante nella preparazione delle forme farmaceutiche liquide?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>acido bórico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>cloruro di sodio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>cellipiridinio cloruro</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>destrosio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1900	Domanda	La benzatina-penicillina G	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>passa normalmente la barriera ematoencefalica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è attiva nei confronti dei Gram-negativi anaerobi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si somministra per os</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è utile per il trattamento di faringiti da streptococco beta-emolitico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>è resistente alle beta-lattamasi</div></div>	Risposta esatta	D




N°	1901	Domanda	La fluovetina, avente la struttura indicata, interferisce con la trasmissione serotoninergica in quanto		
					
		<input type="radio"/> A	stimola i recettori 5-HT1	<input type="radio"/> A	ACE-inibitori
		<input type="radio"/> B	stimola i recettori 5-HT2	<input type="radio"/> B	alfa1-bloccanti
		<input type="radio"/> C	aumenta il catabolismo della serotonina	<input type="radio"/> C	beta-bloccanti
		<input type="radio"/> D	inibisce il reuptake neuronale della serotonina	<input type="radio"/> D	alfa2-agonisti sul SNC
		<input type="radio"/> E	libera serotonina dai terminali sinaptici	<input type="radio"/> E	diuretici
			Risposta esatta	D	Risposta esatta
N°	1902	Domanda	Il gene è		
		<input type="radio"/> A	un segmento di DNA che codifica un amminoacido	<input type="radio"/> A	durezza
		<input type="radio"/> B	un segmento di DNA che codifica una proteina completa	<input type="radio"/> B	solubilità
		<input type="radio"/> C	una tripletta di nucleotidi successivi presenti nell'mRNA	<input type="radio"/> C	stato fisico
		<input type="radio"/> D	una tripletta di nucleotidi successivi presenti nell'tRNA	<input type="radio"/> D	proprietà elettriche
		<input type="radio"/> E	una tripletta di nucleotidi successivi presenti nell'rRNA	<input type="radio"/> E	proprietà ottiche
			Risposta esatta	B	Risposta esatta
N°	1903	Domanda	La clonidina è il principio attivo presente in una delle specialità antipertensive utilizzabili per via transdermica. Esso appartiene alla classe dei farmaci		
		<input type="radio"/> A	ACE-inibitori		
		<input type="radio"/> B	alfa1-bloccanti		
		<input type="radio"/> C	beta-bloccanti		
		<input type="radio"/> D	alfa2-agonisti sul SNC		
		<input type="radio"/> E	diuretici		
			Risposta esatta	D	
N°	1904	Domanda	Quale delle proprietà sotto riportate è sicuramente identica per le sostanze polimeriche		
		<input type="radio"/> A	durezza		
		<input type="radio"/> B	solubilità		
		<input type="radio"/> C	stato fisico		
		<input type="radio"/> D	proprietà elettriche		
		<input type="radio"/> E	proprietà ottiche		
			Risposta esatta	C	


N°	1905	Domanda	Quante volte è spedibile una ricetta ripetibile che prescrive medicinali veterinari?		
			<div><div>A</div>cinque volte</div> <div><div>B</div>tre volte</div> <div><div>C</div>non è consentito l'uso di ricetta ripetibile per la prescrizione di medicinali veterinari</div> <div><div>D</div>tre e cinque volte per gli animali produttori di alimenti e da compagnia rispettivamente</div> <div><div>E</div>per il numero di volte indicato dal medico veterinario nel termine di un anno</div>		
				Risposta esatta	A
N°	1907	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di batteriostatico? Sostanza che		
			<div><div>A</div>uccide i batteri</div> <div><div>B</div>impedisce la crescita di batteri</div> <div><div>C</div>impedisce la crescita di microorganismi</div> <div><div>D</div>uccide i microorganismi</div> <div><div>E</div>combatte i virus</div>		
				Risposta esatta	B

N°	1906	Domanda	Quali fra le seguenti condizioni consente al farmacista, in caso di necessità e urgenza, di consegnare un medicinale assoggettato a prescrizione medica senza presentazione della relativa ricetta?		
			<div><div>A</div>paziente residente all'estero</div> <div><div>B</div>paziente affetto da patologia acuta</div> <div><div>C</div>paziente affetto da patologia cronica</div> <div><div>D</div>paziente con invalidità</div> <div><div>E</div>più di uno dei casi indicati</div>		
				Risposta esatta	C
N°	1908	Domanda	Per il trattamento di quale delle patologie indicate viene impiegata la griseofulvina?		
			<div><div>A</div>vaginiti da funghi</div> <div><div>B</div>infezioni sistemiche da Candida</div> <div><div>C</div>più di una di quelle indicate</div> <div><div>D</div>aspergillosi</div> <div><div>E</div>dermatofitosi</div>		
				Risposta esatta	E



1909	Domanda	L'acido acetilsalicilico viene completamente metabolizzato. Oltre all'acido salicilico derivante dalla disacetilazione, quali altri cataboliti prendono origine?	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div></div> <div><div>eteri ed esteri derivanti dalla glucuronazione</div><div>un prodotto di coniugazione con la glicina</div><div>prodotti di idrossilazione metabolica</div><div>solo due di quelli indicati</div><div>tutti quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	E
1911	Domanda	Il principio attivo pizotifene.	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div></div> <div><div>è utilizzato per la profilassi dell'emicrania</div><div>è sconsigliato in soggetti con insufficienza renale</div><div>non deve essere associato con l'assunzione di alcool</div><div>può dare sonnolenza</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E
1910	Domanda	Il clobifato, avente la struttura indicata, è indicato nelle iperlipidemie gravi in quanto	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div></div> <div><div></div><div>aumenta l'attività della lipoproteina lipasi</div><div>aumenta l'accumulo in particolari tessuti dei trigliceridi</div><div>riduce l'ossidazione di acidi grassi nel fegato</div><div>riduce la biosintesi di colesterolo</div><div>agisce sui centri del S.N.C. che controllano il contenuto lipidico dell'organismo</div></div>	Risposta esatta	A
1912	Domanda	Quale dei seguenti impieghi terapeutici non è previsto per i farmaci beta-bloccanti:	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div></div> <div><div>profilassi dell'emicrania</div><div>glaucoma ad angolo aperto</div><div>asma</div><div>ipertroidismo</div><div>profilassi dell'angina pectoris</div></div>	Risposta esatta	C


N°	1917	Domanda	I messaggeri chimici che agiscono nell'organismo vengono demoliti metabolicamente. Da quale di essi deriva il composto avente la formula rappresentata a lato e che corrisponde all'acido omovanillico (HVA)?	<div><div><input type="radio"/> A</div>adrenalina</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>noradrenalina</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>dopamina</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>istamina</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>serotonina</div>	Risposta esatta	C
<hr/>						
N°	1918	Domanda	La pulce agisce come vettore di quale elminta?	<div><div><input type="radio"/> A</div>Toxocara canis</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>Echinococco</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>Dipylidium caninum</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>Ancylostoma duodenale</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>Nessuna indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	C
<hr/>						
N°	1919	Domanda	Un medicinale contiene la pravastatina avente la struttura indicata. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	<div><div><input type="radio"/> A</div>agisce come inibitore dei sistemi enzimatici che presiedono alla sintesi dei trigliceridi</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>forma direttamente legami con il carbossile degli acidi biliari dell'intestino</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>forma direttamente legami con l'ossidrilie in posizione 3 del colesterolo</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>forma direttamente legami con l'ossidrilie libero dei digliceridi</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>agisce come inibitore dei sistemi enzimatici che presiedono alla sintesi del colesterolo</div>	Risposta esatta	E
<hr/>						
N°	1920	Domanda	Chi approva la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali?	<div><div><input type="radio"/> A</div>l'AlFA</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>il Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP)</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>il Ministro della Salute</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti (FON)</div>	Risposta esatta	D


N°	1921	Domanda	L'impiego dei dilatazioni, indicato in struttura, nella terapia dell'angina pectoris è basato su
			
		<input type="radio"/> A tutti i meccanismi elencati <input type="radio"/> B miglioramento della perfusione coronarica <input type="radio"/> C diminuzione delle resistenze periferiche <input type="radio"/> D diminuzione della forza di contrazione cardiaca <input type="radio"/> E diminuzione del doppio prodotto frequenza cardiaca per pressione arteriosa	Risposta esatta A


N°	1922	Domanda	Chi può firmare una ricetta?
		<input type="radio"/> A il solo medico chirurgo che prescrive un medicinale per uso umano <input type="radio"/> B solo il medico chirurgo ed il veterinario <input type="radio"/> C il medico chirurgo, il veterinario e l'odontoiatra <input type="radio"/> D solo il medico chirurgo o l'odontoiatra <input type="radio"/> E solo il medico chirurgo, l'odontoiatra e l'ostetrica	Risposta esatta C

N°	1923	Domanda	In quale caso il farmacista è obbligato ad indicare il dato relativo alla giacenza degli stupefacenti nel relativo registro cartaceo di entrata e uscita ?
		<input type="radio"/> A ogni volta che finisce la pagina <input type="radio"/> B esclusivamente per i movimenti relativi alle sostanze e non per le preparazioni <input type="radio"/> C esclusivamente per i movimenti relativi alle preparazioni e non per le sostanze <input type="radio"/> D quando la registrazione non prosegue alla pagina successiva e alla fine di ogni anno <input type="radio"/> E esclusivamente per gli stupefacenti da conservarsi in armadio chiuso a chiave	Risposta esatta D


N°	1924	Domanda	Mátricaría recutita L. è:
		<input type="radio"/> A la camomilla romana <input type="radio"/> B la camomilla comune <input type="radio"/> C un sinonimo di <i>Anthemís nobilis</i> L. <input type="radio"/> D nessuna indicazione è corretta <input type="radio"/> E Più di una indicazione è corretta	Risposta esatta B



N°	1925	Domanda	I principali bersagli dei farmaci biotecnologici sono localizzati:	<div><div>A</div>nel nucleo</div> <div><div>B</div>nel citoplasma</div> <div><div>C</div>sulle membrane cellulari</div> <div><div>D</div>nessuna indicazione è corretta</div> <div><div>E</div>in tutti i siti riportati</div>	Risposta esatta	C
N°	1927	Domanda	A che distanza l'una dall'altra devono essere collocate due farmacie istituite con il criterio demografico, situate in comuni diversi?	<div><div>A</div>200 metri</div> <div><div>B</div>500 metri</div> <div><div>C</div>1000 metri</div> <div><div>D</div>3000 metri</div> <div><div>E</div>non è previsto un limite di distanza</div>	Risposta esatta	E
N°	1926	Domanda	<div><div></div><div>Il verapamil, avente la struttura indicata, viene utilizzato nel trattamento delle aritmie atrioventricolari in quanto è un bloccante del</div></div>	<div><div>A</div>recettore beta adrenergico</div> <div><div>B</div>canale del Na⁺ voltaggio-dipendente</div> <div><div>C</div>canale del K⁺ voltaggio-dipendente</div> <div><div>D</div>canale del Ca²⁺ voltaggio-dipendente di tipo L</div> <div><div>E</div>recettore muscarinico cardiaco</div>	Risposta esatta	D
N°	1928	Domanda	Nella dispensazione di un purgante per os quale dei consigli sotto riportati è più corretto? Da assumere	<div><div>A</div>"subito dopo i pasti"</div> <div><div>B</div>"a digiuno"</div> <div><div>C</div>"prima dei pasti"</div> <div><div>D</div>"a intervalli regolari"</div> <div><div>E</div>"ad ore prefissate"</div>	Risposta esatta	B




N°	1929	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di ipovitaminosi?		N°	1931	Domanda	Chi fornisce al farmacista il bollettario buoni-acquisto degli stupefacenti approvato con DM 18/12/2006?	
		<div><div><div>A</div></div><div>malattia causata dalla carenza totale di vitamine nell'organismo</div></div>					<div><div><div>A</div></div><div>il Ministero della Salute</div></div>		
		<div><div><div>B</div></div><div>condizione clinica associata ad una carenza di vitamine nell'organismo</div></div>					<div><div><div>B</div></div><div>la A.S.L. di competenza</div></div>		
		<div><div><div>C</div></div><div>persone che non si nutrono di vitamine</div></div>					<div><div><div>C</div></div><div>i NAS</div></div>		
		<div><div><div>D</div></div><div>condizione clinica associata ad un apporto di vitamine non completo e bilanciato</div></div>					<div><div><div>D</div></div><div>l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato</div></div>		
		<div><div><div>E</div></div><div>eccesso di vitamine nella dieta</div></div>					<div><div><div>E</div></div><div>l'onere di approvvigionamento è a carico delle farmacie, ma può essere fornito dall'Ordine dei Farmacisti</div></div>		
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	E
N°	1930	Domanda	I barbiturici interferiscono con tutti i farmaci sottoelencati tranne che con :		N°	1932	Domanda	Con il termine "densità apparente" si intende	
		<div><div><div>A</div></div><div>gli antistaminici di prima generazione</div></div>					<div><div><div>A</div></div><div>il volume occupato da 1 g di sostanza solida</div></div>		
		<div><div><div>B</div></div><div>l'etanolo</div></div>					<div><div><div>B</div></div><div>il peso del volume apparente</div></div>		
		<div><div><div>C</div></div><div>l'isoniazide</div></div>					<div><div><div>C</div></div><div>il rapporto tra la porosità e la densità "vera"</div></div>		
		<div><div><div>D</div></div><div>la codeina</div></div>					<div><div><div>D</div></div><div>il volume apparente specifico</div></div>		
		<div><div><div>E</div></div><div>il metilfenidato</div></div>					<div><div><div>E</div></div><div>il peso di sostanza solida che occupa il volume di 1 ml</div></div>		
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	E




N°	1933	Domanda	Quale dei farmaci elencati può diminuire l'efficacia dei contraccettivi orali per aumento del metabolismo degli estrogeni:		N°	1935	Domanda	Quale dei seguenti antivirali si impiega come antinfluenzale?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>altropina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>Aciclovir</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>agonisti dei recettori beta adrenergici</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>Zidovudina</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>fenitoina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>Lamivudina</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>morfin</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>Adefovir</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>antagonisti dei recettori alfa adrenergici</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>Zanamivir</div>	
			Risposta esatta	C				Risposta esatta	E

N°	1934	Domanda	Il guaranà (semi di Paullinia cupana H.B.K.) è utilizzato in preparati anticellulite. L'attività lipolitica è riconducibile alla presenza di:		N°	1936	Domanda	Per poter essere definito "senza glutine" un alimento non deve contenere come residuo tollerabile di glutine:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>emulina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>più di 100 ppm</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>fisostigmina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>più di 200 ppm</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>caffeina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>più di 20 ppm</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>arecolina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>assenza totale di glutine</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>berberina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>dipende dalla tipologia dell'alimento (pane, pasta, biscotti, ecc.)</div>	
			Risposta esatta	C				Risposta esatta	C




N°	1937	Domanda	Per indicare i multipli ed i sottomultipli delle unità di misura si usano particolari prefissi. Quale delle sequenze sotto riportate, considerate andando da sinistra verso destra, indica un ordine DECRESCENTE dell'unità di misura	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>chilo, centi, deca</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>milli, nano, micro</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>micro, milli, centi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>mega, deca, pico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>etto, giga, tera</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1939	Domanda	L'effetto collaterale di maggior rilievo provocato a livello neurologico dai farmaci antipsicotici è costituito da	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>secchezza delle fauci</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>atassia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>nausea</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>abbassamento della soglia convulsiva</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>discinesia tardiva</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1940	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce la ciprofloxacina, avente la struttura indicata?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>DNA girasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>parete cellulare batterica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>metabolismo energetico della cellula batterica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sintesi proteica ribosomiale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>unità ribosomiale 30S</div></div>	Risposta esatta	A



N°	1941	Domanda	L'eparina è un polisaccaride	<div><div>A</div>nitrito</div> <div><div>B</div>solfato</div> <div><div>C</div>clorurato</div> <div><div>D</div>forniliato</div> <div><div>E</div>benzoliato</div>	Risposta esatta	B
N°	1943	Domanda	Come deve essere il segno esterno che il farmacista appone sui recipienti dei medicinali galenici allestiti in farmacia, quando si tratti di sostanze velenose?	<div><div>A</div>dicondato da un doppio segno rosso</div> <div><div>B</div>di dimensioni non inferiori a cm 3 x 2</div> <div><div>C</div>adatto e molto visibile</div> <div><div>D</div>Nessuna delle indicazioni è corretta</div> <div><div>E</div>in caratteri di altezza non inferiore a cm 1</div>	Risposta esatta	C
N°	1942	Domanda	La prelazione del Comune sulle farmacie che si rendono vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica:	<div><div>A</div>è consentita per la totalità delle farmacie messe a concorso</div> <div><div>B</div>è consentita ogni 4 anni</div> <div><div>C</div>è consentita per le sole farmacie rurali</div> <div><div>D</div>è consentita nei soli comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti</div> <div><div>E</div>è consentita per la metà delle sedi farmaceutiche</div>	Risposta esatta	E
N°	1944	Domanda	Alcuni farmaci agiscono come antagonisti indiretti di neurotrasmettitori in quanto inibiscono gli enzimi che, nell'organismo, intervengono nei processi di sintesi dei trasmettitori stessi. Quale, tra le coppie farmaco - enzima sotto elencate, rappresenta l'enzima ed il corrispondente inibitore?	<div><div>A</div>(carbidopa) - (DOPA- decarbossilasi)</div> <div><div>B</div>entacapone - (triptofano 5-idrossilasi)</div> <div><div>C</div>(selegilina) - (aldeide deidrogenasi mitocondriale)</div> <div><div>D</div>(captopril) - (tirosina idrossilasi)</div> <div><div>E</div>(benserazide) - (MAO-A)</div>	Risposta esatta	A


N°	1945	Domanda	Quale delle seguenti sostanze si comporta, in soluzione acquosa, come una base debole?	<div><div><div>A</div><div>atropina</div></div><div><div>B</div><div>benzocaina</div></div><div><div>C</div><div>codina</div></div><div><div>D</div><div>reserpina</div></div><div><div>E</div><div>tutti</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	1947	Domanda	La prazosina, riportato nella struttura indicata, è un antipertensivo appartenente alla classe dei	<div><div><div>A</div><div>diuretici</div></div><div><div>B</div><div>beta-bloccanti</div></div><div><div>C</div><div>alfa2-agonisti</div></div><div><div>D</div><div>alfa1-bloccanti</div></div><div><div>E</div><div>ACE-inibitori</div></div></div> <div><chem>COC1=CC=C2C(=C1)N(C(=N2)N3CCN(CC3)C(=O)C4=CC=CC=C4)C5=CC(OC)=CC(OC)=C5</chem></div>	Risposta esatta	D
N°	1948	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi è volatile e viene somministrato per inalazione:	<div><div><div>A</div><div>diazepam</div></div><div><div>B</div><div>aloperidolo</div></div><div><div>C</div><div>tiopentale</div></div><div><div>D</div><div>aldano</div></div><div><div>E</div><div>propofol (struttura indicata)</div></div></div> <div><chem>CC(C)c1ccc(O)c(C)c1</chem></div>	Risposta esatta	D



N°	1949	Domanda	Entro quale termine il farmacista deve denunciare la perdita dei buoni-acquisto stupefacenti?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>48 ore</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>24 ore</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>immediatamente</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>non esiste uno specifico termine ma è opportuno che la denuncia sia fatta subito</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>il farmacista non è tenuto a denunciare la perdita dei buoni acquisto</div></div></div></div>				
					Risposta esatta	B		
N°	1950	Domanda	Un agonista inverso è un principio attivo che produce	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un effetto agonista irreversibile</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>un effetto antagonista</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>un effetto antagonista parziale</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>un effetto farmacologico opposto a quello di un agonista</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono errate</div></div></div></div>			Risposta esatta	D


N°	1951	Domanda	Quale, tra le seguenti affermazioni, si avvicina maggiormente ai farmaci definiti come "soft-drug"?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>sono facilmente assorbiti</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>non determinano effetti tossici a carico del sistema gastrointestinale</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>non producono mai effetti tossici in quanto si utilizzano a dosaggi molto bassi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sono rapidamente degradati enzimaticamente per dare metaboliti sicuramente innocui</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sono assorbiti ed eliminati rapidamente così da non provocare effetti collaterali</div></div></div></div>			Risposta esatta	D
N°	1952	Domanda	La <i>Pseudomonas coli</i> è una condizione associata all'uso cronico di preparati a base di piante medicinali contenenti:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>oli essenziali</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antrachinoni</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tannini</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>alcaloidi tropanici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>muclliagni</div></div></div></div>			Risposta esatta	B




N°	1953	1954	1955
Domanda	Il cambiamento riflesso nella frequenza cardiaca associato alla somministrazione di metaprotenerolo (avente la struttura indicata) può essere bloccato con:	Per verificare lo scorrimento delle polveri quali sono, secondo la F.U., i metodi che vengono frequentemente citati:	La Tab. 2 della F.U. elenca "le sostanze di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste". Alcune delle sostanze elencate possono essere tenute come preparazioni farmaceutiche. In che carattere saranno indicate?
			
	<input type="radio"/> A propanololo <input type="radio"/> B prazosina <input type="radio"/> C neosigmina <input type="radio"/> D atropina <input type="radio"/> E clonidina	<input type="radio"/> A l'angolo di riposo <input type="radio"/> B l'indice di comprimibilità o l'indice di Hausner <input type="radio"/> C la velocità di scorrimento attraverso un orifizio <input type="radio"/> D la cella di taglio o di scorrimento <input type="radio"/> E tutti i metodi riportati	<input type="radio"/> A corsivo con o senza nota <input type="radio"/> B retto <input type="radio"/> C retto con o senza nota <input type="radio"/> D corsivo <input type="radio"/> E senza un carattere distintivo
Risposta esatta	A	B	A






N°	1957	Domanda	Quale delle indicazioni sotto riportate definisce i "farmaci generici"?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>prodotti galenici magistrali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>medicinali che hanno la stessa composizione quali-quantitativa e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento, ma non sono bioequivalenti col medicinale di riferimento</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>prodotti galenici ufficiali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>principi attivi ancora coperti da brevetto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>medicinali che hanno la stessa composizione quali-quantitativa e la stessa forma farmaceutica nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento</div></div>	Risposta esatta	E
N°	1959	Domanda	Nifedipina, diltazem e verapamil hanno strutture chimiche molto diverse pur appartenendo tutte alla classe dei Ca ²⁺ -antagonisti. Quale delle affermazioni sotto riportate e che prendono in esame le diverse caratteristiche farmacologiche delle tre sostanze è corretta?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>soltanto nifedipina e verapamil hanno proprietà antitirmitiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>soltanto diltazem e verapamil hanno proprietà antipertensive</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>la nifedipina si differenzia dagli altri due per le spiccate proprietà vasodilatatrici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>il diltazem agisce preferenzialmente sul muscolo liscio dei vasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>i tre farmaci non presentano differenze nelle proprietà antitirmitiche</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1960	Domanda	Tra i costituenti dei biofarmaci sono importanti:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>gli acidi grassi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>gli aminoacidi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>gli acidi nucleici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>gli acidi inorganici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>gli acidi polinsaturi</div></div>	Risposta esatta	B
N°	1958	Domanda	Come si prescrivono i medicinali veterinari contenenti stupefacenti della tabella II sez. A?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>con ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>con ricetta medico-veterinaria in duplice copia non ripetibile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>con ricetta ministeriale a ricalco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>con ricetta non ripetibile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>con ricetta medico-veterinaria in unica copia non ripetibile</div></div>	Risposta esatta	C



N°	1961	Domanda Il Sindaco deve dare il proprio nulla-osta alla esposizione in farmacia di cartelli che pubblicizzano medicinali?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>no, mai</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>sì, previo parere dell'Ordine Professionale</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>sì, sempre</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>no, se si tratta di campagne di vaccinazione autorizzate dal Ministero della Salute</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>no, occorre il nulla-osta della Camera di Commercio</div>	N°	1963	Domanda Secondo quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371 la ricetta spedita in regime di convenzione viene riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata e restituita entro 30 giorni nel caso in cui manchi	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>più di una risposta corretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>il cognome e nome dell'assistito</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>la data di spedizione e il timbro della farmacia</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>codice fiscale</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>timbro e/o firma del medico</div>	Risposta esatta	A
N°	1962	Domanda L'indice di rotazione (IR) del magazzino di una farmacia si può definire:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>il rapporto espresso in numero di pezzi tra la quantità del venduto e la sua giacenza media</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>il rapporto tra le merci giacenti in farmacia e l'incasso annuale</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>il rapporto tra il valore delle merci e degli arredi presenti in farmacia</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>il rapporto in valore tra la quantità del venduto e la sua giacenza media</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>più di una risposta è corretta</div>	N°	1964	Domanda Quanti ml, teorici, di NaOH 0,1 N sono necessari per titolare 10 ml di una soluzione 0,1 M di acido borico, in presenza di glicerina (indicatore fenolftaleina)?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>10 ml</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>1 ml</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>20 ml</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>2 ml</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>la domanda non ha senso perché le concentrazioni sono espresse in modo diverso</div>	Risposta esatta	A




N°	1965	Domanda	La mexiletina, avente la struttura indicata, è un antiaritmico in quanto	<input type="radio"/> A blocca i canali del calcio <input type="radio"/> B apre i canali del potassio <input type="radio"/> C iperpolarizza la cellula miocardica <input type="radio"/> D facilita il ripristino della normale conduzione atrioventricolare <input type="radio"/> E è un bloccante frequenza-dipendente dei canali del sodio	Risposta esatta	B
						
N°	1967	Domanda	Qual è l'attività farmacologica più rilevante che può essere ipotizzata per la diclofenina avente la struttura indicata?	<input type="radio"/> A Antistaminica - H2 <input type="radio"/> B Antimuscarinica <input type="radio"/> C Muscarinica <input type="radio"/> D Adrenergica <input type="radio"/> E Nicotinic	Risposta esatta	B
						
N°	1968	Domanda	L'utilizzo della croce verde nell'insegna è riservato:	<input type="radio"/> A alle farmacie <input type="radio"/> B alle parafarmacie <input type="radio"/> C agli studi veterinari <input type="radio"/> D alle farmacie e parafarmacie <input type="radio"/> E ai negozi di articoli sanitari	Risposta esatta	A




N°	1969	Domanda La desipramina è un composto a struttura tricyclica 6-7-8. In base alla sua struttura chimica, tale composto può essere classificato come antidepressivo	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>che inibisce prevalentemente il reuptake della serotonina</div><div>che inibisce prevalentemente le MAO</div><div>tricyclico con gruppo amminico primario</div><div>tricyclico con gruppo amminico secondario</div><div>tricyclico con gruppo amminico terziario</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	1971	Domanda La flocculazione di una sospensione può essere ottenuta per	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>aumento della viscosità</div><div>aumento del potenziale Z</div><div>riduzione del potenziale Z</div><div>riduzione della viscosità</div><div>aggliazione</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	1970	Domanda Il farmacia è tenuto ad annotare sull'etichetta, che appone sull'involucro dei medicinali galenici che allestisce in farmacia, la data di preparazione e la data entro la quale va utilizzato?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>no, solo la data di preparazione</div><div>si, sempre</div><div>si, ma solo per i medicinali per uso esterno</div><div>si, ma solo per i medicinali del formulario nazionale</div><div>no, deve indicarlo solo sulla ricetta</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	1972	Domanda Il Bevacizumab è un:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>principio attivo estratto da piante</div><div>composto ottenuto per sintesi chimica totale</div><div>anticorpo monoclonale umanizzato prodotto mediante la tecnica del DNA ricombinante</div><div>farmaco estratto da alghe</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	C




N°	1973	Domanda	Nella serie degli acidi anilipropionici quali il naprossene (struttura indicata) l'attività dipende fortemente da		N°	1975	Domanda	I farmacisti iscritti ad un Ordine Provinciale Italiano che si trasferiscono in un altro Paese membro della Comunità Europea		
				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>la presenza di un gruppo alchilico in posizione 4</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>la sostituzione del gruppo naftalenico</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>la sostituzione sull'anello benzenico</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>la stereochimica al carbonio in posizione 2</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>la presenza di un gruppo eterociclico</div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>devono conservare l'iscrizione all'Ordine Provinciale Italiano</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine Provinciale Italiano</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>non possono conservare l'iscrizione all'Ordine Provinciale Italiano</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>possono conservare l'iscrizione previo nulla-osta del Ministero della Salute</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>possono conservare l'iscrizione se hanno compiuto due anni di pratica professionale</div>			
				Risposta esatta	D				Risposta esatta	B


N°	1974	Domanda	Su quale delle seguenti porzioni del nefrone agiscono principalmente i diuretici inibitori dell'anidrasi carbonica?		N°	1976	Domanda	Quale delle seguenti funzioni azotate deve essere presente in un farmaco antimuscarinico perché, dopo assunzione orale, svolga esclusivamente a livello intestinale l'azione farmacologica spasmolitico-neurotrofa		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>Glomerulo</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>Tubulo contorto prossimale</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>Ansa di Henle</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>Tratto ascendente spesso dell'ansa</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>Tubulo e dotto collettore</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>amminica primaria (1)</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>quella indicata con (2)</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>quella indicata con (3)</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>ammonica quaternaria</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>quella indicata con (4)</div>			
				Risposta esatta	B				Risposta esatta	D



N°	1977	Domanda	Quale delle affermazioni sotto riportate è riguardante il principio attivo che va sotto il nome di algeidrato e corretta	Risposta esatta	B
		A	provoca diarrea		
		B	provoca stipsi		
		C	è un tartrato di alluminio e potassio		
		D	i prodotti che da esso si formano per reazione con l'acido gastrico sono poco solubili		
		E	più di una delle indicazioni fornite è corretta		
N°	1979	Domanda	Due medicinali "A" e "B" utilizzati come antiparkinson contengono levodopa e (<i>p</i> - <i>R</i>)-deprilil (struttura riportata) rispettivamente. Dovendo valutare la loro potenziale intercambiabilità, mantenendo costante il meccanismo di azione, quale delle seguenti affermazioni è corretta? I due medicinali	Risposta esatta	E
		A	sono intercambiabili perché presentano uguale meccanismo di azione		
		B	sono intercambiabili perché entrambi incrementano la biosintesi di dopamina		
		C	non sono intercambiabili perché il deprilil inibisce la monoammino ossidasi A (MAO-A)		
		D	non sono intercambiabili perché il deprilil agisce solo a livello periferico		
		E	non sono intercambiabili perché il deprilil inibisce la monoammino ossidasi B (MAO-B)		




1978	N°	Domanda	Cosa indica in un cosmetico il pittogramma, rappresentante un vasetto di crema aperto e un numero, seguito da una "M"?	1980	N°	Domanda	La digossina è:
		<input type="checkbox"/> A	il PAO (Period after Opening) espresso in mesi			<input type="checkbox"/> A	un glicoside naturale della <i>Digitalis lanata</i> Ehr.
		<input type="checkbox"/> B	La data scadenza			<input type="checkbox"/> B	un glicoside naturale della <i>Digitalis purpurea</i> L.
		<input type="checkbox"/> C	Indica la tipologia di materiale del contenitore			<input type="checkbox"/> C	un prodotto di parziale idrolisi del Lanatoside A
		<input type="checkbox"/> D	più di una indicazione è corretta			<input type="checkbox"/> D	un prodotto di parziale idrolisi del Lanatoside C
		<input type="checkbox"/> E	nessuna indicazione è corretta			<input type="checkbox"/> E	un prodotto di parziale idrolisi della ouabaina
			Risposta esatta A				Risposta esatta D



N°	1981	Domanda I farmaci antimuscarinici possono dare interazioni farmacologiche con tutte le seguenti classi di farmaci tranne una: indicare quale	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>digitalici</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>alfa1-bloccanti</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>oppioidi</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>anticolinesterasici</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>beta1-bloccanti</div>
----	------	---	---

Risposta esatta B





N°	1985	Domanda	Le intossicazioni da composti contenenti arsenico si trattano con	<div><div><div>A</div></div><div>edelfato di calcio</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>2,3-dimercaptopropanolo</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>8-idrossichinolina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>desferrioxamina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>8-metossichinolina</div></div>
----	------	---------	---	---

N°	1989	Domanda	Il decentramento delle farmacie è possibile se il numero degli abitanti non è aumentato?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no, è possibile solo se la popolazione sia aumentata almeno del 50% rispetto al rapporto farmacie/abitanti previsto dalla legge</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si, ma solo nei comuni fino a 12.500 abitanti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, ma solo nei comuni oltre i 12.500 abitanti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si, ma solo per le farmacie urbane</div></div>
Risposta esatta				C

N°	1991	Domanda	Acenocumarolo ed eparina sono due farmaci ad azione anticoagulante e	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>entrambi sono somministrati per via orale e ben assorbiti dalla mucosa gastrointestinale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>nessuno viene somministrato per via orale in quanto non vengono assorbiti dalla mucosa gastrointestinale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>solo acenocumarolo viene dato per via orale, come gli altri anticoagulanti cumarinici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>solo eparina viene somministrata oralmente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuno dei due è solubile in acqua</div></div>
Risposta esatta				C

N°	1990	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "trato" nella Denominazione Comune?		N°	1992	Domanda	I farmaci analoghi all'amfetamina provocano		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>Anticolesterolémici inibitori della HMG-CoA reductasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>Inibitori delle monoammino ossidasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>Solfonamidi antibatteriche</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>Antistaminici H1</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>Antiacidi idrati</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>diarrea</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>diminuzione dell'appetito</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>sono incoercibile</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>sensazione di fatica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>ipotensione</div>			
				Risposta esatta	E				Risposta esatta	B

N°	1993	Domanda	Gli SPAN sono esteri del sorbitano e vengono contraddistinti da numeri, ai quali corrisponde una o più catene di acido grasso ed il tipo di acido grasso. Quale delle seguenti combinazioni è corretta?		
			<div><input type="radio"/> A Span 20 - sorbitan monodoleato</div> <div><input type="radio"/> B Span 20 - sorbitan monopalmitato</div> <div><input type="radio"/> C Span 20 - sorbitan trioleato</div> <div><input type="radio"/> D Span 20 - sorbitan tristearato</div> <div><input type="radio"/> E Span 20 - sorbitan monolaurato</div>	Risposta esatta	E
N°	1994	Domanda	Il farmacista può essere sanzionato in sede disciplinare con la sospensione dall'esercizio della professione per cinque mesi?		
		<div><input type="radio"/> A no</div> <div><input type="radio"/> B sì, ma solo dal Prefetto</div> <div><input type="radio"/> C sì, ma solo dal Ministro della Salute</div> <div><input type="radio"/> D sì, ma solo dal Procuratore della Repubblica</div> <div><input type="radio"/> E sì, ma solo dal consiglio direttivo dell'Ordine dei Farmacisti</div>	Risposta esatta	E	
N°	1995	Domanda	Quale benzodiazepina è più indicata negli attacchi di panico?		
		<div><input type="radio"/> A Alprazolam</div> <div><input type="radio"/> B Clordiazepossido</div> <div><input type="radio"/> C Diazepam</div> <div><input type="radio"/> D Triazolam</div> <div><input type="radio"/> E Flurazepam</div>	Risposta esatta	A	
N°	1996	Domanda	Quale, tra i farmaci antimicrobici indicati, agisce sulla sintesi della parete cellulare batterica?		
		<div><input type="radio"/> A Trimetoprim</div> <div><input type="radio"/> B Vancomicina</div> <div><input type="radio"/> C Rifamicina</div> <div><input type="radio"/> D Eritromicina</div> <div><input type="radio"/> E Nitrofurantoina</div>	Risposta esatta	B	




N°	1997	Domanda	L'abuso di lassativi antrachinonici può indurre:	<div><div><div>A</div></div><div>ipoglicemia</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>disturbi neurologici</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>squilibri elettrolitici</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>più di una indicazione è corretta</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>atonia intestinale</div></div>	Risposta esatta	D
N°	1999	Domanda	La biotrasformazione epatica inducibile da parte di un farmaco avviene ad opera di enzimi situati:	<div><div><div>A</div></div><div>nel citosol</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>nei mitocondri</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>nel nucleo</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>nei microsomi</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nella membrana plasmatica</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2000	Domanda	Attraverso quale dei suoi gruppi funzionali l'aceticistaina, avente la formula indicata, esercita la sua attività mucolitica?	<div><chem>CC(=O)NCCSCC(=O)O</chem></div> <div><div><div>A</div></div><div>la funzione carbossilica</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>la funzione ammidica</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>la funzione tolica</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>la funzione carbonilica</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna di quelle indicate</div></div>	Risposta esatta	C
N°	1998	Domanda	A quale classe di farmaci appartiene il triazolam?	<div><chem>CN1C=NC2=C1N=CN2C3=CC=CC=C3Cl</chem></div> <div><div><div>A</div></div><div>antimalarici</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>antiemetici</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>procinetici</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>antimetici</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>ipnotici</div></div>	Risposta esatta	E




N°	2001	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il metil mercurio è corretta? L'intossicazione:
		<div><div><div>A</div><div>può presentarsi con segni di neurotossicità</div></div><div><div>B</div><div>è possibile dopo elevato consumo cronico di pesci predatori</div></div><div><div>C</div><div>non è pericolosa in gravidanza</div></div><div><div>D</div><div>due delle indicazioni sono corrette</div></div><div><div>E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div>	
		Risposta esatta	D

N°	2002	Domanda	Con quali modalità si devono effettuare le anidazioni nel registro entrata e uscita stupefacenti ?
		<div><div><div>A</div><div>utilizzando esclusivamente inchiostro indelebile</div></div><div><div>B</div><div>apponendo una firma autografa in calce ad ogni movimento in entrata o in uscita</div></div><div><div>C</div><div>con due diverse numerazioni progressive per l'entrata e per l'uscita</div></div><div><div>D</div><div>con unica numerazione progressiva per i movimenti in entrata ed i movimenti in uscita</div></div><div><div>E</div><div>registrando su pagine separate i movimenti in entrata ed i movimenti in uscita</div></div></div>	
		Risposta esatta	D


N°	2003	Domanda	La d-tubocurarina paralizza la muscolatura scheletrica perché agisce
		<div><div><div>A</div><div>sulla conduzione dell'impulso lungo la fibra motoria</div></div><div><div>B</div><div>sulla liberazione di acetilcolina dalla fibra motoria</div></div><div><div>C</div><div>sulla placca neuromuscolare</div></div><div><div>D</div><div>sulla membrana della fibra muscolare striata</div></div><div><div>E</div><div>sulle strutture contrattili del muscolo striato</div></div></div>	
		Risposta esatta	C

N°	2004	Domanda	Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, il marchio CE:
		<div><div><div>A</div><div>può essere sostituito da una qualsiasi dicitura che indichi che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali</div></div><div><div>B</div><div>è riportato nella norma UNI CEI EN 950 relativa ai simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici</div></div><div><div>C</div><div>deve avere dimensione verticale non inferiore a 10 mm</div></div><div><div>D</div><div>pur rispettando il corretto rapporto delle dimensioni, deve corrispondere al simbolo </div></div><div><div>E</div><div>non può essere ingrandito o ridotto rispetto al simbolo grafico riprodotto nell'Allegato XI del D. Lgs. 332/2000</div></div></div>	
		Risposta esatta	D



N°	2005	Domanda	Chi assume la responsabilità della vendita al dettaglio dei medicinali veterinari da parte di grossisti autorizzati?	<div><div><div>A</div><div>il direttore tecnico</div></div><div><div>B</div><div>il laureato in Farmacia o in CTF, o in Chimica iscritto al relativo Albo professionale</div></div><div><div>C</div><div>la persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista</div></div><div><div>D</div><div>nessuno in quanto tale vendita da parte del grossista non è consentita</div></div><div><div>E</div><div>il legale rappresentante</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2007	Domanda	Le indagini diagnostiche attraverso la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) utilizzano radiazioni elettromagnetiche che, rispetto ai valori che rientrano nel campo del visibile, sono	<div><div><div>A</div><div>ad energia di gran lunga minore</div></div><div><div>B</div><div>a lunghezza d'onda di gran lunga maggiore</div></div><div><div>C</div><div>a lunghezza d'onda ed energia molto più piccole</div></div><div><div>D</div><div>a lunghezza d'onda comparabili</div></div><div><div>E</div><div>a lunghezza d'onda più bassa</div></div></div>	Risposta esatta	E

N°	2006	Domanda	Quale, tra le coppie farmaco - enzima sotto elencate, rappresenta l'enzima ed il corrispondente inibitore?	<div><div><div>A</div><div>Carbidopa - aldeide deidrogenasi</div></div><div><div>B</div><div>Selegilina - alcool deidrogenasi</div></div><div><div>C</div><div>alfa-Metildopa - Monoamminossidasi (MAO)-B</div></div><div><div>D</div><div>Nessuna tra quelle indicate</div></div><div><div>E</div><div>Fisostigmina - acetilcolinesterasi</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2008	Domanda	La legge delle 4 P (place, promotion, price, product) si deve applicare:	<div><div><div>A</div><div>al prezzo di acquisto</div></div><div><div>B</div><div>al prezzo di vendita</div></div><div><div>C</div><div>al prezzo dei prodotti OTC</div></div><div><div>D</div><div>al prezzo dei prodotti dietetici</div></div><div><div>E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div>	Risposta esatta	E



N°	2009	Domanda	Un alimento destinato a fini medici speciali secondo il DPR 20 marzo 2002, n. 57 ricade tra:	N°	2011	Domanda	La vincristina è particolarmente tossica a livello di:	
		<div><div><div>A</div></div><div>gli integratori alimentari</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>i farmaci</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>i prodotti destinati ad una alimentazione particolare</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>gli alimenti addizionati di vitamine e minerali</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>i dispositivi medici</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>S.N.C.</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>cuore</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>polmoni</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>colon</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>vasi</div></div>		
			Risposta esatta	C			Risposta esatta	A

N°	2010	Domanda	L'antidepressivo paroxetina agisce bloccando	N°	2012	Domanda	I ganglioplegici interferiscono con la trasmissione sinaptica a livello gangliare in quanto	
		<div><div><div>A</div></div><div>selettivamente il reuptake di noradrenalina e dopamina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>selettivamente la sintesi di serotonina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>selettivamente il reuptake di serotonina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>la sintesi di dopamina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>selettivamente il reuptake di acetilcolina</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>antagonizzano indistintamente tutti i recettori colinergici e adrenergici a livello gangliare</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>bloccano solo i gangli parasimpatici</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>bloccano solo i gangli simpatici</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>esercitano un'azione antagonista competitiva sui recettori colinergici di tipo muscarinico</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>bloccano l'azione dell'acetilcolina sui recettori nicotinici dei gangli simpatici e parasimpatici</div></div>		
			Risposta esatta	C			Risposta esatta	E




N°	2013	Domanda	Un dispositivo medico, per essere posto in commercio in Italia deve essere:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>certificato dal Ministero della Salute;</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>autorizzato da una qualsiasi Autorità competente di un paese dell'Unione Europea;</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>essere marcato CE secondo le procedure previste dalla direttiva europea che lo regola;</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>essere autorizzato dalla Commissione Europea.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>autorizzato all'immissione in commercio da parte del Ministero della Salute</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2015	Domanda	La rivastigmina, un inibitore della acetilcolinesterasi, può trovare impiego:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>come antistaminico H1</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>come antiasmatico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>come antispasmodico intestinale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nel trattamento del morbo di Alzheimer</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>come antidiabetico</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2016	Domanda	Il Macrogol è una miscela di polimeri dalla formula $H(OCH_2CH_2)_nOH$. Quale dei seguenti saggi è indicativo della massa molecolare media.	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>aspetto della soluzione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>misura del pH</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>indice di idrossile</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>contenuto di ossido di etilene</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>potere riducente</div></div>	Risposta esatta	C



N°	2017	Domanda	Il termine medicinale è stato correttamente definito	<div><div><div>A</div></div><div>da monografia della F.U.</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>dall'AIFA con propria circolare</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>dai Titolo I del D.Lgs.vo 219/2006</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>dall'Organizzazione mondiale della sanità</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>dai Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Finanze</div></div>
----	------	---------	--	--

Risposta esatta


C




N°	2021	Domanda	La NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) rappresenta:	N°	2023	Domanda	Una reazione avversa da farmaco è definita grave se:
		<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div>la massima dose che non produce effetti tossici</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div>la minima dose che non produce effetti tossici</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div>la massima dose tollerabile</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div>la minima dose tollerabile</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div>				<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div>ha esito fatale</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div>richiede un ricovero ospedaliero o prolunga un ricovero già in corso</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div>comporta anomalie congenite/deficit alla nascita</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div>tutte le indicazioni meno una sono corrette</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div>	
		Risposta esatta	A			Risposta esatta	E

N°	2022	Domanda	L'assunzione di due farmaci che presentano lo stesso valore di indice terapeutico (rapporto tra DL50 e DE50) comportano rischi che sono	N°	2024	Domanda	Quale dei farmaci elencati può indurre, in pazienti geneticamente predisposti, la ipertermia maligna:
		<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div>identici</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div>diversi quando l'altezza delle due curve dose-risposta è diversa</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div>diversi quando l'inclinazione delle due curve dose-risposta è diversa</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div>diversi quando l'inclinazione delle due curve dose-risposta è identica</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div>diversi quando l'altezza delle due curve dose-risposta è identica</div></div></div>				<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div>furosemide</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div>vecuronio</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div>suxametonio</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div>nadololo</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div><div>trimefano</div></div></div>	
		Risposta esatta	C			Risposta esatta	C

N°	2025	Domanda	In quale caso è consentita la consegna frazionata di medicinali prescritti con ricetta ripetibile?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>in nessun caso</div><div>solo nei casi in cui la prescrizione comporta la dispensazione di più di cinque confezioni</div><div>solo nei casi in cui si tratti di medicinali particolarmente costosi</div><div>nei casi in cui sia prescritto un numero di confezioni superiore all'unità</div><div>quando la terapia ha una durata superiore a tre mesi</div></div>			
					Risposta esatta	D	
							Risposta esatta C
N°	2027	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "oxacina" nella Denominazione Comune?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>bloccanti adrenergici</div><div>antipidrenici della classe dell'acido fenossibutirico</div><div>antibatterici correlati all'acido nalidissico</div><div>ormoni estrogeni</div><div>antistaminici H2</div></div>			
N°	2028	Domanda	Quale reazione di fase II è la principale responsabile della detossificazione dei composti reattivi formati in fase I?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>coniugazione con amminoacidi</div><div>coniugazione con glutatione</div><div>acetilazione</div><div>solfatazione</div><div>due delle indicazioni sono corrette</div></div>			
					Risposta esatta	B	




N°	2029	Domanda	Il cotrimossazolo è costituito da una associazione di	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>sulfametossazolo e trimetoprim</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sulfamoxolo e trimetoprim</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tetrazoprima e sulfadiazina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>pirimetamina e sulfadoxina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>pirimetamina e sulfalene</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2031	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "cillina" nella Denominazione Comune? A quella a cui appartiene il principio attivo	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>cefazidina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ottenibile dall'acido 7-aminocefalosporanico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>avente la struttura indicata a lato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>cefalexina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>le indicazioni fornite sono tutte errate</div></div>	Risposta esatta	E





N°	2030	Domanda	L'attività nei confronti dei batteri Gram-negativi dell'ampicillina è principalmente dovuta a	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>particolare sensibilità verso tali prodotti delle transpeptidasi dei batteri Gram-negativi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>capacità di superare la membrana esterna della parete batterica dei batteri Gram-negativi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>mananza di beta-lattamasi specifiche nei batteri Gram-negativi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>particolare resistenza alle beta-lattamasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>un meccanismo fino ad ora rimasto sconosciuto</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2032	Domanda	L'apporto di vitamine e minerali negli integratori:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>non è soggetto ad alcuna limitazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>deve essere sempre compreso tra il 30 e il 150% della dose giornaliera raccomandata (RDA)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>deve essere evidenziato in etichetta come % delle relative dosi giornaliere raccomandate (RDA)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>va indicato solo come tenore ponderale.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>deve essere almeno pari al 100% delle dosi giornaliere raccomandate (RDA) con le quantità di assunzione indicate</div></div>	Risposta esatta	C



N°	2033	Domanda	Per preparare una tintura F.U. dal relativo estratto fluido (EF) occorre diluire quest'ultimo con:	<div><div>A</div>acqua depurata</div> <div><div>B</div>una miscela idroalcolica al 20% in volume</div> <div><div>C</div>una miscela idroalcolica al 50% in volume</div> <div><div>D</div>una miscela idroalcolica al 70% in volume</div> <div><div>E</div>una miscela idroalcolica alla stessa gradazione dell'EF impiegato</div>	Risposta esatta	E
N°	2035	Domanda	Il monitoraggio dei livelli plasmatici dei farmaci antiepilettici:	<div><div>A</div>si esegue dopo il raggiungimento dello "steady-state"</div> <div><div>B</div>si esegue dopo la prima somministrazione</div> <div><div>C</div>è del tutto inutile</div> <div><div>D</div>si esegue solo se si associano più farmaci antiepilettici</div> <div><div>E</div>non può essere eseguito nel corso della gravidanza</div>	Risposta esatta	A
N°	2036	Domanda	L'azione della cloroquina nella malaria da P. falciparum consiste nell'eliminazione di	<div><div>A</div>schizonti tissutali secondari</div> <div><div>B</div>schizonti esoeritrocitari</div> <div><div>C</div>schizonti endoeritrocitari</div> <div><div>D</div>forme asessuate</div> <div><div>E</div>sporozoit</div>	Risposta esatta	C




N°	2037	Domanda	Può il farmacista esporre in farmacia cartelli che pubblicizzano un medicinale?	<div><div><div>A</div><div>si, se si tratta di pubblicità autorizzata</div></div><div><div>B</div><div>si, a condizione che si tratti di un medicinale da banco</div></div><div><div>C</div><div>si, sempre</div></div><div><div>D</div><div>si, se si tratta di medicinale non coperto da brevetto</div></div><div><div>E</div><div>no, a meno che non ottenga apposito attestato di congruità dall'Ordine</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2039	Domanda	Il salmeterolo, avente la struttura indicata, è un farmaco antiasmatico in quanto è:	<div><div><div>A</div><div>agonista selettivo dei recettori beta1</div></div><div><div>B</div><div>agonista selettivo dei recettori beta2</div></div><div><div>C</div><div>antagonista selettivo dei recettori alfa2</div></div><div><div>D</div><div>antagonista selettivo dei recettori alfa1</div></div><div><div>E</div><div>antagonista selettivo dei recettori beta2</div></div></div> <div><chem>Oc1ccc(cc1)C(O)N(CCCOCCc2ccccc2)C</chem></div>	Risposta esatta	B
N°	2040	Domanda	Quale, tra gli enzimi seguenti, NON partecipa alla formazione della melatonina nell'organismo?	<div><div><div>A</div><div>Avilamina acetiltransferasi</div></div><div><div>B</div><div>Avomalto L-amminoacido decarbossilasi</div></div><div><div>C</div><div>Dopamina beta-idrossilasi</div></div><div><div>D</div><div>Triptofan 5-idrossilasi</div></div><div><div>E</div><div>più di uno di quelli indicati</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2038	Domanda	Le specialità "A" e "B" contengono, rispettivamente, i principi attivi ondansetron e granisetron. Quale delle affermazioni che riguardano questi principi attivi è corretta? Agiscono entrambi come	<div><div><div>A</div><div>agonisti del recettore D2</div></div><div><div>B</div><div>antagonisti del recettore 5-HT3</div></div><div><div>C</div><div>agonisti del recettore 5-HT3</div></div><div><div>D</div><div>antagonisti del recettore D2</div></div><div><div>E</div><div>antagonisti del recettore H1</div></div></div>	Risposta esatta	B




N°	2041	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce la mezlocillina, avente la struttura indicata?		
			 <p>R = </p>	<input type="radio"/> A sintesi degli acidi nucleici della cellula batterica <input type="radio"/> B membrana citoplasmatica <input type="radio"/> C sintesi della parete cellulare batterica <input type="radio"/> D sintesi proteica ribosomiale <input type="radio"/> E metabolismo energetico della cellula batterica	Risposta esatta C
N°	2042	Domanda	Entro quanti giorni deve essere inoltrata alla A.S.L. di competenza la copia azzurra della ricetta medica veterinaria in triplice copia?	<input type="radio"/> A 10 giorni <input type="radio"/> B 7 giorni <input type="radio"/> C 15 giorni <input type="radio"/> D 20 giorni <input type="radio"/> E 30 giorni	Risposta esatta B
N°	2043	Domanda	A quale delle seguenti classi appartengono i marker farmacologici di <i>Serenoa repens</i> Smalt. ?	<input type="radio"/> A alcaloidi <input type="radio"/> B lipidi e steroli <input type="radio"/> C flavonoidi <input type="radio"/> D tannini <input type="radio"/> E polisaccaridi	Risposta esatta B
N°	2044	Domanda	Il ginseng (radice di <i>Panax ginseng</i> Meyer) può dare interazioni farmacologiche di tipo farmacodinamico con farmaci:	<input type="radio"/> A stimolanti del Sistema Nervoso Centrale <input type="radio"/> B ipoglicemizzanti orali <input type="radio"/> C antitubercolosi <input type="radio"/> D tutte le indicazioni tranne una sono corrette <input type="radio"/> E tutte le indicazioni sono corrette	Risposta esatta D




N°	2045	Domanda Le materie prime da cui si parte per la preparazione dei materiali di base o ceppi onepatci possono essere di origine: <div><div><div>A</div><div>minerale</div></div><div><div>B</div><div>vegetale</div></div><div><div>C</div><div>animale</div></div><div><div>D</div><div>chimica</div></div><div><div>E</div><div>tutte quelle indicate</div></div></div>			Risposta esatta E
N°	2047	Domanda Due soluzioni acquose presentano valori diversi del punto di gelo. Se la prima gela ad una temperatura più elevata rispetto alla seconda vuol dire che nei confronti di quest'ultima essa è: <div><div><div>A</div><div>isomollica</div></div><div><div>B</div><div>isotonica</div></div><div><div>C</div><div>ipertonica</div></div><div><div>D</div><div>ipotonica</div></div><div><div>E</div><div>con identica concentrazione</div></div></div>			Risposta esatta D
N°	2048	Domanda Le decisioni adottate dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sono impugnabili? <div><div><div>A</div><div>si, innanzi al Prefetto</div></div><div><div>B</div><div>si, innanzi al Ministro della Sanita'</div></div><div><div>C</div><div>si, innanzi alla Federazione Ordini farmacisti italiani</div></div><div><div>D</div><div>si, innanzi alla Corte di Cassazione a sezioni unite</div></div><div><div>E</div><div>no</div></div></div>			Risposta esatta D




N°	2049	Domanda	La profondità di penetrazione nell'albero respiratorio dei farmaci assunti per aerosol è correlata:		N°	2051	Domanda	La benzilpenicillina presenta carattere acido in quanto contiene:	
			<div><div><div>A</div>a più di una delle proprietà indicate</div><div><div>B</div>alla lipofilia</div><div><div>C</div>alla idrofilia</div><div><div>D</div>alle dimensioni delle particelle</div><div><div>E</div>a nessuna delle proprietà indicate</div></div>					<div><div><div>A</div>un gruppo -CO₂H libero</div><div><div>B</div>due gruppi -CO₂H liberi</div><div><div>C</div>tre gruppi -CO₂H liberi</div><div><div>D</div>un gruppo -OH fenolico</div><div><div>E</div>un gruppo carbossilico libero ed un gruppo -OH fenolico</div></div>	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	A


N°	2050	Domanda	Quale indicazione terapeutica della nitroglicerina avente la struttura indicata?		N°	2052	Domanda	Se un farmaco si distribuisce uniformemente nell'acqua dell'organismo, il suo volume apparente di distribuzione (espresso in litri) è circa:	
								<div><div><div>A</div>150</div><div><div>B</div>5</div><div><div>C</div>40</div><div><div>D</div>15</div><div><div>E</div>90</div></div>	



N°	2053	Domanda	Gli alimenti destinati alle esigenze nutrizionali particolari dei diabetici sono:	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>alimenti di consumo corrente</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>integratori alimentari</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>prodotti dietetici</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>alimenti a ridotto tenore di carboidrati e grassi</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>alimenti ricchi in fibra</div></div></div></div></div><div>Risposta esatta</div><div>C</div></div></div></div>
N°	2054	Domanda	Quale delle seguenti piante medicinali trova comune impiego nei disturbi della menopausa?	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>Calendula (<i>Calendula officinalis</i> L.)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>Psillio (<i>Plantago psyllum</i> L.)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>Echinacea (<i>Echinacea</i> spp.)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>Cimicifuga (<i>Cimicifuga racemosa</i> Nutt.)</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>Gerziana (<i>Gentiana lutea</i> L.)</div></div></div></div></div><div>Risposta esatta</div><div>D</div></div></div></div>
N°	2055	Domanda	Il cioramfenicolo (struttura indicata) può rappresentare un'alternativa terapeutica nelle infezioni sostenute da:	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><i>Staphylococcus</i> spp.</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><i>Rickettsia</i> spp.</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><i>Mycobacterium tuberculosis</i></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><i>Pneumococcus</i> spp.</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div><i>Corynebacterium diphtheriae</i></div></div></div></div></div><div>Risposta esatta</div><div>B</div></div></div></div>
N°	2056	Domanda	Con il termine "void" si definisce	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div>il volume assoluto di una polvere</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div>il volume apparente delle particelle di una polvere</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div>il volume vero di una polvere</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div>lo spazio tra le particelle di una polvere</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div>nessuna delle indicazioni fornite</div></div></div></div></div><div>Risposta esatta</div><div>D</div></div></div></div>



N°	2057	Domanda I farmaci elencati sono impiegati nell'asma bronchiale. Quale di essi non ha azione broncodilatante diretta:	<div><div>A</div>ipratropio</div> <div><div>B</div>nedocromil</div> <div><div>C</div>terbutalina</div> <div><div>D</div>teofilina</div> <div><div>E</div>salmeterolo</div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>
N°	2059	Domanda La corretta conservazione di una preparazione galenica magistrale dipende:	<div><div>A</div>dalla scelta del contenitore</div> <div><div>B</div>dalla corretta definizione delle procedure tecniche di preparazione</div> <div><div>C</div>dalle condizioni ambientali di conservazione (temperatura, umidità, riparo dalla luce)</div> <div><div>D</div>tutte le indicazioni sono corrette</div> <div><div>E</div>due indicazioni sono corrette</div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	2058	Domanda La somministrazione di vaccini dovrebbe essere evitata in pazienti che assumono corticosteroidi ad alte dosi in quanto questi:	<div><div>A</div>interferiscono con l'assorbimento</div> <div><div>B</div>diminuiscono la risposta immunitaria</div> <div><div>C</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div> <div><div>D</div>interferiscono con l'eliminazione</div> <div><div>E</div>potenziano la risposta immunitaria</div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>
N°	2060	Domanda Gli antimicotici della serie degli imidazoli devono la loro attività	<div><div>A</div>al blocco della sintesi del colesterolo</div> <div><div>B</div>al blocco della sintesi dell'ergosterolo</div> <div><div>C</div>alla disaggregazione della membrana fungina</div> <div><div>D</div>alla formazione di canali ionici spuri che alterano l'omeostasi cellulare</div> <div><div>E</div>al blocco della topoisomerasi fungina</div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>




N°	2061	Domanda	Il farmacista è tenuto ad apporre sulle ricette ripetibili che prescrivono medicinali di origine industriale il timbro attestante la vendita del prodotto?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>no, mai</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>si, ma solo per le ricette del servizio sanitario nazionale</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>si, sempre</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>no, se viene rilasciato scontrino fiscale</div></div>
----	------	---------	--	--

☐

E

☐

si, ma solo per le ricette spedite al di fuori del servizio sanitario nazionale




N°	2065	Domanda	Quale delle seguenti proprietà delle polveri non appartiene alle "fondamentali"?	N°	2067	Domanda	I curari sono	Risposta esatta	A
		<input type="checkbox"/> A	porosità			<input type="checkbox"/> A	antagonisti nicotinici		
		<input type="checkbox"/> B	dimensione delle particelle			<input type="checkbox"/> B	agonisti nicotinici		
		<input type="checkbox"/> C	intervallo dimensionale delle particelle			<input type="checkbox"/> C	agonisti beta-adrenergici		
		<input type="checkbox"/> D	forma delle particelle			<input type="checkbox"/> D	antagonisti beta-adrenergici		
		<input type="checkbox"/> E	area superficiale delle particelle			<input type="checkbox"/> E	agonisti dopaminergici		

N°	2066	Domanda	Le fenzidiazine non interferiscono con:	N°	2068	Domanda	Il trattamento terapeutico dell'avvelenamento da CO si basa su	Risposta esatta	B
		<input type="checkbox"/> A	alcol			<input type="checkbox"/> A	trasfusione di sangue		
		<input type="checkbox"/> B	antistaminici di prima generazione			<input type="checkbox"/> B	somministrazione di ossigeno iperbarico		
		<input type="checkbox"/> C	antidepressivi tricyclici			<input type="checkbox"/> C	somministrazione di farmaci broncodilatatori		
		<input type="checkbox"/> D	antiparkinson			<input type="checkbox"/> D	trasfusione di sangue e somministrazione di ossigeno iperbarico		
		<input type="checkbox"/> E	digitalici			<input type="checkbox"/> E	somministrazione di azoto e di ossigeno		



N°	2069	Domanda	Il grado di dissoluzione di un farmaco che si comporta come una base debole può essere aumentato da		N°	2071	Domanda	Quale di queste proprietà è un'importante determinante del legame di un farmaco alle proteine plasmatiche:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div> aumento delle dimensioni delle particelle del solido</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div> idrofilia</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div> aumento della viscosità del mezzo</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div> piccole dimensioni molecolari</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div> diminuzione del pH del mezzo</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div> struttura ammoniaca quaternaria</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div> nessuna delle indicazioni è corretta</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div> elevata polarità</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div> tutte le indicazioni sono corrette</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div> lipofilia</div>	
			Risposta esatta	C				Risposta esatta	E

N°	2070	Domanda	Una delle classificazioni dei principi attivi dei farmaci più utilizzata in Europa è quella che viene indicata come ATC (Anatomico-Terapeutico-Chimica). Indicando i principi attivi secondo la classificazione citata, quale delle coppie sottoriportate comprende farmaci più simili per quanto riguarda il meccanismo di azione e la struttura		N°	2072	Domanda	Le polveri come tali rappresentano una forma farmaceutica?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div> N01AB01 e M01AB01</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div> sì</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div> M01AB02 e M01AB08</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div> sì, se compatte</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div> M02AB01 e M01AC01</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div> sì, se in forma di granuli</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div> R01AB05 e M01AB05</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div> sì, perché fanno parte di compresse e capsule</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div> M01AB e M01AC</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div> no</div>	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	A



N°	2073	Domanda	Gli analoghi del GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormon) si somministrano attraverso tutte le seguenti vie, eccetto quella:	N°	2075	Domanda	E' consentito il trasferimento della farmacia in locali che si trovano in una diversa sede farmaceutica?	
			<div><div><div>A</div></div><div>intramuscolare</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>sottocutanea</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>sottocutanea "depot"</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>orale</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>intrasale</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>si, sempre</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>no</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>si, previa autorizzazione dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>si, previa autorizzazione della A.S.L.</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>si, ma solo nell'ipotesi di sentenza di sfratto esecutivo del locale</div></div>	
			Risposta esatta	D			Risposta esatta	B

N°	2074	Domanda	Molti sali di calcio trovano applicazione in terapia. Tra le sequenze di sali sotto indicate quale è quella che esprime un contenuto DECRESCENTE di calcio quando si somministrano quantità equimolecolari dei sali sotto indicati?	N°	2076	Domanda	I semi di ipomea viciaea sono annoverati tra le "smart drugs". Quali dei seguenti principi sono contenuti nella droga?	
	<div><div><div>CaCO₃</div><div>CARBONATO</div></div><div><div><div>C₂H₂CaO₄</div><div>FORMIATO</div></div><div><div><div>C₆H₁₀CaO₆</div><div>LATTATO</div></div></div></div></div>		<div><div><div>A</div></div><div>lattato-carbonato-formiato</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>nessuna di quelle indicate</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>formiato-carbonato-lattato</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>tutte quelle indicate</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>lattato-formiato-carbonato</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>cannabinoidi</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>derivati dell'acido lisergico</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>oppioidi</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>sostanze amfetaminosimili</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle sostanze indicate</div></div>	
			Risposta esatta	B			Risposta esatta	B


N°	2077	Domanda	Il disulfiram, avente la formula indicata, è un farmaco usato nel trattamento dell'alcolismo cronico perché	N°	2079	Domanda	Un farmaco avente carattere acido può essere assorbito molto rapidamente nello stomaco se il valore del pH gastrico		
		<div><chem>CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC</chem><div></div></div>	<div><div><div>A</div> accelera la metabolizzazione dell'alcool etilico ad acido acetico</div><div><div>B</div> accelera il metabolismo dell'acetaldeide, prodotto intermedio del metabolismo dell'etanolo</div><div><div>C</div> inibisce la metabolizzazione dell'acetaldeide</div><div><div>D</div> interferisce con la metabolizzazione dell'alcool a diellietere</div><div><div>E</div> interferisce con la metabolizzazione dell'alcool ad acetone</div></div>			<div><div><div>A</div> provoca la precipitazione del farmaco nel succo gastrico</div><div><div>B</div> è aumentato a causa della contemporanea somministrazione di cimetidina</div><div><div>C</div> è inferiore di almeno due unità al valore del pKa del farmaco</div><div><div>D</div> è superiore di almeno due unità al valore del pKa del farmaco</div><div><div>E</div> è uguale al valore del pKa del farmaco</div></div>	Risposta esatta	C	
N°	2078	Domanda	Una preparazione galenica in cartine prescrive: cimetidina g 0,2 e lattosio g 0,5. Quale delle seguenti osservazioni è corretta?	N°	2080	Domanda	L'acido clavulamico inibisce:		
		<div><div><div>A</div> può essere usata nell'ipocloridria gastrica</div><div><div>B</div> il lattosio ha azione sinergica con il principio attivo</div><div><div>C</div> può inibire il metabolismo di altri farmaci</div><div><div>D</div> può essere spedita solo con ricetta speciale</div><div><div>E</div> deve essere assunta a digiuno</div></div>	Risposta esatta	C			<div><div><div>A</div> le beta-lattamasi</div><div><div>B</div> la sintesi della parete batterica</div><div><div>C</div> la transpeptidazione</div><div><div>D</div> la transglicosilasi</div><div><div>E</div> il distacco di D-Ala</div></div>	Risposta esatta	A




N°	2081	Domanda	Tra le informazioni nutrizionali da riportare nell'etichetta di un alimento va necessariamente indicato il tenore di:	<div><div>A</div><div>pollai/cooli</div></div> <div><div>B</div><div>colesterolo</div></div> <div><div>C</div><div>alcool</div></div> <div><div>D</div><div>proteine</div></div> <div><div>E</div><div>amido</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2083	Domanda	Gli elementi obbligatori nella compilazione della ricetta in triplice copia a ricalco devono essere scritti "in tutte lettere"?	<div><div>A</div><div>si, ma solo per gli stupefacenti della Tabella I e II sez. A</div></div> <div><div>B</div><div>si qualora il medico prescrittore non sia convenzionato o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale</div></div> <div><div>C</div><div>si, ma solo per le forme iniettabili di preparazioni stupefacenti</div></div> <div><div>D</div><div>no, non è richiesto</div></div> <div><div>E</div><div>si, ma solo se si tratta di stupefacenti erogabili a carico del SSN</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2082	Domanda	Quale dei seguenti composti NON è un componente della soluzione orale di iodio riportata in F.U.:	<div><div>A</div><div>etanolo 96%</div></div> <div><div>B</div><div>potassio ioduro</div></div> <div><div>C</div><div>iodio</div></div> <div><div>D</div><div>acqua depurata</div></div> <div><div>E</div><div>fenolo</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2084	Domanda	Quale tra i farmaci elencati può provocare effetti indesiderati dovuti alla liberazione d'istamina?	<div><div>A</div><div>fenobarbital</div></div> <div><div>B</div><div> morfina</div></div> <div><div>C</div><div>ketotifene</div></div> <div><div>D</div><div>nizalidina</div></div> <div><div>E</div><div>amantadina</div></div>	Risposta esatta	B

N°	2085	Domanda	Quale delle sostanze sotto indicate conferisce ai medicinali che li contengono l'attività terapeutica di antiacido	2087	Domanda	Quale dei seguenti antibiotici aminoglicosidici è disponibile in forma orale?	Risposta esatta
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>cloruro di magnesio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>solfato di calcio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>carbonato di calcio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>più di una tra quelle indicate</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna di quelle indicate</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Amikacina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Gentamicina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Kanamicina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Nelimumicina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuno</div></div>	E	

N°	2086	Domanda	Nell'etichettatura dei dispositivi medici sterili:	2088	Domanda	A quale valore del pH, tra quelli indicati, si solubilizzano più facilmente le compresse rivestite con l'ecipiente avente la struttura melacrilica riportata?	Risposta esatta
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>deve essere sempre indicato il metodo di sterilizzazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>l'indicazione del metodo di sterilizzazione è facoltativa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>il metodo di sterilizzazione deve essere indicato solo se esistono norme tecniche armonizzate specifiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>devono essere indicate le condizioni di conservazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>deve essere indicata la temperatura di conservazione</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>2,0</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>4,3</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>7,3</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>8,0</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>5,5</div></div>	A	






N°	2093	Domanda	Quale dei farmaci antipertensivi indicati induce tachicardia riflessa	<div><div><div>A</div></div><div>nebivololo</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>dionidina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>enalapril</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>atenololo</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nifedipina</div></div>
----	------	---------	---	--




N°	2097	Domanda I soggetti che rischiano l'esposizione ai gas nervini hanno a disposizione, a scopo precauzionale, siringhe contenenti dosi accuratamente definite di atropina. Tale composto, utilizzabile come antidoto, agisce come		N°	2099	Domanda Quale dei seguenti farmaci è in grado di aumentare la forza di contrazione cardiaca con un minore effetto sulle resistenze periferiche totali?	
		<div><div>A</div>agonista dell'acetilcolina</div> <div><div>B</div>antagonista dell'acetilcolina</div> <div><div>C</div>rigeneratore dell'enzima acetilcolinesterasi</div> <div><div>D</div>precursore sintetico di nuovo enzima</div> <div><div>E</div>sequestrante dei gas nervini</div>				<div><div>A</div>adrenalina</div> <div><div>B</div>fenilefrina</div> <div><div>C</div>terbutalina</div> <div><div>D</div>dobutamina</div> <div><div>E</div>carbacolo</div>	
		Risposta esatta B				Risposta esatta D	
N°	2098	Domanda Quali delle seguenti NON è una controindicazione assoluta alla vaccinazione:		N°	2100	Domanda La struttura rappresentata è quella	
		<div><div>A</div>allergia all'uovo (per i vaccini coltivati su uova di pollo)</div> <div><div>B</div>tutte le condizioni riportate costituiscono una controindicazione</div> <div><div>C</div>reazioni gravi (shock anafilattico, nevrasse) dopo la 1a dose</div> <div><div>D</div>malattie da immunodeficienza</div> <div><div>E</div>terapia in atto con antibiotici</div>				<div><div>A</div>dell'ossigeno</div> <div><div>B</div>dell'ozono</div> <div><div>C</div>dell'ossigeno singolo</div> <div><div>D</div>dell'ossigeno tripletto</div> <div><div>E</div>non risponde a nessuna struttura reale</div>	
		Risposta esatta E				Risposta esatta B	



N°	2101	Domanda	Il pKa di un farmaco che contiene un solo gruppo funzionale nella sua molecola assume il valore più elevato quando la funzione presente è costituita da un gruppo	<div><div>A</div>amminico</div> <div><div>B</div>alcolico</div> <div><div>C</div>sulfidrilico</div> <div><div>D</div>carbossilico</div> <div><div>E</div>ammidico</div>	Risposta esatta	A
N°	2103	Domanda	Quale delle seguenti potrebbe essere l'indicazione d'uso di un prodotto a base di glucomannano (polisaccaride di <i>Amorphophallus konjac</i> Koch) e alga bruna (fallo di <i>Fucus vesiculosus</i> L.)?	<div><div>A</div>stipsi</div> <div><div>B</div>ipercolesterolemia lieve</div> <div><div>C</div>sovrappeso</div> <div><div>D</div>meteoismo</div> <div><div>E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta	C
N°	2104	Domanda	Le reazioni di biotrasformazione epatica di un farmaco possono essere classificate	<div><div>A</div>di ossidazione</div> <div><div>B</div>di fase I e II</div> <div><div>C</div>di riduzione</div> <div><div>D</div>di coniugazione</div> <div><div>E</div>di dealchilazione</div>	Risposta esatta	B
N°	2102	Domanda	Se il pKa di un acido vale 6, il pKb della base coniugata vale	<div><div>A</div>8</div> <div><div>B</div>7</div> <div><div>C</div>9</div> <div><div>D</div>10</div> <div><div>E</div>16</div>	Risposta esatta	A

N°	2105	Domanda	Indicare, tra quelli sotto riportati, i presidi sanitari nei quali la F.U. obbliga la presenza di pralidossima, avente la struttura indicata	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>farmacia urbana (in forma di polvere solubile)</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>farmacia ospedaliera regionale (in compresse)</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>farmacia rurale (in fiale i.p.)</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>farmacia ospedaliera (in forma di cerotto transdermico)</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>in tutte le farmacie sia ospedaliere che territoriali</div></div>	Risposta esatta	E
<hr/>						
N°	2106	Domanda	La Tabella N. 8 della F.U. è necessaria al farmacista:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>per verificare dosaggi relativi ai medicinali ad uso veterinario</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>per controllare che le prescrizioni del SSN non eccedano i limiti di spesa concordati con le Regioni</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>per individuare per quali preparazioni magistrali è obbligatorio richiedere al medico l'assunzione di responsabilità e il motivo della prescrizione a dosi elevate</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>per potere dare consigli ai pazienti distinguendo le dosi pediatriche da quelle per adulti</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>per verificare l'unica via di somministrazione ammessa</div></div>	Risposta esatta	C
<hr/>						
N°	2107	Domanda	È obbligatorio tenere in farmacia un apposito registro di entrata e uscita del plasma e degli emoplasti di origine umana?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>sì, sempre</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>non è prevista la detenzione in farmacia di plasma e di emoplasti di origine umana</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>sì, ma solo per le farmacie ospedaliere</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>sì, ma in alternativa è sufficiente conservare per tre anni gli originali delle ricette</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>sì, ma solo per la fornitura ad ospedali e case di cura</div></div>	Risposta esatta	B
<hr/>						
N°	2108	Domanda	Di quale dei recettori della morfina sotto elencati il naltrexone costituisce un farmaco con attività di antagonista	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>di tutti quelli indicati</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>mu1</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>della</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>kappa</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>mu2</div></div>	Risposta esatta	A

N°	2109	2110	2111	2112
Domanda	La chinina, un farmaco antimalarico, causa tutti i seguenti effetti indesiderati TRANNE:	La posologia nel paziente anziano dovrebbe essere aggiustata in caso di:	Quale è il regime di dispensazione di medicinali per uso orale contenenti flunitrazepam?	Penicilline e cefalosporine presentano un indice terapeutico molto elevato in quanto
	<div>  </div> <div> <input type="radio"/> A nausea <input type="radio"/> B cefalea <input type="radio"/> C vertigini <input type="radio"/> D disturbi visivi <input type="radio"/> E ipertensione </div>	<div> <input type="radio"/> A trattamenti farmacologici concomitanti <input type="radio"/> B funzionalità renale ridotta <input type="radio"/> C funzionalità epatica compromessa <input type="radio"/> D tutte le indicazioni sono corrette <input type="radio"/> E patologie concomitanti </div>	<div> <input type="radio"/> A massimo due confezioni per ricetta da rinnovare volta per volta <input type="radio"/> B su ricetta in triplice copia a ricalco per non più di 30 giorni di terapia <input type="radio"/> C su ricetta in triplice copia a ricalco e con il limite massimo di 60 mg di principio attivo <input type="radio"/> D su ricetta non ripetibile <input type="radio"/> E su ricetta limitativa </div>	<div> <input type="radio"/> A sono inattivate dalle beta-lattamasi esclusivamente nell'uomo ma non nel batterio <input type="radio"/> B il loro bersaglio farmacologico è presente nelle cellule batteriche e non in quelle umane <input type="radio"/> C il loro metabolismo nell'uomo produce prodotti tossici per la cellula batterica <input type="radio"/> D i processi farmacocinetici privilegiano la concentrazione del farmaco nel batterio <input type="radio"/> E più di una, tra le indicazioni date, è corretta </div>
Risposta esatta	E	B	B	B

N°	2113	Domanda	Il piano terapeutico, previsto per la prescrizione di alcuni medicinali comporta		N°	2115	Domanda	L'adiuvante in una formulazione di vaccino ha la funzione di:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>che la prescrizione a carico del SSN possa avvenire solo in seguito a diagnosi e piano terapeutico di Centri specialistici individuati dalle Regioni</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>rallentare la liberazione dell'antigene</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>che sia rilasciato da parte di Centri specialistici individuati dalle Regioni</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>attivare e richiamare cellule immunocompetenti</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>più di un'indicazione è corretta</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>impedire reazioni allergiche al vaccino</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la supervisione su ciascun Piano Terapeutico da parte di una commissione di esperti</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>solo due indicazioni sono corrette</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>che il medico di medicina generale non possa in alcun caso effettuare la prescrizione</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	
				Risposta esatta C					Risposta esatta D
N°	2114	Domanda	Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, la dichiarazione di conformità:		N°	2116	Domanda	Il più frequente tipo di interazione farmacologica che si verifica in pazienti che fanno uso di sedativi- ipnotici è:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è prevista per i soli dispositivi per test autodiagnostici</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>depressione additiva del SNC</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è prevista per i soli dispositivi elencati nell'Allegato II del D.Lgs. 332/2000</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antagonismo di azioni sedative o ipnotiche</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è prevista per tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>competizione per il legame alle proteine plasmatiche</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è redatta dal fabbricante solo su richiesta del cliente</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>induzione degli enzimi epatici metabolizzanti i farmaci</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>è emessa dall'Organismo Notificato</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>inibizione degli enzimi epatici metabolizzanti i farmaci</div></div>	
				Risposta esatta C					Risposta esatta A



N°	2117	Domanda	Gli antibatterici chinolonici agiscono	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div>sulla subunità 50S del ribosoma</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div>sulla subunità 16S del ribosoma</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div>nel nucleo cellulare</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div>alterando la permeabilità della parete batterica</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div>con nessuno di questi meccanismi</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2119	Domanda	Le aflatossine, micotossine prodotte da muffe del genere <i>Aspergillus</i> , sono responsabili di intossicazioni croniche che possono provocare:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div>disturbi del sistema immunitario</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div>epatocarcinoma</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div>disturbi del sistema nervoso centrale</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div>paralisi flaccida</div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div>pancreatite</div></div></div></div>	Risposta esatta	B

N°	2118	Domanda	Quale, tra i composti indicati, può essere utilizzato per impedire la crescita di muffe nelle emulsioni?	N°	2120	Domanda	Per quanto tempo il farmacista, in farmacia, è obbligato a conservare copia delle ricette mediche veterinarie in triplice copia?			
		<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>clorobutanolio</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>edetato di sodio</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>mentolo</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>acido benzoico</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>nessuno di quelli indicati</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>due anni</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><div>non esiste obbligatorietà</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><div>sei mesi</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><div>tre anni</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div><div>cinque anni</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>			
			Risposta esatta	D			Risposta esatta	E		




N°	2121	Domanda	Per immunizzazione passiva si intende la somministrazione di:	<div><div><div>A</div><div>immunogeni vivi</div></div><div><div>B</div><div>vaccini polisaccaridici</div></div><div><div>C</div><div>anticorpi preformati</div></div><div><div>D</div><div>antigeni</div></div><div><div>E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2123	Domanda	Quale tra quelle indicate potrebbe essere la più probabile utilizzazione terapeutica del melfalan	<div><div><div>A</div><div>analettico respiratorio</div></div><div><div>B</div><div>disinfettante delle mucose</div></div><div><div>C</div><div>antitumorale</div></div><div><div>D</div><div>antimicrobico oculare</div></div><div><div>E</div><div>decongestionante nasale</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2124	Domanda	Nelle emergenze ipertensive sono normalmente impiegati per via parenterale i seguenti farmaci con l'eccezione di	<div><div><div>A</div><div>furosemide</div></div><div><div>B</div><div>acetazolamide</div></div><div><div>C</div><div>clonidina</div></div><div><div>D</div><div>nitroprusiato di sodio</div></div><div><div>E</div><div>nifedipina</div></div></div>	Risposta esatta	B




N°	2125	Domanda Quale, tra le definizioni seguenti, corrisponde in maniera più corretta a quella di "sostanza d'abuso": una sostanza che	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>induce dipendenza fisica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>induce dipendenza psicologica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>promuove un comportamento mirato alla riassunzione della stessa sostanza</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è nociva per l'organismo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>promuove dei comportamenti socialmente pericolosi</div></div>	N°	2127	Domanda Conoscendo il quantitativo massimo pro-dose di una sostanza riportato dalla F.U. e volendo stabilire quali sono le dosi corrispondenti di alcuni suoi sali, quale delle seguenti Tabelle della F.U. è conveniente consultare?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>la 2</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la 1</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>la 4</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nessuna di quelle indicate</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte quelle indicate</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2126	Domanda Quale dei seguenti principi attivi è un antagonista dei recettori H2?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>lansoprazolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>metoclopramide</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>misoprostolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nizatidina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sucralfato</div></div>	N°	2128	Domanda Il metabolismo può portare alla formazione di composti tossici?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>VERO</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>vero solo per i composti aromatici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>vero solo per composti contenenti eteroatomi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>FALSO</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>due delle indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	A


N°	2129	Domanda Spironolattone e canrenone inibiscono competitivamente i recettori renali dell'aldosterone. La loro azione diuretica può dar luogo ad effetti tossici quali	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>iperkaliemia</div><div>ipokaliemia</div><div>alcalosi metabolica ipodurêmica</div><div>ipercalcemia</div><div>ipercalcemia</div></div>
----	------	--	---




N°	2133	Domanda	Da chi deve essere vidimato il registro di entrata e uscita dei mangimi medicati per le farmacie?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>dal Sindaco</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>dalla A.S.L.</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>dai Prefetto</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>dalla Regione</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>non è previsto alcun registro di entrata e uscita dei mangimi medicati per le farmacie</div>
----	------	---------	---	--



N°	2137	Domanda	La soluzione "glucosio infusione endovenosa" è riportata nella F.U. in carattere corsivo	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2139	Domanda	Molti sali di calcio trovano applicazione in terapia. Tra le sequenze di sali sotto indicate quale è quella che esprime un contenuto DECRESCENTE di calcio quando si somministrano i sali indicati in quantità equiponderali?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	E
				<div><div>glicerofosfato-cloruro-gluconato</div><div>gluconato-glicerofosfato-cloruro</div><div>cloruro-gluconato-glicerofosfato</div><div>glicerofosfato-gluconato-cloruro</div><div>cloruro-glicerofosfato-gluconato</div></div>		
			<div><div>$C_3H_7CaO_6P$ glicerofosfato</div><div>$C_{12}H_{22}CaO_{14} \cdot H_2O$ gluconato</div></div>			
N°	2138	Domanda	Il principio attivo metamazolo trova impiego come:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	A
				<div><div>antipiretico</div><div>antipertensivo</div><div>antiaritmico</div><div>antitubercolare</div><div>antimicrobico</div></div>		
N°	2140	Domanda	I barbiturici:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	B
				<div><div>antagonizzano gli effetti delle fenolazine</div><div>sono responsabili di induzione enzimatica</div><div>hanno effetto psicostimolante</div><div>hanno effetto curarosimile</div><div>migliorano i riflessi spinali</div></div>		




N°	2141	Domanda Indicare quali effetti collaterali sono caratteristici dei corticosteroidi somministrati per via inalatoria o per uso topico orale:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div> candidosi orale</div><div> uricosuria</div><div> eritema</div><div> ipertensione posturale</div><div> prurito</div></div></div></div>	Risposta esatta A
N°	2142	Domanda Gli anticoagulanti cumarinici agiscono:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div> inibendo le cicloossigenasi in modo irreversibile</div><div> inibendo la sintesi dei fattori della coagulazione dipendenti dalla vitamina K</div><div> inibendo le cicloossigenasi in modo reversibile</div><div> inibendo le lipossigenasi</div><div> nessuno dei meccanismi riportati è appropriato</div></div></div></div>	Risposta esatta B
N°	2143	Domanda La cosomministrazione di fenobarbital con la pillola contraccettiva contenente estrogeno e progestinico	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div> può portare a fallimento dell'azione contraccettiva</div><div> potenzia l'azione contraccettiva</div><div> non altera l'azione contraccettiva</div><div> potenzia gli effetti collaterali degli estrogeni</div><div> potenzia gli effetti collaterali dei progestinici</div></div></div></div>	Risposta esatta A
N°	2144	Domanda Il comportamento farmacocinetico della digossina è caratterizzato da	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div> eliminazione prevalentemente renale</div><div> biotrasformazione prevalentemente epatica</div><div> alto legame alle proteine plasmatiche</div><div> intenso ricircolo enteroepatico</div><div> basso volume apparente di distribuzione</div></div></div></div>	Risposta esatta A



N°	2145	Domanda	Teimisartan, candesartan, losartan, irbesartan e valsartan sono classificati come:		N°	2147	Domanda	L'acido azelaico è utilizzato nel trattamento di:	
			<input type="checkbox"/> A ACE-inibitori					<input type="checkbox"/> A dermatite allergica	
			<input type="checkbox"/> B Bloccanti il recettore alfa1 adrenergico					<input type="checkbox"/> B acne vulgaris	
			<input type="checkbox"/> C Diuretici dell'ansa					<input type="checkbox"/> C infezioni urinarie	
			<input type="checkbox"/> D antagonisti del recettore AT1 dell'angiotensina II					<input type="checkbox"/> D infezioni intestinali	
			<input type="checkbox"/> E Calcio antagonisti					<input type="checkbox"/> E infezioni cutanee	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	B

N°	2146	Domanda	Tra le caratteristiche e le proprietà sotto riportate indicare quella che meglio descrive il meccanismo d'azione dell' agente antitumorale doxorubicina		N°	2148	Domanda	Per la terapia con sali di Li ⁺ si impiega usualmente:	
			<input type="checkbox"/> A agente alchilante					<input type="checkbox"/> A il cloruro	
			<input type="checkbox"/> B antibiotico intercalante					<input type="checkbox"/> B il solfato	
			<input type="checkbox"/> C antimetabolita-antifolato					<input type="checkbox"/> C il carbonato	
			<input type="checkbox"/> D alcaloide naturale bloccante la mitosi					<input type="checkbox"/> D il nitrato	
			<input type="checkbox"/> E antimetabolita					<input type="checkbox"/> E lo ioduro	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	C




N°	2149	Domanda	Tutte le farmacie hanno l'obbligo di erogare, nell'ambito del SSN, i nuovi servizi previsti dal DLgs 153/2009?	N°	2151	Domanda	Quale delle affermazioni sotto riportate e riguardanti un medicinale anticolosterolemico contenente colestiramina è corretta? Il principio attivo
		<input type="checkbox"/> A	si, tutte			<input type="checkbox"/> A	forma dei sali con gli acidi biliari favorendone l'eliminazione
		<input type="checkbox"/> B	no, solo le farmacie convenzionate			<input type="checkbox"/> B	agisce formando un legame covalente con gli acidi biliari dell'intestino
		<input type="checkbox"/> C	no, solo se il titolare vi aderisce			<input type="checkbox"/> C	agisce formando un legame covalente con il colesterolo plasmatico
		<input type="checkbox"/> D	no, solo le farmacie urbane			<input type="checkbox"/> D	è in grado di formare legami salini con il colesterolo
		<input type="checkbox"/> E	si tutte, tranne le farmacie rurali sussidiate			<input type="checkbox"/> E	diminuisce la formazione di colesterolo endogeno
			Risposta esatta C				Risposta esatta A

N°	2150	Domanda	E' obbligatoria per il farmacista la consegna a domicilio di medicinali omeopatici per uso umano?	N°	2152	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il tramadolo è corretta ?
		<input type="checkbox"/> A	si, sempre			<input type="checkbox"/> A	e' un agonista sui recettori oppioidi mu
		<input type="checkbox"/> B	si, purché la richiesta sia firmata da un medico omeopata			<input type="checkbox"/> B	inibisce la ricaptazione di noradrenalina e serotonina
		<input type="checkbox"/> C	si, se si tratta di un omeopatico iniettabile			<input type="checkbox"/> C	l'azione analgesica è meno intensa della morfina
		<input type="checkbox"/> D	no			<input type="checkbox"/> D	tutte le indicazioni tranne una sono corrette
		<input type="checkbox"/> E	si, purché nell'ambito della propria sede di pertinenza			<input type="checkbox"/> E	tutte le indicazioni sono corrette
			Risposta esatta D				Risposta esatta E



N°	2153	Domanda	Il sumatriptan è un	<div><div>A</div><div>agente anoressizzante</div></div> <div><div>B</div><div>antitussigeno</div></div> <div><div>C</div><div>antilemizantico</div></div> <div><div>D</div><div>antidepressivo di seconda generazione</div></div> <div><div>E</div><div>antidoto dell'etanolo</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2154	Domanda	Gli effetti teratogeni dell'isotretinoina consistono in:	<div><div>A</div><div>deformità del cranio</div></div> <div><div>B</div><div>deformità delle orecchie</div></div> <div><div>C</div><div>deformità degli organi interni (cuore, fegato)</div></div> <div><div>D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div> <div><div>E</div><div>tutte le indicazioni meno una sono corrette</div></div>	Risposta esatta	D

N°	2155	Domanda	La stabilizzazione fisica di una crema idrofila può essere affidata a:	<div><div>A</div><div>trietanolamina</div></div> <div><div>B</div><div>acido sorbico</div></div> <div><div>C</div><div>macrogol 1000</div></div> <div><div>D</div><div>polisorbato 80</div></div> <div><div>E</div><div>cera d'api</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2156	Domanda	Per indicare i multipli ed i sottomultipli delle unità di misura si usano particolari prefissi. Quale delle sequenze sotto riportate, considerate andando da sinistra a destra, indica un ordine crescente della grandezza considerata	<div><div>A</div><div>chilo, centi, deca</div></div> <div><div>B</div><div>milli, nano, micro</div></div> <div><div>C</div><div>mega, deca, pico</div></div> <div><div>D</div><div>etto, giga, deci</div></div> <div><div>E</div><div>micro, milli, centi</div></div>	Risposta esatta	E



N°	2157	Domanda	Chemical structure of a cyclic guanidine derivative with two phenyl rings substituted with chlorine atoms.
N°	2159	Domanda	Il principale meccanismo d'azione dei farmaci antipsicotici a struttura fenotiazinica è:
N°	2160	Domanda	Quale, tra le sostanze elencate, si potrebbe utilizzare in uno sciroppo con proprietà antitussive e da utilizzare come farmaco OTC?
N°	2158	Domanda	L'attività antimicrobica della clorexidina, avente la struttura indicata, è dovuta:


A	i medicinali di cui le farmacie devono essere provviste obbligatoriamente	Risposta esatta	E
B	la sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave		
C	i medicinali da vendere solo dietro presentazione di ricetta medica		
D	i medicinali da vendere solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile		
E	i pesi atomici relativi degli elementi		

A	nessuna di quelle indicate	Risposta esatta	C
B	destropropossifene		
C	levonometorano		
D	propossifene racemico		
E	più di uno di quelle indicate		

A	all'inibizione della D-alaninotranspeptidasi	Risposta esatta	C
B	al disaccoppiamento della fosforilazione ossidativa		
C	all'aumento della permeabilità della membrana della cellula batterica		
D	al danneggiamento del nucleo		
E	al blocco dei canali ionici di membrana		

N°	2161	2162	2163	2164
Domanda	Per medicinali assoggettati a prescrizione medica "limitativa" s'intendono	I più comuni effetti collaterali degli antidepressivi tridici sono di tipo:	Le strutture indicate rappresentano composti utilizzabili come additivi in tecnica farmaceutica. Quale degli accoppiamenti (struttura - caratteristiche) sotto riportati è corretto	
	<p><input type="radio"/> A quelli prescrivibili dall'odontoiatra</p> <p><input type="radio"/> B quelli prescrivibili dall'ostetrica</p> <p><input type="radio"/> C quelli prescrivibili dal veterinario</p> <p><input type="radio"/> D quelli la cui prescrizione o utilizzazione è limitata a taluni ambienti o a taluni medici</p> <p><input type="radio"/> E quelli prescrivibili dal medico oncoepata</p>	<p><input type="radio"/> A istaminergico</p> <p><input type="radio"/> B agonista colinergico</p> <p><input type="radio"/> C anticolinergico</p> <p><input type="radio"/> D antidopaminergico</p> <p><input type="radio"/> E gaba-mimetico</p>	<p><input type="radio"/> A clomipramina</p> <p><input type="radio"/> B maprotlina</p> <p><input type="radio"/> C dosulepina</p> <p><input type="radio"/> D bupropione</p> <p><input type="radio"/> E desipramina</p>	<p><input type="radio"/> A (I) - cationica</p> <p><input type="radio"/> B (II) - cationica</p> <p><input type="radio"/> C (III) - anfotlica</p> <p><input type="radio"/> D (II) - anionica</p> <p><input type="radio"/> E nessuna indicazione è corretta</p>
Risposta esatta	D	C	B	


N°	2165	Domanda	Quale dei seguenti meccanismi NON è proprio della caffeina?	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><</div></div>
----	------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

N°	2169	Domanda	Quale è l'attività farmacologica più rilevante dell'amfetamina, avente la struttura indicata		
					
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antistaminica - H2</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>simpaticollica diretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>simpaticominetica diretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>simpaticominetica indiretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>antimuscarinica</div>		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>per tutti</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>solo per quelli dell'Allegato III bis</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>solo per quelli della Tabella I</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>per quelli della tabella II Sez. A, B e C</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>solo per quelli delle tabelle I e II sez. A e B</div>		
				Risposta esatta	D


N°	2170	Domanda	Quale delle affermazioni riportate è esatta per il bisacodile? Agisce:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>come lassativo ad azione emolliente</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>come lassativo osmotico</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>come lassativo di contatto</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>inibendo la pompa protonica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>come lassativo di massa o idrofilo</div>		
				Risposta esatta	C


N°	2171	Domanda	Per quali medicinali stupefacenti è necessario utilizzare il buono-acquisto nel caso in cui la farmacia si rifornisce direttamente dal produttore?		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>per tutti</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>solo per quelli dell'Allegato III bis</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>solo per quelli della Tabella I</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>per quelli della tabella II Sez. A, B e C</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>solo per quelli delle tabelle I e II sez. A e B</div>		
				Risposta esatta	D



N°	2172	Domanda	In quale caso è possibile preparare in farmacia medicinali onneopatici per uso umano senza ricetta medica?		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>quando la diluizione non è superiore alla terza centesimale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>ogni qualvolta se ne presenti la necessità</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>nel caso in cui esista da più di tre anni il corrispondente medicinale onneopatico</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>quando la preparazione si basa sulle indicazioni delle Farmacopoe di almeno tre stati europei</div>		
				Risposta esatta	D





N°	2173	Domanda	I farmaci ACE-inibitori sono in genere ben tollerati e raramente provocano reazioni collaterali gravi. Riguardo la loro potenziale fetotossicità essi
		A	sono controindicati nelle donne in età riproduttiva
		B	non rappresentano un rischio per il feto dal momento che non sono teratogeni
		C	devono essere sospesi durante il secondo trimestre di gravidanza
		D	devono essere sospesi durante il quarto trimestre di gravidanza
		E	devono essere sospesi immediatamente all'atto della diagnosi di gravidanza
		Risposta esatta	E
N°	2174	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardante gli antibiotici aminoglicosidici ne descrive con maggiore correttezza l'attività farmacologica? Gli antibiotici aminoglicosidici sono attivi nei confronti
		A	di molti batteri aerobi Gram negativi e alcuni aerobi Gram positivi
		B	dei funghi
		C	di alcuni DNA virus
		D	della maggior parte dei batteri anaerobi
		E	di tutte le entità indicate
		Risposta esatta	A
N°	2175	Domanda	A quale classe di FANS, tra quelle sotto riportate, appartiene il derivato dell'acido antirilico avente la struttura indicata
		A	acidi arilacetici
		B	pirazolidindoni
		C	anilidi
		D	oxicami
		E	acidi fenamici
		Risposta esatta	E
N°	2176	Domanda	Quale dei seguenti antibiotici NON è indicato nelle febbri tifoidi e paratifoidi?
		A	l'associazione di sulfametoxazolo e trimetoprim
		B	amoxicillina
		C	ampicillina
		D	cloramfenicolo
		E	rifampicina
		Risposta esatta	E

N°	2177	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti è corretta riguardo l'otilonio bromuro, avente la struttura sotto riportata?		N°	2179	Domanda	Con il termine di "atipici" si indicano i neurolettici		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>presenta azione anesthetica locale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>ha un'azione rilassante di tipo papaverinico sui muscoli lisci</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>e' un disinfettante intestinale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>e' un parasimpatico che agisce prevalentemente a livello intestinale</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>si utilizza come antidiarroico</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>attivi sulle psicosi "atipiche"</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>con effetti collaterali extrapiramidali scarsi o nulli</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>attivi esclusivamente sui recettori D2 dopaminergici</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>antipsicotici appartenenti alla classe dei tiotropanti</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>utilizzabili solo per via parenterale come preparati depot</div>	Risposta esatta	D
N°	2178	Domanda	Quale delle affermazioni riguardanti i saponi è ERRATA		N°	2180	Domanda	Quali delle seguenti NON è da considerarsi una tipica reazione indesiderata ad un vaccino:		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>i saponi modificano apprezzabilmente la tensione superficiale dell'acqua</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>i composti aventi proprietà tensioattive possono essere cationici ed anionici</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>i saponi anionici che contengono potassio costituiscono i saponi molli (saponi da barba)</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>il comune sapone è un sapone anionico contenente sodio</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>i saponi modificano apprezzabilmente la tensione di vapore dell'acqua</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>dolore, gonfiore, arrossamento, edema e indurimento locale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>febbre</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>reazione allergica anafilattica con angioedema</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>dermatite atopica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>orticaria</div>	Risposta esatta	E	




N°	2185	Domanda	Il principio attivo biperidene (struttura indicata) agisce nella terapia antiparkinson come		N°	2187	Domanda	Gli antinfiammatori steroide della classe dei glucocorticoidi agiscono sul sistema a cascata dell'acido arachidonico a livello della	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>parasimpatcomineltico diretto</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>parasimpatcolittico diretto</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>dopaminergico indiretto</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>parasimpatcomineltico indiretto</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>parasimpatcolittico indiretto</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>ciclossigenasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>fosfolipasi A2</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>lipossigenasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>prostaglandineltasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>prostaglandinireduetasi</div>				Risposta esatta	B
N°	2186	Domanda	Con quale meccanismo le biguanidi, del tipo fenformina (struttura indicata) esercitano il loro effetto terapeutico?		N°	2188	Domanda	Le reazioni anafilattiche:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>liberano insulina dalle cellule beta del pancreas</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>stimolano la glicolisi nei tessuti periferici</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>riducono la gluconeogenesi epatica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>stimolano il rilascio di glucagone</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>più di una indicazione è corretta</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>sono equivalenti a quelle idiosincrasiche</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>si manifestano al primo contatto con l'antigene</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>sono correlate alla dose di antigene</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>possono comprendere rinite allergica, orticaria, asma bronchiale e shock anafilattico</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>				Risposta esatta	E



N°	2189	Domanda	L'autorità amministrativa competente ad autorizzare il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 L. 362/1991 è:	<input type="radio"/> A il Sindaco <input type="radio"/> B la Giunta comunale <input type="radio"/> C il Consiglio comunale <input type="radio"/> D la Regione o la Provincia autonoma <input type="radio"/> E la A.S.L.	Risposta esatta	D
N°	2190	Domanda	Un alimento destinato a soggetti in buona salute con una età non superiore a tre anni è:	<input type="radio"/> A un alimento per la prima infanzia nell'ambito dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare <input type="radio"/> B un prodotto dietetico nell'ambito dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare <input type="radio"/> C un alimento di consumo corrente <input type="radio"/> D un alimento a fini medici speciali <input type="radio"/> E un alimento addizionato di vitamine e minerali secondo il regolamento (CE) 1925/2006	Risposta esatta	A
N°	2191	Domanda	Quale delle seguenti sostanze riduce la tachicardia?	<input type="radio"/> A propranololo <input type="radio"/> B isoprenalina <input type="radio"/> C cinoxacina <input type="radio"/> D econazolo <input type="radio"/> E cimetidina	Risposta esatta	A
N°	2192	Domanda	Le sulfaniluree, aventi la struttura generale indicata esplicano la loro azione ipoglicemizzante:	 <input type="radio"/> A interagendo con i recettori per l'insulina <input type="radio"/> B aumentando il rilascio di insulina dal pancreas <input type="radio"/> C aumentando il catabolismo dell'insulina <input type="radio"/> D aumentando il rilascio di glucagone <input type="radio"/> E aumentando l'attività di alcune lipasi	Risposta esatta	B

N°	2193	Domanda	In quale caso è obbligatorio registrare un'operazione sull'apposito registro dei veleni?
			<div><div>A</div><div>In tutti in cui viene venduto un veleno</div></div> <div><div>B</div><div>In nessun caso</div></div> <div><div>C</div><div>esclusivamente quando i veleni sono venduti per uso diverso da quello medicinale</div></div> <div><div>D</div><div>esclusivamente quando i veleni sono venduti solo per uso medicinale</div></div> <div><div>E</div><div>esclusivamente quando i veleni sono venduti per uso veterinario</div></div>
		Risposta esatta	C
N°	2194	Domanda	La tosse è un effetto indesiderato che spesso si manifesta durante la terapia con:
			<div><div>A</div><div>Sartani</div></div> <div><div>B</div><div>Calcio-antagonisti</div></div> <div><div>C</div><div>Nitroderivati</div></div> <div><div>D</div><div>Diuretici dell'ansa</div></div> <div><div>E</div><div>ACE-inibitori</div></div>
		Risposta esatta	E
N°	2195	Domanda	I triptani e gli agonisti serotoninergici utilizzati nella terapia della:
			<div><div>A</div><div>schizofrenia</div></div> <div><div>B</div><div>eccessiva</div></div> <div><div>C</div><div>emicrania</div></div> <div><div>D</div><div>insonnia</div></div> <div><div>E</div><div>asma</div></div>
		Risposta esatta	C
N°	2196	Domanda	La glibenclamide, indicata in struttura, è un farmaco ipoglicemizzante che:
			<div><div>A</div><div>incrementa il rilascio di insulina endogena</div></div> <div><div>B</div><div>stimola il rilascio di glucagone</div></div> <div><div>C</div><div>interagisce con i recettori dell'insulina</div></div> <div><div>D</div><div>varia la permeabilità delle cellule nei confronti del glucosio</div></div> <div><div>E</div><div>diminuisce i livelli dei trigliceridi</div></div>
		Risposta esatta	A


N°	2197	Domanda	Quale dei seguenti bloccanti neuromuscolari è di tipo steroideo?	<div><div><div>A</div></div><div>altracurio</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>cisatracurio</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>suxametonio</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>vecuronio</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>mivacurio</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2199	Domanda	La clonidina è un farmaco utilizzabile contro l'ipertensione. Nella terapia di mantenimento nel trattamento domiciliare viene prevalentemente utilizzata la forma farmaceutica di	<div><div><div>A</div></div><div>fiale i.v.</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>preparati transdermici</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>supposte</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>fiale i.m.</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle forme sopra indicate</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2200	Domanda	La clearance sistemica di un farmaco è la misura di:	<div><div><div>A</div></div><div>entità di distribuzione</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>volume di plasma depurato dal farmaco nell'unità di tempo</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>velocità di biotrasformazione</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>entità di eliminazione della molecola inmodificata</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>velocità di distribuzione</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2198	Domanda	L'installazione di cartelli indicatori per le farmacie è consentita dal codice deontologico ?	<div><div><div>A</div></div><div>no, è vietata</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>si, purché non superino la dimensione di mezzo metro quadrato di superficie e siano in forma di freccia dirazionale</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>si, purché rechino direzione e distanza della farmacia e siano posti nella sede farmaceutica di pertinenza</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>si, ma può installarli solo il Comune, ove ritenga che la farmacia non sia agevolmente reperibile</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>si, purché non abbiano contenuto pubblicitario</div></div>	Risposta esatta	C



N°	2201	Domanda La somministrazione di metformina in associazione ad alcuni farmaci è da evitare. Indicare quale farmaco tra quelli elencati.	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Propranololo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Digossina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Chinidina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Tutti quelli indicati tranne uno</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Tutti quelli indicati</div></div>	Risposta esatta E
N°	2202	Domanda L'essenza di garofano si caratterizza per l'alto contenuto di eugenolo, che è un:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>flavonoide</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>fenolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alcol monoterpico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>idrocarburo alifatico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>estere aromatico</div></div>	Risposta esatta B
N°	2203	Domanda I diuretici dell'ansa, in pazienti in trattamento con glicosidi digitali, possono provocare	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>disturbi della vista</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>otossicità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>diminuzione della forza di contrazione del cuore</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>aritmie cardiache</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>scompenso cardiaco congestizio</div></div>	Risposta esatta D
N°	2204	Domanda Secondo la normativa vigente in materia di farmacovigilanza, un operatore sanitario deve inviare la segnalazione di reazioni avverse:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>all'Agenzia Italiana del Farmaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>al Direttore Generale della propria A.S.L./Azienda Ospedaliera</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>all'Azienda farmaceutica produttrice del farmaco che ha causato la reazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>al responsabile di Farmacovigilanza della propria ASL/Azienda Ospedaliera</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>al Ministero della Salute</div></div>	Risposta esatta D

N°	2205	Domanda	Quale delle seguenti catecolammine NON è fisiologica?		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>dopamina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>isopropilnoradrenalina</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>adrenalina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>noradrenalina</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta	B
N°	2207	Domanda	Le forme farmaceutiche a rilascio modificato sono preparazioni che differiscono rispetto alle convenzionali per:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>esclusivamente per la velocità di rilascio dei/principi attivi</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>la velocità e/o il sito dei/principi attivi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>esclusivamente per il sito di rilascio dei/principi attivi</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>la via di somministrazione</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>la frequenza di somministrazione</div>	Risposta esatta	B





N°	2206	Domanda	Su quale dei seguenti recettori agisce direttamente la noradrenalina (struttura indicata) per aumentare la frequenza cardiaca?		
		<div><chem>NC(C(O)c1ccc(O)c(O)c1)</chem></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>alfa1 adrenergico</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>beta1 adrenergico</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>alfa2 adrenergico</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>beta2 adrenergico</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>Colinergico muscarinico</div>	Risposta esatta	B
N°	2208	Domanda	Qual è la validità della ricetta spedita in regime di convenzione in conformità al D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371?		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>nessuno dei periodi indicati</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>giorni sette incluso quello di emissione</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>giorni sette escluso quello di emissione</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>giorni dieci incluso quello di emissione</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>trenta giorni escluso quello di emissione</div>	Risposta esatta	E



N°	2209	Domanda Nella valutazione delle analisi cliniche riguardanti l'assetto lipidico di un paziente quale è il parametro che maggiormente esprime una situazione critica quando presenta valori elevati rispetto alla norma	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>la frazione di colesterolo indicata come "Col HDL"</div><div>la frazione di colesterolo indicata come "Col LDL"</div><div>il colesterolo totale (Col tot)</div><div>i trigliceridi</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div></div>	N°	2211	Domanda La gomma arabica, in soluzione acquosa, è incompatibile con	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>acido alginico</div><div>gomma adragante</div><div>gelatina</div><div>etilcellulosa</div><div>metilparaben</div></div></div>	Risposta esatta	B	Risposta esatta	C
N°	2210	Domanda Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti che vengono aggiunti alle polveri allo scopo di far raggiungere alla compressa un peso congruo prendono il nome di "diluenti". Quale, tra le sostanze sotto indicate, può essere classificata come "diluente"?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>biossido di titanio</div><div>lattosio</div><div>acido alginico</div><div>silice colloidale</div><div>più di una delle sostanze indicate</div></div></div>	N°	2212	Domanda A chi deve essere, eventualmente, trasmesso da parte del farmacista un esemplare della ricetta medica veterinaria in triplice copia?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div></div></div><div><div>alla Regione</div><div>al Ministero della Salute</div><div>alla A.S.L.</div><div>al Nucleo di Polizia Veterinaria</div><div>non è tenuto a trasmettere copia, in quanto tale obbligo è a carico del veterinario</div></div></div>	Risposta esatta	B	Risposta esatta	C

N°	2213	Domanda Che tipo di provvedimento restrittivo si può attuare nell'ambito della sorveglianza di mercato dei dispositivi medici?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>divieto di immissione in commercio</div> <div>divieto di utilizzo</div> <div>ritiro dal mercato</div> <div>tutti i provvedimenti indicati, secondo la tipologia di non conformità accertata</div> <div>sospensione della commercializzazione</div>	Risposta esatta	D
N°	2215	Domanda Il saccarosio è un disaccaride formato da	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>glucosio e galattosio</div> <div>galattosio e fruttosio</div> <div>glucosio e fruttosio</div> <div>due molecole di glucosio</div> <div>due molecole di fruttosio</div>	Risposta esatta	C
N°	2216	Domanda La certificazione di possesso ai fini di uso personale per trattamento terapeutico di medicinali appartenenti alla tabella II Sez. A, B, C ed E del DPR 309/90 per cittadini in transito alla frontiera:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>e' rilasciata dal medico convenzionato o dipendente dal SSN o dal pediatra di libera scelta</div> <div>e' rilasciato solo dallo specialista ospedaliero</div> <div>più di un'indicazione è corretta</div> <div>nessuna indicazione è corretta</div> <div>e' ammessa per 10 giorni di terapia</div>	Risposta esatta	A
N°	2214	Domanda Qual è la durata di validità della ricetta ripetibile che prescrive medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>dieci giorni compreso quello di rilascio</div> <div>dieci giorni escluso quello di rilascio</div> <div>sempre tre mesi</div> <div>sempre centoventi giorni</div> <div>la stessa prevista per tutte le altre ricette ripetibili</div>	Risposta esatta	E

N°	2217	Domanda	La sulfasalazina ha la struttura indicata. Quale tra le indicazioni sotto riportate e ad essa riferite è maggiormente aderente alla realtà	<div> <input type="checkbox"/> A è inattivata dalla flora batterica del colon </div> <div> <input type="checkbox"/> B è assorbita rapidamente a livello gastrico </div> <div> <input type="checkbox"/> C per attivazione metabolica nel colon produce sulfapiridina e acido 5-aminosalicilico </div> <div> <input type="checkbox"/> D ha proprietà antiemetiche </div> <div> <input type="checkbox"/> E ha proprietà antipertensive </div>	Risposta esatta	C
N°	2219	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "olo" nella Denominazione Comune?	<div> <input type="checkbox"/> A Anticoolesterolemici inibitori della HMGCoA reductasi </div> <div> <input type="checkbox"/> B Inibitori delle monoammino ossidasi </div> <div> <input type="checkbox"/> C Solfonamidi antibatteriche </div> <div> <input type="checkbox"/> D beta-Bloccanti adrenergici </div> <div> <input type="checkbox"/> E Antistaminici H2 </div>	Risposta esatta	D
N°	2220	Domanda	Qual è il tempo massimo entro il quale devono essere riportati da parte del farmacista le movimentazioni nel registro di entrata e uscita stupefacenti?	<div> <input type="checkbox"/> A entro 24 ore dalla dispensazione </div> <div> <input type="checkbox"/> B entro 48 ore dalla dispensazione </div> <div> <input type="checkbox"/> C il termine non è normativamente precisato </div> <div> <input type="checkbox"/> D entro 36 ore dalla dispensazione </div> <div> <input type="checkbox"/> E nel più breve tempo possibile </div>	Risposta esatta	B




N°	2221	Domanda	Il meccanismo d'azione della Iovastatina può essere descritto come :	<div> <input type="radio"/> A diminuzione della velocità di degradazione del colesterolo </div> <div> <input type="radio"/> B aumento della velocità di sintesi del colesterolo </div> <div> <input type="radio"/> C inibizione della sintesi intracellulare di colesterolo </div> <div> <input type="radio"/> D aumento della velocità di degradazione metabolica del colesterolo </div> <div> <input type="radio"/> E nessuna delle indicazioni è corretta </div>	Risposta esatta	C
N°	2222	Domanda	Le forme farmaceutiche più diffuse contenenti insulina sono costituite da	<div> <input type="radio"/> A capsule e compresse per via orale </div> <div> <input type="radio"/> B cerotti transdermici </div> <div> <input type="radio"/> C sospensioni di insulina (complesstate con zinco) aventi diversa durata d'azione </div> <div> <input type="radio"/> D sospensioni di insulina (complesstate con calcio) aventi diversa durata d'azione </div> <div> <input type="radio"/> E soluzione di insulina salificata con zinco </div>	Risposta esatta	C
N°	2223	Domanda	Nelle tecniche utilizzate per ottenere il controllo del rilascio dei farmaci nell'organismo si utilizzano reazioni che permettono di legare il farmaco (F-arm) ad una resina (Res) secondo le due reazioni rappresentate nello schema. Quale delle affermazioni, sotto elencate e riguardanti questa tecnica è corretta	<div> <input type="radio"/> A per ottenere il composto (III) si devono usare resine a carattere basico </div> <div> <input type="radio"/> B per ottenere il composto (VI) si devono usare resine a carattere acido </div> <div> <input type="radio"/> C per ottenere il composto (III) si devono usare farmaci a carattere acido </div> <div> <input type="radio"/> D per ottenere il composto (VI) si devono usare farmaci a carattere basico </div> <div> <input type="radio"/> E tutte le affermazioni riportate sono corrette </div>	Risposta esatta	E
N°	2224	Domanda	Il malathion può essere definito:	<div> <input type="radio"/> A insetticida organofosforico </div> <div> <input type="radio"/> B inquinante ambientale </div> <div> <input type="radio"/> C antinfiammatorio </div> <div> <input type="radio"/> D erbicida </div> <div> <input type="radio"/> E insetticida botanico </div>	Risposta esatta	A


N°	2225	Domanda	Da chi deve essere firmato e numerato il registro di entrata e uscita stupefacenti per le farmacie?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>dal Responsabile dell'Azienda Sanitaria Locale o da un suo delegato</div><div>dal Prefetto</div><div>dall'Ordine dei Farmacisti</div><div>dall'Assessorato Regionale alla Sanità</div><div>tali adempimenti non sono più richiesti</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2227	Domanda	I nitrati organici vengono utilizzati nella terapia della:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>ipertensione arteriosa</div><div>obesità</div><div>anemia</div><div>angina pectoris</div><div>cefalea</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2226	Domanda	Molti sali utilizzabili come purganti salini ad azione osmotica hanno mantenuto un nome "storico" che risale all'epoca della loro prima preparazione. Qual è quello riferibile al composto indicato nella formula?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>sale mirabile di Glauber</div><div>sale di Selignette</div><div>sale di La Rochelle</div><div>sale inglese</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2228	Domanda	A chi il farmacista deve spedire copia della prescrizione di mangimi medicati?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>alla a.s.l.</div><div>al ministero della salute</div><div>alla regione</div><div>a nessuno</div><div>al nucleo di polizia veterinaria della polizia municipale</div></div>	Risposta esatta	A



N°	2229	Domanda	Chi cosa indica la tabella n.8 della Farmacopea Ufficiale?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>le sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave</div><div>gli stupefacenti</div><div>gli apparecchi e gli utensili obbligatori in farmacia</div><div>i medicinali da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile</div><div>le dosi abituali massime per l'adulto</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2231	Domanda	Quale delle seguenti sostanze è usata come agente di viscosità.	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>bentonite</div><div>cellulosa</div><div>alcol stearilico</div><div>PEG 1000</div><div>bentonite</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2232	Domanda	Molti sali di calcio trovano applicazione in terapia. Tra le sequenze di sali sotto indicate qual è quella che esprime un contenuto crescente di calcio quando si somministrano quantità equivalenti in peso dei sali contenenti gli anioni riportati?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>cloruro-bromuro-ioduro</div><div>cloruro-ioduro-bromuro</div><div>più di una di quelle indicate</div><div>bromuro-cloruro-ioduro</div><div>ioduro-bromuro-cloruro</div></div></div></div>	Risposta esatta	E



N°	2233	Domanda	L'ondansetron è un	<div><div><input type="radio"/> A</div>antagonista dei recettori sigma</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>alcaloide della Segale cornuta</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>antagonista dei recettori 5-HT3 per la serotonina</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>miorelassante periferico</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>narcotico analgesico</div>	Risposta esatta	C
----	------	---------	--------------------	---	-----------------	---





N°	2234	Domanda	Il farmacista è tenuto ad annotare, sull'etichetta che appone sui recipienti dei medicinali galenici che allestisce in farmacia il prezzo praticato?	<div><div><input type="radio"/> A</div>no, solo sull'etichetta che appone sull'involucro</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>sì, sempre</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>no, se il tariffario è esposto al pubblico</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>sì, ma soltanto ove il prezzo si discosti da quello di tariffa</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>no, è sufficiente il rilascio dello scontrino fiscale</div>	Risposta esatta	B
----	------	---------	--	---	-----------------	---

N°	2235	Domanda	Due medicinali di origine industriale contengono rispettivamente 325 mg e 100 mg di acido acetilsalicilico. Quale delle affermazioni riguardanti i due medicinali è corretta?	<div><div><input type="radio"/> A</div>la posologia consigliata per il secondo medicinale è molto più alta di quello del primo</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>entrambi rientrano nella classe dei farmaci OTC</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>il secondo può essere dispensato solo dietro presentazione di ricetta medica</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>due affermazioni sono corrette</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>due affermazioni sono corrette</div>	Risposta esatta	C
----	------	---------	---	---	-----------------	---


N°	2236	Domanda	E' lecito sotto il profilo deontologico apporre ai di fuori delle farmacie cartelli indicatori dell'esercizio farmaceutico anche in forma di freccia direzionale?	<div><div><input type="radio"/> A</div>sì, sempre</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>no</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>sì, ma solo previa autorizzazione dell'Ordine</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>sì, ma solo se posti nell'ambito territoriale della sede delimitato dalla pianta organica</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>sì, ma solo previa autorizzazione del Sindaco</div>	Risposta esatta	D
----	------	---------	---	--	-----------------	---




N°	2241	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti corrisponde maggiormente alla definizione di "farmacocinetica"?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>nessuna delle definizioni sotto elencate</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div>le conseguenze biologiche originarie dall'interazione tra farmaco e recettore</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div>la velocità con la quale viene raggiunto l'equilibrio nella reazione tra farmaco e recettore</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div>la velocità con la quale prende avvio l'azione farmacologica</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div>l'insieme dei meccanismi che regolano lo spostamento del farmaco nell'organismo</div></div></div></div></div><div>Risposta esatta</div><div>E</div></div>	
N°	2242	Domanda	La lidocaina è un farmaco che blocca il canale del Na ⁺ in maniera voltaggio - tempo dipendente in quanto l'affinità	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div>per il canale è elevata in condizioni basali (potenziali negativi di membrana)</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div>è elevata se il canale si trova nello stato attivato o in quello inattivato</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div>è bassa se il canale si trova nello stato attivato</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div>è bassa a potenziali di membrana positivi</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div>è bassa sia a potenziali negativi che positivi</div></div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>	
N°	2243	Domanda	E' consentito al farmacista l'acquisto di stupefacenti in forma cumulativa per più sostanze o preparazioni?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div>in nessun caso</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div>si, utilizzando il buono acquisto conforme al modello approvato con D.M. 18.12.2006</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div>per una sola sostanza ma per qualsiasi numero di preparazioni</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div>per una sola preparazione ma per qualsiasi numero di sostanze</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div>per una sola sostanza e per un massimo di due preparazioni</div></div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>	
N°	2244	Domanda	La melleidossimetamfetamina (Ecstasy), avente la struttura indicata,	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div>può causare disturbi psichici</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div>causa grave dipendenza fisica</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div>induce crisi di astinenza caratterizzata da eccitazione del SNC</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div>aumenta l'appetito dopo uso prolungato</div></div></div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div>provoca convulsioni</div></div></div></div></div> <div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>A</div>	



N°	2245	Domanda	Il nabumetone ha la struttura indicata. L'azione farmacologica sembra essere collegata all'inibizione della cicloossigenasi-2 (COX-2) presente al sito di infiammazione. Quale delle indicazioni sotto riportate è ad esso riferita e errata	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>la sua selettività verso la cicloossigenasi-2 è dovuta alla presenza del gruppo chetonico</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>è tollerato meglio per la sua attività selettiva nei confronti della cicloossigenasi-2</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>rispetto agli altri FANS provoca minori danni gastrici dopo assunzione per os</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>è un profarmaco che, nel primo passaggio epatico, viene trasformato in acido carbossilico</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>il metabolismo ossidativo lo trasforma in acido 6-metossi-2-naftilacetico</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2246	Domanda	Quale dei seguenti è un ormone prodotto dalla adenoipofisi?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>Ormone di rilascio della corticotropina (CRH)</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>Ormone luteinizzante (LH)</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>Ossitocina</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>Ormone di rilascio della tireotropina (TRH)</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>Vasopressina</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2247	Domanda	A parità di tutte le altre condizioni, l'assorbimento di un barbiturico è massimo nei distretti gastrointestinali nei quali il pH è pari a:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>7.4</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>6.0</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>2.0</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>8.0</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>l'assorbimento è indipendente dal pH</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2248	Domanda	Gli ansiolitici benzodiazepinici possono causare	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>convulsioni</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>amnesia</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>tachicardia</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>dolori muscolari</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>agranulocitosi</div></div>	Risposta esatta	B




N°	2249	Domanda	Quale dei farmaci elencati viene eliminato quasi interamente immutato per via urinaria:	<div><div><div>A</div></div><div>metformina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>verapamil</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>suxametonio</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>metoprololo</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>clorpromazina</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2251	Domanda	L'assunzione ripetuta di dosi elevate di ecstasy provoca:	<div><div><div>A</div></div><div>effetti psicotici</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>danni irreversibili al sistema GABA-ergico centrale</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>sonnolenza</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>nessun effetto sul comportamento</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>sindrome d'astinenza</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2252	Domanda	Il principio attivo glicazide, di cui si riporta la formula, si può inquadrare tra:	<div><div><div>A</div></div><div>gli anestetici locali</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>le sulfoniluree ipoglicemicizzanti</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>gli antipsicotici atipici</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>gli antagonisti adrenergici</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>gli antiparkinson</div></div>	Risposta esatta	B



N°	2253	Domanda	Quale delle affermazioni riportate e riguardanti l'iprotropio bromuro è corretta? Il principio attivo	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è un antagonista dell'acetilcolina utilizzato nell'asma</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è un antagonista dell'istamina utilizzato come antiulcera</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è un antimuscarinico utilizzato come rilassante muscolare intestinale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è un agonista dell'acetilcolina utilizzato come antiulcera</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>è un agonista dell'istamina utilizzato come antiulcera</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2255	Domanda	La somministrazione di betanecolo, avente la struttura indicata, determina	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>inibizione della sudorazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>aumento della frequenza cardiaca</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>accelerazione del transito intestinale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>inibizione della secrezione acida dello stomaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>paralisi della muscolatura striata</div></div>	Risposta esatta	C

N°	2254	Domanda	L'acetilcisteina contiene i tre gruppi funzionali aventi la struttura sotto indicata. Quale, tra i gruppi funzionali indicati, è principalmente responsabile dell'attività mucolitica del principio attivo? Il gruppo	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>(I)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>(II)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>(III)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>carbonilico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2256	Domanda	Effetti collaterali delle fenotiazine sono:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ipertensione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ipersalivazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sintomi parkinsoniani</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>aumento dello stato di vigilanza</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>insonnia</div></div>	Risposta esatta	C




N°	2257	Domanda	Le immunoglobuline umane antitetaniche si somministrano:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>per ottenere un'immunizzazione attiva del soggetto a rischio di infezione tetanica</div><div>per ottenere un'immunizzazione passiva del soggetto a rischio di infezione</div><div>come richiamo anticorpale nel soggetto che abbia completato da non più di cinque anni la vaccinazione antitetanica</div><div>per ottenere una vaccinazione del soggetto a rischio di infezione tetanica</div><div>a scopo precauzionale, nel soggetto che abbia completato da non più di cinque anni la vaccinazione antitetanica</div></div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2259	Domanda	Quale, tra i farmaci antimicrobici seguenti, agisce sulla parete cellulare batterica?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>cefalosporine</div><div>polimixine</div><div>eritromicine</div><div>dapsone</div><div>nessuno</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2260	Domanda	Nei glaucoma ad angolo aperto sono impiegati	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>gli inibitori dell' anidrasa carbonica</div><div>gli antagonisti dei recettori beta adrenergici</div><div>gli inibitori della colinesterasi</div><div>gli agonisti dei recettori muscarinici</div><div>tutte le classi di farmaci elencate</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2258	Domanda	Il limite di età per essere ammessi al concorso per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche è:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>70 anni</div><div>65 anni</div><div>60 anni</div><div>55 anni</div><div>Non ci sono limiti di età</div></div></div></div>	Risposta esatta	C




N°	2261	Domanda	La metoprolamide ha la struttura indicata. Quale delle affermazioni sotto riportate è riferita a tale principio attivo e corretta?	<div> <input type="radio"/> A è contenuta nei medicinali utilizzabili come anestetici locali </div> <div> <input type="radio"/> B agisce da coadiuvante di alcuni FANS nella terapia dell'emicrania </div> <div> <input type="radio"/> C è un agonista dopaminergico </div> <div> <input type="radio"/> D la sua struttura è correlabile a quella dei butirofenoni </div> <div> <input type="radio"/> E tutte le indicazioni sono corrette </div>	Risposta esatta	B
N°	2262	Domanda	L'eparina è assorbita se viene somministrata	<div> <input type="radio"/> A in forma farmaceutica gastroresistente </div> <div> <input type="radio"/> B in forma farmaceutica non gastroresistente </div> <div> <input type="radio"/> C per via rettale </div> <div> <input type="radio"/> D per inalazione </div> <div> <input type="radio"/> E per via sottocutanea </div>	Risposta esatta	E
N°	2263	Domanda	Il farmacista radiato dall'Albo professionale, può essere reinscritto?	<div> <input type="radio"/> A no </div> <div> <input type="radio"/> B sì, purché siano trascorsi due anni dal provvedimento di radiazione </div> <div> <input type="radio"/> C sì, purché siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione </div> <div> <input type="radio"/> D sì, purché siano trascorsi quattro anni dal provvedimento di radiazione </div> <div> <input type="radio"/> E sì, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione </div>	Risposta esatta	E
N°	2264	Domanda	La biodisponibilità di un farmaco somministrato per os esprime:	<div> <input type="radio"/> A la quota assorbita </div> <div> <input type="radio"/> B l'entità della clearance </div> <div> <input type="radio"/> C la quota che raggiunge immodificata il circolo sistemico </div> <div> <input type="radio"/> D la quota legata alle proteine plasmatiche </div> <div> <input type="radio"/> E la quota legata alle proteine tissutali </div>	Risposta esatta	C

N°	2265	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il prefisso "gli" nella Denominazione Comune?	<div><div><div>A</div><div>ormoni progestativi</div></div><div><div>B</div><div>anestetici locali</div></div><div><div>C</div><div>steroidi con gruppi acetilici</div></div><div><div>D</div><div>ormoni estrogeni</div></div><div><div>E</div><div>antipertiglicemici di seconda generazione</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2267	Domanda	Che cosa indica la tabella n.2 della Farmacopea Ufficiale?	<div><div><div>A</div><div>i pesi atomici relativi</div></div><div><div>B</div><div>gli apparecchi e gli utensili obbligatori in farmacia</div></div><div><div>C</div><div>la sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave</div></div><div><div>D</div><div>gli stupefacenti</div></div><div><div>E</div><div>i medicinali di cui le farmacie devono essere provviste obbligatoriamente</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2268	Domanda	Per la realizzazione di creme base la F.U. prescrive di utilizzare:	<div><div><div>A</div><div>acqua destinata al consumo umano bollita 24 ore prima dell'impiego</div></div><div><div>B</div><div>acqua depurata ottenuta mediante distillazione, scambio ionico, osmosi inversa o qualsiasi altro metodo adeguato, a partire da acqua conforme al consumo umano, bollita di recente</div></div><div><div>C</div><div>acqua depurata</div></div><div><div>D</div><div>acqua distillata ottenuta mediante scambio ionico bollita 72 ore prima dell'impiego</div></div><div><div>E</div><div>acqua distillata ottenuta mediante scambio ionico bollita 24 ore prima dell'impiego</div></div></div>	Risposta esatta	B



N°	2269	Domanda	Le curve indicate in figura con le lettere A e B si riferiscono a due farmaci A e B che agiscono sul sistema parasimpatico. A quale delle coppie di sostanze sotto elencate potrebbero corrispondere	<div><div><input type="radio"/> A</div> acetilcolina (curva A) e atropina (curva B)</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> acetilcolina e carbacolo</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> acetilcolina in presenza di atropina (curva A) e atropina (curva B)</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> acetilcolina (curva A) e acetilcolina in presenza di atropina (curva B)</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> più di una delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta	E
N°	2270	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce la clantromicina?	<div><div><input type="radio"/> A</div> sintesi proteica ribosomiale</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> membrana citoplasmatica</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> metabolismo energetico della cellula batterica</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> acidi nucleici della cellula batterica</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> parete cellulare batterica</div>	Risposta esatta	A
N°	2271	Domanda	L'amantadina, avente la struttura indicata, è un farmaco usato nel morbo di Parkinson; si ritiene che essa	<div><div><input type="radio"/> A</div> aumenti la liberazione di dopamina a livello dell'encefalo</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> potenzi l'attività del GABA</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> aumenti i livelli di acetilcolina nell'encefalo</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> svolga più di una delle azioni indicate</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> diminuisca la liberazione di dopamina nell'encefalo</div>	Risposta esatta	A
N°	2272	Domanda	La suddivisione in classi dei dispositivi medici ai sensi del D.Lgs.46/97 ha principalmente lo scopo di individuare:	<div><div><input type="radio"/> A</div> i soggetti che possono utilizzare il dispositivo;</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> i canali di vendita e distributori dei dispositivi;</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> il prezzo dei dispositivi;</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> le classi di rischio e di conseguenza le procedure di attestazione della conformità dei dispositivi.</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> la categoria terapeutica dei dispositivi</div>	Risposta esatta	D

N°	2273	Domanda	La F.U. prevede che l'acqua per preparazioni iniettabili venga ottenuta mediante
A		osmosi inversa	
B		microfiltrazione	
C		distillazione	
D		osmosi	
E		resine a scambio ionico	
Risposta esatta	C		


N°	2274	Domanda	Per il trattamento di quale delle patologie indicate può essere utilizzato il calcio edotato bisodico avente la formula indicata
			
A		morbo di Parkinson	
B		osteoporosi	
C		avvelenamento da piombo	
D		artrite reumatoide	
E		più di una tra quelle riportate	
Risposta esatta	C		

N°	2275	Domanda	Quali delle interazioni farmacocinetiche indicate sono possibili?
A		interazioni che alterano l'escrezione renale	
B		tutte le indicazioni sono corrette	
C		interazioni dovute a variazioni del legame con le proteine plasmatiche	
D		interazioni con il ciclopropano P450	
E		interazioni che alterano l'assorbimento	
Risposta esatta	B		

N°	2276	Domanda	Interferone beta è approvato:
A		per la terapia dell'epatite B	
B		per la terapia dell'epatite C	
C		per la terapia della sclerosi multipla	
D		per la terapia della sclerosi laterale amiotrofica	
E		per nessuna di queste patologie	
Risposta esatta	C		

N°	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta
2277	<p>Domanda Le prescrizioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata sono consentite</p>	2279	<p>Domanda Il fenobarbital</p>	<p>Risposta esatta E</p>
<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<p>solo se l'autorizzazione è stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo</p> <p>non è mai consentita</p> <p>e' consentita se vi è il consenso informato del paziente e l'assunzione di responsabilità del medico</p> <p>dipende dalla classe ATC di appartenenza del principio attivo</p> <p>deve essere previamente autorizzata dal Ministero della Salute</p>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<p>inibisce la sintesi del GABA</p> <p>inibisce il reuptake del GABA</p> <p>aumenta il rilascio del GABA dalle terminali presinaptiche</p> <p>inibisce la trasmissione nervosa GABA-ergica</p> <p>è un modulatore positivo del recettore GABA-A</p>	


N°	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
2278	Quale delle indicazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di battericida? Sostanza che	2280	L'assorbimento di un farmaco somministrato per via sottocutanea è favorito da:	A	B
	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	A	B
	<div><div>uccide i batteri</div><div>impedisce la crescita di batteri</div><div>impedisce la crescita di microorganismi</div><div>uccide i microorganismi</div><div>combatte i virus</div></div>		<div><div>contemporanea somministrazione di un vasocostrittore</div><div>aumento locale del flusso sanguigno</div><div>abbassamento della temperatura a livello locale</div><div>shock circolatorio</div><div>stasi ematica</div></div>	B	B




N°	2281	Domanda	Quale degli aggettivi sotto riportati definisce nella maniera più corretta un farmaco che uccide i batteri	<div><div><div>A</div></div><div>antimicrobico</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>batteriostatico</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>chemioterapico</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>battericida</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>antibiotico</div></div>		
N°	2283	Domanda	Un paziente ha recentemente iniziato la terapia con un antipertensivo. Accusa una tosse fastidiosa ed incessante. La causa più probabile della tosse è dovuta al:	<div><div><div>A</div></div><div>Captopril</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Losartan</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Minoxidil</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Propanololo</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Verapamil</div></div>		Risposta esatta A

N°	2282	Domanda	Gli anticorpi monoclonali sono:	<div><div><div>A</div></div><div>composti polinsaturi</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>parti di membrana cellulare</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>frammenti di DNA</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>proteine</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>oligopeptidi</div></div>		Risposta esatta D
N°	2284	Domanda	L'acido fusidico trova impiego in caso di	<div><div><div>A</div></div><div>tularemie</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>stafilococchi</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>oncomicosi</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>meningiti</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>sepsi da Gram negativi</div></div>		Risposta esatta B





N°	2285	Domanda	L'attività antimalarica della cloroquina avviene in la struttura indicata è dovuta a:
			
		<div><div><input type="radio"/> A</div>intercalazione con il DNA del protozoo</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>inibizione della polimerizzazione dell'eme ad emozoina</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>inibizione della digestione dell'emoglobina da parte del protozoo</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>tutte le indicazioni sono corrette</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>altro meccanismo non ancora accertato</div>	Risposta esatta D
N°	2286	Domanda	Come si conservano in farmacia le preparazioni a base di sostanze velenose?
		<div><div><input type="radio"/> A</div>obbligatoriamente in armadio chiuso a chiave, insieme agli stupefacenti delle tabelle I e II</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>obbligatoriamente in armadio chiuso a chiave, ma separati dagli stupefacenti</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>senza alcuna particolare cautela o formalità</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>secondo le modalità stabilite nell'apposito volume sulle preparazioni velenose della F. U.</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>adottando ogni cautela utile ad evitare situazioni pericolose</div>	Risposta esatta E
N°	2287	Domanda	La pubblicità presso il pubblico è consentita previa autorizzazione
		<div><div><input type="radio"/> A</div>per medicinali senza obbligo di ricetta medica, aventi determinate caratteristiche</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>per medicinali ad azione simpaticolitica</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>per i medicinali non soggetti a prescrizione medica speciale</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>per i medicinali diversi dagli iniettabili</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>per tutti i medicinali preconfezionati prodotti industrialmente</div>	Risposta esatta A
N°	2288	Domanda	Quale tra i seguenti, rientra tra i nuovi servizi che le farmacie potranno erogare nell'ambito del SSN in base al DLgs 153/2009?
		<div><div><input type="radio"/> A</div>le convenzioni con gli ambulatori medici</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>l'assistenza domiciliare integrata</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>la presenza di psicologi</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>la prescrizione di diete</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>la presenza di bibliologi</div>	Risposta esatta B



N°	2289	Domanda	A quale delle indicazioni seguenti corrisponde maggiormente il termine "compliance" riferito alla pratica terapeutica	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	alle complicazioni che possono insorgere nella assunzione del farmaco alla facilità di assunzione consentita dalla particolare forma farmaceutica del farmaco alla completa adesione del paziente alla terapia prescritta alla stretta osservanza delle norme deontologiche nella spedizione della ricetta alla stretta attuazione delle norme legislative nella spedizione della ricetta	Risposta esatta	C
N°	2291	Domanda	Quale dei seguenti recettori è accoppiato all'idrolisi dei polifosfoinositidi?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	beta adrenergico M2 muscarinico 5-HT3 serotoninergico nicotinico alfa1 adrenergico	Risposta esatta	E
N°	2292	Domanda	Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti che vengono aggiunti alle polveri allo scopo di far aumentare la scorrevolezza entro lo spazio delle matrici delle macchine per compresse prendono il nome di "glidanti". Quale tra le sostanze sotto indicate rientra tra i "glidanti"?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	biossido di titanio lattosio fosfato bibasico di calcio cellulosa microcristallina silice colloidale	Risposta esatta	E




2293	N°	Domanda	I diuretici tiazidici NON sono indicati:	<div><div><div>A</div><div>nell'ipertensione arteriosa</div></div><div><div>B</div><div>nell'insufficienza cardiaca congestizia</div></div><div><div>C</div><div>nell'ipercalcemia idiopatica</div></div><div><div>D</div><div>nel diabete insipido nefrogeno</div></div><div><div>E</div><div>nell'iperuricemia</div></div></div>	Risposta esatta	E
2295	N°	Domanda	Quale delle seguenti sostanze rallenta il processo di autoossidazione dei grassi?	<div><div><div>A</div><div>butilidrossianisolo</div></div><div><div>B</div><div>miristato di isopropile</div></div><div><div>C</div><div>solfato di rame</div></div><div><div>D</div><div>alcol benzilico</div></div><div><div>E</div><div>estere acetico dell'alcol cetosteirilico</div></div></div>	Risposta esatta	A

[illegible]

N°	2297	Domanda	Le preparazioni gastroresistenti, come definite nella F.U., appartengono alle forme:				
			<div><div>A</div>a rilascio ritardato</div> <div><div>B</div>a rilascio prolungato</div> <div><div>C</div>a rilascio ripetuto</div> <div><div>D</div>a rilascio protratto</div> <div><div>E</div>a rilascio lento</div>				
						Risposta esatta	A


N°	2299	Domanda	Il termine OTC indica				
			<div><div>A</div>medicinale di impiego ospedaliero</div> <div><div>B</div>medicinale ad esclusivo uso ospedaliero</div> <div><div>C</div>medicinale da banco o di automedicazione</div> <div><div>D</div>medicinale daiglico</div> <div><div>E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>				
						Risposta esatta	C

N°	2300	Domanda	I sennosidi (glicosidi antrachinonici):				
			<div><div>A</div>inibiscono la Na⁺-K⁺ ATPasi</div> <div><div>B</div>inibiscono la secrezione intraluminale di acqua</div> <div><div>C</div>inducono la Na⁺ - K⁺ ATPasi</div> <div><div>D</div>possono provocare iperkaliemia</div> <div><div>E</div>rappresentano il trattamento di prima scelta nella costipazione cronica</div>				
						Risposta esatta	A




N°	2301	Domanda	Quali elementi devono essere obbligatoriamente presenti nella richiesta per l'approvvigionamento di medicinali stupefacenti delle tabelle II sez. A, C e D nei cantieri di lavoro ?	N°	2303	Domanda	Degli accoppiamenti indicati, qual è quello corretto
		<div><div>A</div>nome dell'azienda e del responsabile del cantiere</div>				<div><div>A</div>Nifedipina - alfa-bloccante - Antipertensivo</div>	
		<div><div>B</div>nome dell'azienda e del legale rappresentante del datore di lavoro</div>				<div><div>B</div>Carvedilolo - ACE-inibitore - Antipertensivo</div>	
		<div><div>C</div>nome dell'azienda, luogo in cui è ubicato il cantiere e numero dei lavoratori addetti</div>				<div><div>C</div>Enalapril - beta-bloccante - Antipertensivo</div>	
		<div><div>D</div>dipende dalla disciplina stabilita dalla Regione</div>				<div><div>D</div>Doxazosina - Diuretico - Antipertensivo</div>	
		<div><div>E</div>estremi dell'autorizzazione dell'ufficio del lavoro competente per territorio</div>				<div><div>E</div>Ambodipina - Ca2+-antagonista - Antipertensivo</div>	
		Risposta esatta	C			Risposta esatta	E


N°	2302	Domanda	Nel trattamento orale delle ipercolesterolemie vengono usati in associazione:	N°	2304	Domanda	L'indicazione dell'acido acetilsalilico a bassi dosaggi nella profilassi antitrombotica si basa
		<div><div>A</div>genfibrozil e bezafibrato</div>				<div><div>A</div>su fattori farmacodinamici</div>	
		<div><div>B</div>inibitori della HMG reduttasi</div>				<div><div>B</div>su fattori genetici</div>	
		<div><div>C</div>pravastatina e colestiramina</div>				<div><div>C</div>su fattori metabolici</div>	
		<div><div>D</div>genfibrozil e amoxicillina</div>				<div><div>D</div>sul comportamento di tipo produg</div>	
		<div><div>E</div>simvastatina ed oxacillina</div>				<div><div>E</div>sul comportamento di tipo farmaco-ritardo</div>	
		Risposta esatta	C			Risposta esatta	A



N°	2305	Domanda	Il GABA ha una struttura	<div><div><div>A</div></div><div>amminoaacidica</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>catecolica</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>indolica</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>imidazolica</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>steroida</div></div>
----	------	---------	--------------------------	--




N°	2309	Domanda	I barbiturici interferiscono a livello della neurotrasmissione		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>dopaminergica</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>adrenergica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>gabaergica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>serotoninergica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>istaminergica</div>	Risposta esatta	C
N°	2311	Domanda	L'espressione "ricco in fibra" ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006 si configura come:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>una indicazione (claim) sulla salute</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>una indicazione (claim) sulla riduzione di un fattore di rischio di malattia</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>una indicazione (claim) nutrizionale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>nessuna indicazione è corretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>un'indicazione obbligatoria da riportare in etichetta per alimenti con elevato tenore di fibra</div>	Risposta esatta	C

N°	2310	Domanda	Quale dei principi attivi riportati presenta attività sedativa centrale?		
		<div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>il fenobarbitale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>tutti quelli riportati</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>il bromazepam avente la struttura riportata a lato</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>il diazepam</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>il meprobamato</div>	Risposta esatta	B
N°	2312	Domanda	Quale dei seguenti agenti cardiovascolari viene classificato chimicamente come glucoside:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>amlodipina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>colestiramina</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>diglossina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>ramipril</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>streptochinasi</div>	Risposta esatta	C



N°	2313	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti riguardanti il glucagone è corretta	<div><div><div>A</div><div>è un composto di natura glucidica</div></div><div><div>B</div><div>è un composto di natura peptidica</div></div><div><div>C</div><div>si usa per le emergenze iperglicemiche</div></div><div><div>D</div><div>abbassa la formazione di glucosio ematico</div></div><div><div>E</div><div>è somministrabile per os</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2315	Domanda	Quale dei principi attivi indicati presenta un meccanismo di azione simile a quello del cromoglicato	<div><div><div>A</div><div>salbutamolo</div></div><div><div>B</div><div>oriprenalina</div></div><div><div>C</div><div>ipratropio bromuro</div></div><div><div>D</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div><div><div>E</div><div>becometasone</div></div></div> <div><chem>CC1=CC=C2C(=C1)OC(=C(C=C2)OC(=O)COC(O)COC(=O)COC(=O)C)C(=O)C</chem></div>	Risposta esatta	D
N°	2316	Domanda	I plasmidi sono	<div><div><div>A</div><div>batteri</div></div><div><div>B</div><div>cellule del plasma</div></div><div><div>C</div><div>molecole di DNA circolare</div></div><div><div>D</div><div>protozoi</div></div><div><div>E</div><div>funghi</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2314	Domanda	Secondo l'OMS un soggetto normale, non a rischio, è iperteso quando ha una pressione sistolica/diastolica uguale o superiore a	<div><div><div>A</div><div>180/120</div></div><div><div>B</div><div>170/110</div></div><div><div>C</div><div>160/100</div></div><div><div>D</div><div>140/90</div></div><div><div>E</div><div>150/95</div></div></div>	Risposta esatta	D



N°	2317	Domanda Molti medicinali utilizzati per la terapia dell'acidità gastrica contengono idrossidi o sali complessi di alluminio. Quale delle affermazioni seguenti riguardanti l'alluminio è corretta	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>provoca diarrea</div> <div>I prodotti che si formano per reazione con l'acido gastrico sono insolubili a pH < 4</div> <div>in presenza di acido citrico viene favorito il passaggio del catione a livello del SNC</div> <div>può penetrare nel SNC sotto forma di gel colloidale</div> <div>più di una delle indicazioni fornite è corretta</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>con urgenza all'autorità giudiziaria;</div> <div>con urgenza all'autorità di pubblica sicurezza, se ne sia originato un referto di prognosi superiore ai tre giorni;</div> <div>con urgenza all' Autorità Sanitaria Locale</div> <div>al Ministero della Salute solo se ne sia derivato un grave peggioramento delle condizioni di salute del paziente o di un utilizzatore</div> <div>solo se si tratta di particolari categorie di dispositivi</div>	Risposta esatta	C
N°	2319	Domanda Gli operatori sanitari, che rilevano un malfunzionamento o un' alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni nell'uso di un dispositivo medico debbono segnalarlo:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>utilizzati molto comunemente</div> <div>spedibili in farmacia senza ricetta medica</div> <div>che hanno a stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e una bioequivalenza con un altro medicinale autorizzato e con brevetto scaduto</div> <div>preparati esclusivamente nell'industria</div> <div>preparati esclusivamente in farmacia</div>	Risposta esatta	C	
N°	2320	Domanda I "farmaci equivalenti" sono farmaci	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>utilizzati molto comunemente</div> <div>spedibili in farmacia senza ricetta medica</div> <div>che hanno a stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e una bioequivalenza con un altro medicinale autorizzato e con brevetto scaduto</div> <div>preparati esclusivamente nell'industria</div> <div>preparati esclusivamente in farmacia</div>	Risposta esatta	C	


N°	2321	Domanda	Delle droghe lassative, Senna, Aloe, Cascara, Frangola e Rabarbaro, quali contengono glicosidi antraenici, aventi la struttura generale indicata?
		<chem>Oc1ccc2c(c1)c(=O)c3cc(R)c(=O)c3c2Oc4occcco4</chem>	
		<div><div>A</div>soltanto Senna, Cascara e Rabarbaro</div> <div><div>B</div>soltanto Aloe, Frangola e Rabarbaro</div> <div><div>C</div>soltanto Senna, Aloe, Cascara e Frangola</div> <div><div>D</div>tutte e cinque</div> <div><div>E</div>soltanto Senna, Aloe, Frangola e Rabarbaro</div>	Risposta esatta D
N°	2322	Domanda	Uno dei sintomi dell'uso cronico di etanolo è:
		<div><div>A</div>diminuzione dei livelli epatici dell'enzima alcool deidrogenasi</div> <div><div>B</div>irritazione gastrica e sanguinamento</div> <div><div>C</div>allucinazioni</div> <div><div>D</div>ipertemia</div> <div><div>E</div>edema polmonare</div>	Risposta esatta B
N°	2323	Domanda	Sono dovuti i diritti addizionali previsti dalla tariffa nazionale dei medicinali per la dispensazione di medicinali durante le ore di chiusura diurna quando la farmacia effettua servizio "a chiamata" ?
		<div><div>A</div>no, mai</div> <div><div>B</div>sì, sempre</div> <div><div>C</div>e' a discrezione del farmacista</div> <div><div>D</div>sì, ma solo per le farmacie rurali sussidiate</div> <div><div>E</div>sì, tranne che per le ricette rilasciate dal servizio di guardia medica</div>	Risposta esatta B
N°	2324	Domanda	Quale, tra le seguenti affermazioni riguardanti i cosmetici, è corretta?
		<div><div>A</div>devono riportare la data di durata minima se la durata non è superiore a 30 mesi</div> <div><div>B</div>possono garantire la protezione totale dai raggi UV</div> <div><div>C</div>non possono essere venduti allo stato sfuso</div> <div><div>D</div>vendere cosmetici che vantano proprietà terapeutiche non costituisce reato</div> <div><div>E</div>vendere cosmetici che vantano proprietà terapeutiche costituisce reato amministrativo</div>	Risposta esatta A




N°	2325	Domanda	Quale tra i farmaci indicati è inattivo sui canali del K ⁺ ?
		<div><div>A</div><div>minoxidil</div></div>	
		<div><div>B</div><div>diazossido</div></div>	
		<div><div>C</div><div>clonidina</div></div>	
		<div><div>D</div><div>due di quelli indicati</div></div>	
		<div><div>E</div><div>pimozide</div></div>	
		Risposta esatta	D

N°	2326	Domanda	Quale tra le basi seguenti da sola consente la realizzazione di un unguento emulsionante acqua:
		<div><div>A</div><div>vaselina filante</div></div>	
		<div><div>B</div><div>vaselina idrofila</div></div>	
		<div><div>C</div><div>vaselina bianca</div></div>	
		<div><div>D</div><div>una miscela in proporzioni precise di olio di vaselina e paraffina solida</div></div>	
		<div><div>E</div><div>una qualunque delle basi indicate</div></div>	
		Risposta esatta	B


N°	2327	Domanda	Il principale meccanismo d'azione della bromocriptina, avente la struttura indicata, si identifica con:
		<div><div>A</div><div>l'inibizione dei canali voltaggio-dipendenti per il Na⁺</div></div>	
		<div><div>B</div><div>la modulazione dei recettori per la morfina</div></div>	
		<div><div>C</div><div>agonismo nei confronti dei recettori D2 per la dopamina</div></div>	
		<div><div>D</div><div>l'inibizione della COMT</div></div>	
		<div><div>E</div><div>inibizione della liposigenasi</div></div>	
		Risposta esatta	C



		<div><div></div></div>	
		<div><div>A</div><div>le infezioni delle vie respiratorie</div></div>	
		<div><div>B</div><div>le infezioni renali</div></div>	
		<div><div>C</div><div>la tubercolosi</div></div>	
		<div><div>D</div><div>le infezioni intestinali</div></div>	
		<div><div>E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	
		Risposta esatta	D

N°	2329	Domanda	In vivo, il legame farmaco-proteina è principalmente correlato al legame del farmaco con	<div><div><div><div>A</div></div><div>le globuline</div></div><div><div>B</div></div><div>l'albumina</div><div><div>C</div></div><div>le lipoproteine</div><div><div>D</div></div><div>la lecitina</div><div><div>E</div></div><div>la cheratina</div></div>		
					Risposta esatta	B
N°	2331	Domanda	La pralidossima, avente la struttura indicata, è un antidoto impiegato nella intossicazione da	<div><div><div><div>A</div></div><div>tossina botulinica</div></div><div><div>B</div></div><div>organofosforici</div><div><div>C</div></div><div>tossina tetanica</div><div><div>D</div></div><div>funghi del genere Amanita</div><div><div>E</div></div><div>strychnina</div></div>	<div><chem>CN1C=CC(=C1)N(O)C</chem></div>	
					Risposta esatta	B
N°	2330	Domanda	Al sensi della Legge 713/86 viene indicato con la definizione "Condizionamento primario" di un prodotto cosmetico	<div><div><div><div>A</div></div><div>il contenitore a diretto contatto con il prodotto cosmetico</div></div><div><div>B</div></div><div>l'imballaggio secondario</div><div><div>C</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div><div><div>D</div></div><div>il contenitore aperto privo del dispositivo di chiusura</div><div><div>E</div></div><div>l'insieme degli stampati relativi al cosmetico</div></div>		
					Risposta esatta	A
N°	2332	Domanda	Quale, tra i farmaci elencati, provoca la diminuzione della pressione arteriosa non accompagnata da tachicardia riflessa	<div><div><div><div>A</div></div><div>nifedipina</div></div><div><div>B</div></div><div>idralazina</div><div><div>C</div></div><div>clonidina</div><div><div>D</div></div><div>minoxidil</div><div><div>E</div></div><div>nitrati organici</div></div>		
					Risposta esatta	C


N°	2333	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti corrisponde maggiormente alla definizione di "forma ritardo" di un farmaco? Una forma farmaceutica in cui:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>l'azione del farmaco inizia dopo che è trascorso un tempo lungo dalla somministrazione</div><div>il farmaco, indipendentemente dall'inizio della sua azione, ha effetti prolungati nel tempo</div><div>il farmaco ha un scarsa solubilità nei grassi</div><div>il farmaco ha un'elevata solubilità in acqua</div><div>il farmaco deve essere trasformato metabolicamente prima di poter svolgere la sua azione</div></div></div></div>	Risposta esatta	B	
N°	2334	Domanda	Quale delle affermazioni riguardanti i saponi è corretta?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>I saponi modificano la tensione di vapore dell'acqua</div><div>I saponi si preparano comunemente dagli oli minerali</div><div>il pH acido dei saponi alcalini è dovuto alla dissociazione elettrolitica della molecola</div><div>I saponi anionici provenienti dai grassi animali presentano in genere un pH inferiore a 7</div><div>l'oleato sodico in presenza di cloruro di benzalconio dà un precipitato</div></div></div></div>	Risposta esatta	E	
N°	2335	Domanda	L'estrazione della morfina dall'oppio come base libera può avvenire mediante trattamento con:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>esano e soluzione acquosa a pH 7</div><div>diclorometano e soluzioni acquose a pH 3</div><div>diclorometano e acido solforico concentrato</div><div>diclorometano e acido solforico 0,1 M</div><div>diclorometano e soluzione acquosa a pH 9</div></div></div></div>		Risposta esatta	E
N°	2336	Domanda	La quantità di morfina contenuta nell'oppio polvere titolata secondo la Farmacopea Europea deve essere:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>0,4-0,5 %</div><div>1,8-2,2 %</div><div>9,8-10,2 %</div><div>4,5-5,5 %</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div></div>		Risposta esatta	C



N°	2337	Domanda	Il baclofene, avente la struttura indicata, ha azione miorelassante centrale in quanto stimola il recettore				
				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>GABA-A</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>delle benzodiazepine</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>GABA-B</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>della glicina</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>del glutammato</div>	Risposta esatta	C	
N°	2338	Domanda	Il valore di HLB può essere valutato con formule empiriche del tipo di quella sotto riportata dove S ed A rappresentano, rispettivamente, il numero di ml di NaOH necessari per saponificare 1 g di tensioattivo e per titolare 1 g della frazione acida ottenuta dalla saponificazione. Quale delle affermazioni riguardanti la formula riportata è ERRATA:				
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>i valori con essa calcolati possono essere superiori a 20</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>i valori di S/A dipendono dal numero di molecole di acido presenti nella molecola</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>il valore di S diminuisce al crescere del numero di unità polietileniche legate al sorbitano</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>il valore di A diminuisce all'aumentare del valore del peso molecolare dell'acido</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>il valore di S/A è sempre minore di uno</div>	Risposta esatta	A			
		HLB = 20 (1-S/A)					
N°	2339	Domanda	Indicare quale delle seguenti sostanze viene impiegata come conservante antimicrobico in preparazioni farmaceutiche e cosmetiche:				
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>carbossimetilcellulosa</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>crospovidone</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>ciclamato di sodio</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>sodio stearato</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>butil paraidrossibenzoato</div>	Risposta esatta	E			
N°	2340	Domanda	Quale tra i farmaci antimicrobici seguenti riesce a provocare modificazioni della sintesi o del metabolismo degli acidi nucleici della cellula batterica.				
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>cefalosporine</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>polimixina B</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>macrolidi</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>dapsone</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuno di quelli indicati</div>	Risposta esatta	E			



N°	2341	Domanda	La doxiciclina, nella profilassi della malaria si somministra alla dose giornaliera di:	<div><div>A</div>100 mg</div> <div><div>B</div>50 mg</div> <div><div>C</div>500 mg</div> <div><div>D</div>200 mg</div> <div><div>E</div>2 g</div>	Risposta esatta	A
N°	2343	Domanda	Da chi deve essere vidimato il registro di entrata e uscita dei medicinali a base di costituenti del sangue per le farmacie?	<div><div>A</div>da nessuno, in quanto non è previsto alcun registro</div> <div><div>B</div>dai Sindaci</div> <div><div>C</div>dall'A.S.L.</div> <div><div>D</div>dai Prefetti</div> <div><div>E</div>dall'Ordine dei Farmacisti</div>	Risposta esatta	A
N°	2342	Domanda	Nella autodiagnosi riguardanti l'assetto lipidico eseguibile con le più comuni apparecchiature presenti in farmacia, quale è il parametro che viene misurato	<div><div>A</div>la frazione di colesterolo indicata come "Col HDL"</div> <div><div>B</div>la frazione di colesterolo indicata come "Col LDL"</div> <div><div>C</div>il colesterolo totale (Col tot)</div> <div><div>D</div>i trigliceridi</div> <div><div>E</div>più di uno tra quelli elencati</div>	Risposta esatta	C
N°	2344	Domanda	Un antagonismo farmacologico recettoriale competitivo è caratterizzato da:	<div><div>A</div>nessuna variazione dell'affinità dell'agonista per il recettore</div> <div><div>B</div>incapacità dell'agonista di raggiungere l'effetto massimo</div> <div><div>C</div>aumento dell'affinità dell'agonista per il recettore</div> <div><div>D</div>diminuzione della quantità di agonista che si lega al recettore</div> <div><div>E</div>nessuna delle indicazioni elencate</div>	Risposta esatta	D



N°	2345	Domanda	Per le ricette non ripetibili a carico del servizio sanitario l'obbligo di conservazione per sei mesi è soddisfatto	<div><div><input type="radio"/> A</div>dalla spedizione alla A.S.L. per il rimborso</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>da direttive regionali</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>Da direttive della A.S.L.</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>dalla conservazione della fotocopia della ricetta</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>da una prescrizione redatta su carta bianca</div>	Risposta esatta	A
N°	2346	Domanda	Per la vendita in farmacia dei presidi medico-chirurgici occorre	<div><div><input type="radio"/> A</div>la sola autorizzazione all'esercizio della farmacia</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>un'autorizzazione commerciale specifica</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>l'iscrizione alla Camera di Commercio</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>l'autorizzazione del Ministero della Salute</div>	Risposta esatta	A
N°	2347	Domanda	Il meccanismo d'azione di captopril (I) ed enalapril (II) consiste nel	<div><div><input type="radio"/> A</div>aumentare la velocità di filtrazione glomerulare e indurre una diminuzione della diuresi</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>provocare una spiccata induzione enzimatica a livello renale</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>inibire l'enzima di conversione dell'angiotensina I ad angiotensina II a livello renale</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>inibire l'enzima di conversione dell'angiotensinogeno ad angiotensina a livello epatico</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>stimolare l'enzima di conversione dell'angiotensinogeno ad angiotensina a livello epatico</div>	Risposta esatta	C
N°	2348	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sugli agenti cancerogeni è FALSA?	<div><div><input type="radio"/> A</div>i promotori sono cancerogeni epigenetici</div> <div><div><input type="radio"/> B</div>tutti i cancerogeni sono genotossici</div> <div><div><input type="radio"/> C</div>i cancerogeni completi agiscono anche come promotori</div> <div><div><input type="radio"/> D</div>i cancerogeni completi sono mutageni</div> <div><div><input type="radio"/> E</div>gli immunosoppressori aumentano il rischio di cancro</div>	Risposta esatta	B

N°	2349	Domanda	Le seguenti situazioni costituiscono indicazione per l'uso dei diuretici dell'ansa, ad ECCEZIONE di:		N°	2351	Domanda	Gli effetti della nifedipina possono essere potenziati dall'assunzione contemporanea di farmaci:	
		<input type="checkbox"/> A	edema polmonare acuto				<input type="checkbox"/> A	calcio antagonisti	
		<input type="checkbox"/> B	edemi di origine cardiaca				<input type="checkbox"/> B	ipoglicemizzanti orali	
		<input type="checkbox"/> C	edemi refrattari				<input type="checkbox"/> C	MAO inibitori	
		<input type="checkbox"/> D	ipomagnesemia				<input type="checkbox"/> D	digitalici	
		<input type="checkbox"/> E	ipercalcemia				<input type="checkbox"/> E	antiaggreganti piastrinici	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	C

N°	2350	Domanda	Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti che vengono aggiunti alle polveri allo scopo di migliorare lo scorrimento, prendono il nome di		N°	2352	Domanda	E' consentito dalla normativa l'impiego di medicinali off label?	
		<input type="checkbox"/> A	leganti				<input type="checkbox"/> A	no	
		<input type="checkbox"/> B	disintegranti				<input type="checkbox"/> B	sì, a determinate condizioni	
		<input type="checkbox"/> C	lubrificanti				<input type="checkbox"/> C	non si tratta di materia normativamente disciplinata	
		<input type="checkbox"/> D	glidanti				<input type="checkbox"/> D	solo per i medicinali di importazione	
		<input type="checkbox"/> E	diluenti				<input type="checkbox"/> E	solo per la terapie di particolari patologie	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	B



N° 2355 Domanda Il captopril agisce mimando la conformazione dell'angiotensina II

nel CYP 450

A

a livello della tasca enzimatica dell'ACE

B

nei recettori nicotinici gangliari

C

nei recettori adrenergici cardiaci


D

nessuna delle indicazioni è corretta

E

Risposta esatta

2353 Domanda Il 6-glucuronil derivato avente la struttura indicata è uno dei principali metaboliti della morfina. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Esso



A è completamente inattivo come quasi tutti i glucocorticoidi derivati

B ha la stessa attività della morfina ed è anche in grado di passare la barriera ematoencefalica

C è un metabolita della morfina che si forma in quantità estremamente piccole

D è inattivo come analgesico-narcotico ma è tossico

E è attivo a livello periferico in quanto non riesce a passare la barriera ematoen-

Risposta esatta

N° 2356 Domanda Quale dei seguenti inibitori enzimatici agisce con un meccanismo di "substrato suicida":

A sulfanilammide

B 5-fluorouracile

C benzilpenicillina

D nessuno di quelli

E selegilina

Risposta esatta E

N° 2354 Domanda I recettori nicotinici sono

A recettori di membrana associati a proteine G


B canali ionici per lo ione Na^+

C recettori citosolici

D recettori nucleari


E più di una indicazione è corretta

Risposta esatta **B**




N°	2357	Domanda	I pro-farmaci sono	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>placebo</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>farmaci attivi che vengono inattivati per biotrasformazione</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>molecole che vengono attivate per biotrasformazione</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>farmaci omeopatici</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>farmaci modello nella progettazione di nuovi farmaci</div>	Risposta esatta	C
N°	2356	Domanda	Nel composto rappresentato dalla struttura indicata, l'atomo di cloro, spesso presente nelle benzodiazepine, è stato sostituito da un nitrogruppo. Tale modifica strutturale sposta l'attività farmacologica del composto verso un'azione	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antidepressiva</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>ipnotica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>antipsicotica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>analgesica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>tranquillante</div>	Risposta esatta	B


N°	2359	Domanda	In un cosmetico può essere utilizzato qualsiasi ingrediente come filtro solare?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>sì, purché sicuro</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>sì, purché sia comprovata l'attività schermante dei raggi UV</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>no, solo gli ingredienti riportati nell'Allegato V della Legge 713/86</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>no, solo gli ingredienti riportati in F.U.</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>più di una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	C
N°	2360	Domanda	Quale è l'attività farmacologica fondamentale del principio attivo appartenente alla famiglia degli acidi fenamici ed avente la struttura indicata	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antinfiammatoria</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>antimicotica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>antifungina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>antiasmatica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>antimalarica</div>	Risposta esatta	A

CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)c2ccccc2C(=O)O


N°	2361	Domanda	Quali delle seguenti affermazioni sull'arancio amaro (<i>Citrus aurantium</i> L. ssp. amara Engl.) è corretta?	N°	2363	Domanda	La vendita della saccarina è riservata alle farmacie?		
		<div><div><div>A</div><div>contiene emetina, alcaloide ad azione antiemetica</div></div><div><div>B</div><div>contiene reserpina, alcaloide ad azione simpaticolitica</div></div><div><div>C</div><div>contiene efedrina, amina ad azione simpaticomimetica</div></div><div><div>D</div><div>contiene sinefrina, amina ad azione simpaticomimetica</div></div><div><div>E</div><div>contiene yohimbina, alcaloide ad azione stimolante centrale</div></div></div>				<div><div><div>A</div><div>sì, con l'obbligo di presentazione di ricetta medica</div></div><div><div>B</div><div>no</div></div><div><div>C</div><div>sì, senza obbligo di presentazione di ricetta medica</div></div><div><div>D</div><div>no, è vietata</div></div><div><div>E</div><div>sì, se è in quantità superiore a 5 g</div></div></div>		Risposta esatta	D
N°	2362	Domanda	I medicinali a base di buprenorfina devono essere prescritti	N°	2364	Domanda	Lo spironolattone è considerato il diuretico di elezione per il trattamento di		
		<div><div><div>A</div><div>con ricetta non ripetibile</div></div><div><div>B</div><div>su ricetta in triplice copia a ricalco o, in alternativa, su ricetta del Servizio Sanitario Nazionale qualora prescritti per la terapia del dolore</div></div><div><div>C</div><div>unicamente su ricetta in triplice copia a ricalco</div></div><div><div>D</div><div>dipende dalla via di somministrazione della preparazione prescritta</div></div><div><div>E</div><div>ricetta limitativa</div></div></div>				<div><div><div>A</div><div>ipertensione arteriosa</div></div><div><div>B</div><div>edema cerebrale</div></div><div><div>C</div><div>glaucoma</div></div><div><div>D</div><div>scompenso cardiaco</div></div><div><div>E</div><div>cirrosi epatica e ascite</div></div></div>		Risposta esatta	B




N°	2365	Domanda	L'impiego di quale dei seguenti farmaci antiepilettici può provocare una rara ma grave epatotossicità	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>etosuccinimide</div><div>acido valproico</div><div>fenitoina</div><div>carbamazepina</div><div>clonazepam</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2367	Domanda	La meloclopramide ha la struttura indicata. Quale delle affermazioni sottorportate è corretta? La meloclopramide	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>è contenuta in specialità medicinali antilemiche</div><div>ha azione procinetica</div><div>a dosi elevate può indurre effetti extrapiramidali</div><div>la sua struttura è correlabile a quella delle fenclazine</div><div>tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div></div> <div><chem>CNc1cc(OC)c(cc1C(=O)NCCN)Cl</chem></div>	Risposta esatta	E
N°	2366	Domanda	Quale, tra i farmaci menzionati, non dà tolleranza:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>barbiturici</div><div>morfini</div><div>lansoprazolo</div><div>amfetamina</div><div>benzodiazepine</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2368	Domanda	Quale delle sostanze elencate si potrebbe utilizzare in uno sciroppo avente proprietà antitussive e da utilizzare come farmaco OTC?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>melorano racemico</div><div>levopropossifene</div><div>destrometorano</div><div>più di una di quelle indicate</div><div>nessuno di quelle indicate</div></div>	Risposta esatta	C



2369	N°	Domanda	I preparati a base di arancio amaro (epicarpo di <i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>amara</i> Engl.) hanno effetti:	<div><div><div>A</div></div><div>di induzione di sazietà</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>lipolitici</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>depurativi</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>inibenti l'assorbimento dei grassi</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	B
2370	N°	Domanda	Sulla cute lesa deve essere applicato	<div><div><div>A</div></div><div>un presidio medico chirurgico disinfettante</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>un bloccia per l'igiene umana</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>un medicinale</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>più di una indicazione è corretta</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	C
2371	N°	Domanda	I medicinali "A" e "B" sono utilizzati come antienfatici e contengono rispettivamente ondansetron e metoclopramide. Quale delle affermazioni seguenti sui due medicinali è corretta?	<div><div><div>A</div></div><div>nessuna di quelle riportate</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>l'ondansetron è un agonista su uno dei recettori della serotonina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>la metoclopramide è un agonista su uno dei recettori della serotonina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>la metoclopramide è un agonista su uno dei recettori della dopamina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>l'ondansetron è un antagonista su uno dei recettori della serotonina</div></div>	Risposta esatta	E
2372	N°	Domanda	L'acebutolo (I) e il salmeterolo (II) hanno le strutture indicate: quale delle seguenti affermazioni è corretta? Il composto	<div><div><div>A</div></div><div>(II) è un antagonista selettivo beta1</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>(II) è un agonista selettivo beta2</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>(I) è un agonista selettivo beta1</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>più di una indicazione è corretta</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>(I) è un antagonista selettivo alfa1</div></div>	Risposta esatta	B




N°	2377	Domanda	Quale, tra i seguenti parametri definisce il tempo necessario affinché la massima concentrazione plasmatica del farmaco si riduca della metà:	<div><div><div>A</div></div><div>emivita</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>c_{min}</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>c_{max}</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>t_{max}</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>AUC</div></div>		Risposta esatta	A
N°	2379	Domanda	Quali dei seguenti estratti o derivati di piante medicinali possono essere facilmente solubilizzati negli oli vegetali?	<div><div><div>A</div></div><div>gli estratti fluidi idroalcolici</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>le tincture idroalcoliche</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>gli estratti secchi idroalcolici</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>gli oli essenziali</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>le acque aromatiche</div></div>		Risposta esatta	D
N°	2380	Domanda	Indicare quale delle affermazioni riportate è corretta per le cefalosporine di terza generazione.	<div><div><div>A</div></div><div>alcune sono in grado di attraversare la barriera ematoencefalica</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>presentano notevole attività verso i batteri gram-negativi</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>sono tutte somministrabili per via orale</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>tutte le risposte sono corrette</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni meno una sono corrette</div></div>		Risposta esatta	E
N°	2378	Domanda	Quale dei seguenti recettori è dotato di attività tirosin chinasi?	<div><div><div>A</div></div><div>muscarinico M3</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>V1 per la vasopressina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>AMPA per l'acido glutammico</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>GABA-A</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>recettore per l'insulina</div></div>		Risposta esatta	E




N°	2381	Domanda Qual è l'importo del diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali per la dispensazione di medicinali durante le ore di chiusura diurna?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>e' a discrezione del farmacista</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>euro 1,55 per le farmacie urbane, Euro 2,07 per le farmacie rurali sussidiate</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>euro 2,07 per le farmacie urbane, Euro 2,58 per le farmacie rurali sussidiate</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>non è previsto alcun diritto addizionale a tale titolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>euro 2,58 per le farmacie urbane, Euro 2,07 per le farmacie rurali sussidiate</div></div>		
				Risposta esatta	B
N°	2383	Domanda E' obbligatorio riportare alla fine di ogni pagina del registro entrata e uscita stupefacenti il numero della pagina in cui prosegue la registrazione?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si, sempre</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no, mai</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, ma solo nelle operazioni di chiusura di fine anno</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, ma solo quando la registrazione non prosegue nella pagina immediatamente successiva</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si, ma solo qualora la registrazione prosegue su di un altro registro</div></div>		Risposta esatta D

N°	2382	Domanda La quota IVA da applicare ai diversi comparti merceologici commerciali presenti in farmacia, ha un valore:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>del 10%</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>del 20%</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>del 4%</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dipende dallo sconto praticato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di una risposta è corretta</div></div>		
				Risposta esatta	E
N°	2384	Domanda Gli analoghi del GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormon) si impiegano nella:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>terapia dell'ipertrofia prostatica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>terapia del carcinoma prostatico metastatico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>terapia del tumore alla mammella</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>prevenzione del carcinoma prostatico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>terapia dei tumori colon-retali</div></div>		Risposta esatta B





N°	2385	Domanda	I glicosidi cardiotattivi come la digossina esplicano il loro effetto		
			<div><div><div>A</div></div><div>diminuendo la forza di contrazione del cuore</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>aumentando la pressione arteriosa</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>diminuendo la frequenza cardiaca</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>aumentando la forza di contrazione del cuore</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>diminuendo la pressione arteriosa</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2387	Domanda	La miocamicina è		
			<div><div><div>A</div></div><div>una beta-lattamina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>una tetraciclina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>un aminoglicoside</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>un fluorochinolone</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>un macrolide</div></div>	Risposta esatta	E

N°	2386	Domanda	Alcuni medicinali sono utilizzati come sistemi terapeutici transdermici. Qual è l'indicazione terapeutica che possono avere?	<div><div><div>A</div></div><div>estrogenica</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>antinfiammatoria</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>anticinetosica</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>tutte quelle indicate</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>antipertensiva</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2388	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti riguardanti le due curve dose-effetto indicate in figura con le lettere A e B è corretta	<div><div><div>A</div></div><div>la curva A si riferisce al farmaco B in presenza di un suo antagonista competitivo</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>la curva B si riferisce al farmaco A in presenza di un suo agonista non competitivo</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>la curva A si riferisce al farmaco B in presenza di un suo agonista competitivo</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>la curva B si riferisce al farmaco A in presenza di un suo antagonista non competitivo</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	D




N°	2389	Domanda	Indicare quale tra le reazioni avverse da farmaco NON è associata all'uso di diuretici tiazidici	<div><div>A</div>ipokaliemia</div> <div><div>B</div>iponatriemia</div> <div><div>C</div>iperuricemia</div> <div><div>D</div>ipercalcemia</div> <div><div>E</div>alcalosi metabolica</div>	Risposta esatta	D
N°	2391	Domanda	L'anastrozolo ha come indicazione clinica principale:	<div><div>A</div>ipertensione</div> <div><div>B</div>carcinoma della mammella in fase avanzata in donne in post menopausa</div> <div><div>C</div>angina pectoris</div> <div><div>D</div>tumori ai testicoli</div> <div><div>E</div>nessuna delle indicazioni indicate sopra</div>	Risposta esatta	B
N°	2392	Domanda	Un farmaco che si accumula in uno o più tessuti ha un volume apparente di distribuzione	<div><div>A</div>superiore al volume dell'acqua corporea</div> <div><div>B</div>pari al volume dell'acqua corporea</div> <div><div>C</div>inferiore al volume dell'acqua corporea</div> <div><div>D</div>pari al volume dell'acqua interstiziale</div> <div><div>E</div>pari al volume dell'acqua intracellulare</div>	Risposta esatta	A
N°	2390	Domanda	A quale classe farmacologica potrebbe essere attribuito un composto avente la struttura parziale indicata?	<div><div>A</div>disinfettanti - fenoli</div> <div><div>B</div>antibatterici - chinoloni</div> <div><div>C</div>antibiotici - cefalosporine</div> <div><div>D</div>antibiotici - penicilline</div> <div><div>E</div>antibatterici - sulfamidici</div>	Risposta esatta	B




N°	2393	Domanda	L'inibizione della secrezione gastrica acida da parte dell'omeprazolo, avente la struttura indicata, è conseguenza	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>B</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>C</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>D</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> <div>E</div> </div>	<div> <div><input type="radio"/></div> <div>A</div> </div> <div> <div><input type="radio"/></div> </div>
----	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



N°	2397	Domanda	Quali degli oli elencati è più stabile in una emulsione A/O e non richiede l'aggiunta di un antiossidante?	<div><div><div>A</div><div>olio di oliva</div></div><div><div>B</div><div>olio di vaselina</div></div><div><div>C</div><div>olio di mandorle dolci</div></div><div><div>D</div><div>olio di arachidi</div></div><div><div>E</div><div>olio di jojoba</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>
N°	2399	Domanda	La simvastatina, avente la struttura riportata, e la colestiramina sono accomunati dal meccanismo con cui esplicano l'azione di ipocolesterolemizzanti orali	<div><div><div>A</div><div>dal meccanismo con cui esplicano l'azione di ipocolesterolemizzanti orali</div></div><div><div>B</div><div>per la loro comune attività di ridurre la LDL</div></div><div><div>C</div><div>per la loro azione che incrementa il metabolismo dei trigliceridi</div></div><div><div>D</div><div>per il loro sinergismo terapeutico nelle ipercolesterolemie</div></div><div><div>E</div><div>per la loro comune azione attivante delle lipasi</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>D</div>
N°	2400	Domanda	Quale delle piante medicinali indicate contiene sia principi ad azione purgante che principi ad azione emolliente cutanea?	<div><div><div>A</div><div>Bardana (<i>Arctium lappa</i> L.)</div></div><div><div>B</div><div>Aloe vera (<i>Aloe barbadensis</i> Mill.)</div></div><div><div>C</div><div>Senna (<i>Cassia acutifolia</i> Deille o <i>C. angustifolia</i> Vahl)</div></div><div><div>D</div><div>Calendula (<i>Calendula officinalis</i> L.)</div></div><div><div>E</div><div>nessuna di quelle indicate</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>





N°	2401	Domanda	Con il nome di "equivalenti" si indicano
		<input type="checkbox"/> A	principi attivi non più utilizzati per produrre specialità medicinali
		<input type="checkbox"/> B	principi attivi già brevettati da almeno 15 anni
		<input type="checkbox"/> C	i farmaci ofantici reperibili in commercio
		<input type="checkbox"/> D	principi attivi già noti che non hanno ancora trovato alcuna applicazione pratica
		<input type="checkbox"/> E	nessuna delle indicazioni è corretta
		Risposta esatta E	
N°	2403	Domanda	E' consentito il trasporto di medicinali stupefacenti per uso personale in transito alla frontiera per cittadini in uscita dal territorio italiano?
		<input type="checkbox"/> A	no mai
		<input type="checkbox"/> B	per le ipotesi normativamente previste dal DM 16.11.2007 purchè accompagnati da specifica certificazione medica
		<input type="checkbox"/> C	senza alcuna formalità qualora i viaggiatori trasportino per le proprie necessità di cura una sola confezione di ciascun medicinale
		<input type="checkbox"/> D	più di un'indicazione è corretta
		<input type="checkbox"/> E	sì, solo se accompagnati da prescrizione specialistica ospedaliera
		Risposta esatta D	


N°	2402	Domanda	Quale dei composti sotto elencati presenta pH più alto quando è sciolto in acqua
		<input type="checkbox"/> A	ioduro di potassio
		<input type="checkbox"/> B	lidocaina cloridrato
		<input type="checkbox"/> C	penicillina sale di potassio
		<input type="checkbox"/> D	chinina cloridrato
		<input type="checkbox"/> E	solfato di magnesio
		Risposta esatta C	
N°	2404	Domanda	In quale caso è consentito al farmacista preparare, senza ricetta medica, medicinali non compresi nel Formulero Nazionale?
		<input type="checkbox"/> A	su richiesta verbale del medico
		<input type="checkbox"/> B	in nessun caso
		<input type="checkbox"/> C	quando il paziente, in passato, abbia presentato ricetta medica per lo stesso medicinale
		<input type="checkbox"/> D	qualora l'impiego sia destinato a paziente con malattia rara
		<input type="checkbox"/> E	quando ha ottenuto autorizzazione preventiva dalla A.S.L.
		Risposta esatta B	



N°	2405	Domanda Informazioni aggiuntive sulle sospette reazioni avverse segnalate possono essere richieste al segnalatore da parte del Responsabile di Farmacovigilanza della struttura di appartenenza (A.S.L., Azienda Ospedaliera o IRCCS) o dall'AIFA:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>solo in caso di reazioni avverse gravi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>solo in caso di reazioni avverse non note</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>mai</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>solo per i farmaci contenuti nella lista AIFA di monitoraggio intensivo</div></div>				
				Risposta esatta	A		
N°	2406	Domanda La inibizione della diidrofollato reduttasi è il meccanismo d'azione di:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Procarbazina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Paclitaxel</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Metotrexato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Vincristina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Doxorubicina</div></div>				
				Risposta esatta	C		
N°	2407	Domanda Durante il trattamento con cloramfenicolo, indicato in struttura, quale analisi è più consigliabile praticare:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>EEG</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ECG</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>transaminasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>clearance renale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>emocromo con formula leucocitaria</div></div>			Risposta esatta	E
N°	2408	Domanda Il probenecid ha la struttura indicata ed è presente in alcuni medicinali ad attività antimicrobica. La sua attività si esplica	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>con tutti i meccanismi indicati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>modificando il metabolismo a livello degli acidi nucleici del batterio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>diminuendo la clearance renale delle penicilline</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>impedendo direttamente la crescita della parete cellulare batterica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>con meccanismi diversi da quelli indicati</div></div>			Risposta esatta	C




N°	2409	Domanda	Per l'attività antibatterica delle penicilline, aventi la struttura indicata, è indispensabile:		N°	2411	Domanda	E' sempre obbligatorio mostrare al pubblico in farmacia la Farmacopea Ufficiale?					
				<div><div><input type="radio"/> A</div><div>l'integrità dell'anello tiazolidinico</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>la presenza di una catena laterale in posizione 3</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>un gruppo -OH al posto del gruppo R</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>l'integrità dell'anello beta-lattamico</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>un doppio legame in posizione 2</div></div>	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>no, ma è opportuno</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>no, ma solo quando la farmacia esegua preparazioni magistrali</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>no, solo quando sorga contestazione sulla composizione del medicinale galenico</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>si, quando venga richiesto</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>si, ma soltanto ove la richiesta provenga da un medico o da un odontoiatra</div></div>		Risposta esatta	D					
N°	2410	Domanda	Indicare quale, tra le classi di farmaci elencate, non è indicata nel trattamento della schizofrenia	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>più di una</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>fenotiazine</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>feniletilammine</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>tiotixanti</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>butirofenoni</div></div>		N°	2412	Domanda	L'insulina glargine:	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>si può impiegare nel controllo glicemico del diabetico di tipo 1 e 2</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>ha una lunga durata d'azione</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>ha minore rischio di dare ipoglicemia, specie notturna</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>ha minore tendenza a provocare un aumento di peso rispetto all'insulina NPH (Neutral Protamin Hagedorn)</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>		Risposta esatta	E




N°	2413	Domanda Numerosi medicinali dell'apparato gastrointestinale contengono, tra gli altri, prodotti contenenti silicio che hanno proprietà antimeitoriche e che prendono il nome di dimeticone, simeticone e dimetilpolisilossano. Quale delle affermazioni sotto riportate è corretta?		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>nessuna delle indicazioni fornite è corretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>il dimeticone è un dimero del simeticone</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>delle tre sostanze attive soltanto dimeticone e polisilossano sono uguali tra loro</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>il polisilossano è un polimero del simeticone</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>le tre sostanze indicate sono uguali tra loro</div>	Risposta esatta	E
N°	2414	Domanda Indicare l'accoppiamento errato tra sostanza ed effetto:		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>LSD - allucinazioni</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>nicotina a basse dosi - bradicardia</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>caffeina - insonnia</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>amfetamina- plicosi</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>cocaína - infarto del miocardio</div>	Risposta esatta	B
N°	2415	Domanda Indicare quale delle affermazioni seguenti riferite a due medicinali contenenti, rispettivamente, idroclorotiazide ed enalapril è errata		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>sono entrambe utilizzate in terapia antipertensiva</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>una dei medicinali contiene un ACE-inibitore</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>solo uno contiene sostanze che si comportano da profarmaci</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>i due medicinali sono nella forma farmaceutica di compresse</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>sono entrambi utilizzati in terapia antipertensiva in qualità di diuretici</div>	Risposta esatta	E
N°	2416	Domanda I diuretici dell'ansa provocano alcalosi ipocloremica e aumento dell'escrezione di Ca2+ e Mg2+. Se si verifica ipomagnesemia, ciò può costituire		
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>fattore di rischio per l'insorgenza di tetano</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>elemento scatenante di una crisi di gotta</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>elemento aggravante la patologia retinica</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>fattore di rischio per l'insorgenza di aritmie cardiache</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>elemento aggravante di otolossicità</div>	Risposta esatta	D

N°	2417	Domanda	Quale delle seguenti patologie configura una indicazione all'impiego dei farmaci beta-antagonisti:		
		<input type="radio"/> A	bradilritmie		
		<input type="radio"/> B	bradicardia		
		<input type="radio"/> C	ipertensione arteriosa		
		<input type="radio"/> D	claudicatio intermittens		
		<input type="radio"/> E	costipazione		
				Risposta esatta	C
N°	2418	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la buprenorfina è FALSA?		
		<input type="radio"/> A	e' più potente della morfina nell'indurre l'effetto analgesico		
		<input type="radio"/> B	è un agonista parziale sui recettori oppioidi mu e agonista sui recettori oppioidicappa		
		<input type="radio"/> C	da sintomi di astinenza molto più attenuati della morfina		
		<input type="radio"/> D	è un principio attivo derivante dalla semisintetizzazione strutturale della morfina		
		<input type="radio"/> E	subisce una notevole 3-O-glucuronazione		
				Risposta esatta	D
N°	2419	Domanda	Il cliente può rifiutare la sostituzione del medicinale prescritto con altro equivalente, proposta dal farmacista?		
		<input type="radio"/> A	no, se il prezzo è inferiore		
		<input type="radio"/> B	sì, solo se il prezzo è superiore		
		<input type="radio"/> C	sì, sempre		
		<input type="radio"/> D	sì, ma solo per i medicinali prescritti in regime di SSN		
		<input type="radio"/> E	no, mai		
				Risposta esatta	C
N°	2420	Domanda	In quale classe, tra quelle sotto riportate, può essere catalogato il piroxicam?		
		<input type="radio"/> A	amminocidi		
		<input type="radio"/> B	ossiacidi		
		<input type="radio"/> C	butipirazolidine		
		<input type="radio"/> D	acetosiacidi		
		<input type="radio"/> E	nessuna di quelle riportate		
				Risposta esatta	E

N°	2421	Domanda	Nella preparazione delle compresse, quale tra le sostanze riportate si può definire un legante?	<div><div><div>A</div><div>derivati della cellulosa</div></div><div><div>B</div><div>tutte le sostanze indicate,</div></div><div><div>C</div><div>nessuna delle sostanze indicate</div></div><div><div>D</div><div>povidone</div></div><div><div>E</div><div>saccarosio</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2423	Domanda	Quale delle seguenti proprietà, secondo la F.U., non è riferibile a compresse orodispersibili:	<div><div><div>A</div><div>compresse non rivestite</div></div><div><div>B</div><div>compresse rivestite</div></div><div><div>C</div><div>destinate ad essere poste nella bocca</div></div><div><div>D</div><div>compresse che in bocca si disperdono rapidamente prima di essere inghiottite</div></div><div><div>E</div><div>compresse che si disaggregano entro 3 minuti</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2424	Domanda	La clonidina agisce come agonista del recettore α_{2} adrenergico e può causare	<div><div><div>A</div><div>aumento della motilità intestinale</div></div><div><div>B</div><div>diminuzione dell'attività nervosa simpatica dovuta ad effetti sul SNC</div></div><div><div>C</div><div>aumento della contrattilità del miocardio</div></div><div><div>D</div><div>broncocostrizione</div></div><div><div>E</div><div>aumento sostenuto della pressione arteriosa media</div></div></div>	Risposta esatta	B



N° 2422 Domanda I messaggeri chimici che agiscono nell'organismo vengono demoliti metabolicamente. Da quale di essi, soprattutto a livello periferico, deriva il composto avente la formula rappresentata a lato e che corrisponde ad un derivato ossigenato dell'acido mandelico



- A


GABA
- B

Serotonina
- C


Dopamina
- D

Istamina
- E

Noradrenalina




N°	2425	Domanda	Quale dei seguenti esami emato-chimici è il più importante per il monitoraggio della tossicità da ciclosporina?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Azotemia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Creatininemia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Emocromo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Formula leucocitaria</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Emoglobinemia</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2427	Domanda	Su quale parte del nefrone agiscono prevalentemente i diuretici tiazidici?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ramo discendente dell'ansa di Henle</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>tubulo convolto prossimale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tratto prossimale del tubulo convolto distale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dotto collettore</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ramo ascendente dell'ansa di Henle</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2428	Domanda	Un medicinale contiene dimetcone e metoclopramide. Questo ultimo composto, avente la struttura chimica indicata, svolge, in questa particolare associazione, un'azione adiuvante di natura	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>procinetica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>anestetica locale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>spasmodica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>lassativa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>antimetorica</div></div>	Risposta esatta	A



N°	2429	Domanda	Un cosmetico può contenere lidocaina?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div>no, perché presente nell'elenco delle sostanze non ammesse</div> <div>si, se il contenuto è inferiore allo 0,2%</div> <div>si, se la sua azione è secondaria all'effetto cosmetico</div> <div>si, se il contenuto è inferiore allo 0,1%</div> <div>più di una indicazione è corretta</div>	Risposta esatta	A
N°	2431	Domanda	Un agonista è una sostanza capace di	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div>bloccare irreversibilmente il sito allosterico di un enzima</div> <div>legarsi al recettore senza attivarlo</div> <div>produrre una risposta senza legarsi ad un recettore</div> <div>bloccare irreversibilmente un recettore</div> <div>legarsi al recettore e attivarlo</div>	Risposta esatta	E
N°	2430	Domanda	Molti sali di calcio trovano applicazione in terapia. Tra le sequenze di sali sotto indicate qual è quella che esprime un contenuto crescente di calcio quando si somministrano quantità equiponderali dei sali indicati?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div>lattato-carbonato-formiato</div> <div>formiato-carbonato-lattato</div> <div>lattato-formiato-carbonato</div> <div>tutte quelle indicate</div> <div>nessuna di quelle indicate</div>	Risposta esatta	C
			<div><div>CaCO_3 carbonato</div><div>$\text{C}_2\text{H}_2\text{CaO}_4$ formiato</div><div>$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{CaO}_6$ lattato</div></div>				
N°	2432	Domanda	Quale dei farmaci indicati ha azione antiacne:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div>Calcipotriolo</div> <div>Acido salicilico</div> <div>Perossido di benzole</div> <div>Urea</div> <div>Minoxidil</div>	Risposta esatta	C


N°	2433	Domanda	La commercializzazione di piante officinali e loro derivati non presentate come aventi proprietà terapeutiche è riservata esclusivamente	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>alla farmacia</div><div>all'erboristeria</div><div>a tutti gli esercizi commerciali autorizzati ad esclusione di farmacie ed erboristerie</div><div>a nessuno dei punti vendita indicati</div><div>a tutti i punti vendita indicati</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2435	Domanda	Qual è l'impiego della pentagastrina?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>trattamento dell'ipercloridria</div><div>trattamento dell'ipodioridria</div><div>agente diagnostico della funzionalità gastrica</div><div>tutte le indicazioni fornite sono corrette</div><div>tutte le indicazioni fornite sono errate</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2436	Domanda	Nella terapia antiparkinson possono trovare impiego	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>inibitori selettivi della MAO-B</div><div>inibitori della COMT</div><div>inibitori della DOPA-decarbossilasi</div><div>tutti e tre i tipi di farmaci</div><div>solo uno tra i farmaci indicati</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2434	Domanda	Un profarmaco è:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>un precursore inattivo che viene trasformato in metaboliti attivi</div><div>un farmaco somministrato in associazione ad un altro</div><div>un farmaco inattivo</div><div>un inibitore suicida</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	A



N°	2437	Domanda Il farmacista ha l'obbligo di tenere in farmacia, in modo visibile al pubblico, una copia delle liste di trasparenza dei medicinali?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>si, solo per i medicinali appartenenti alla classe A</div> <div>si, solo per i medicinali appartenenti alla classe C</div> <div>no, perché le liste sono pubblicate sul sito internet del Ministero della Salute</div> <div>no, in quanto si tratta di liste tecniche accessibili solo ai medici e ai farmacisti</div> <div>si, se aderisce al progetto di tracciabilità del farmaco</div>	Risposta esatta	B
N°	2439	Domanda Con il termine "bulkness o voluminosità" si intende	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>il peso di 1 ml di polvere</div> <div>il numero di grammi che occupano un volume pari ad un ml</div> <div>l'inverso della densità apparente</div> <div>lo spazio vuoto che resta tra i granuli che costituiscono una polvere</div> <div>l'inverso della porosità</div>	Risposta esatta	C
N°	2440	Domanda Due enantiomeri vengono denominati "eutomero" e "distomero" in ragione della maggiore o minore attività che presentano. Quale delle indicazioni elencate si adatta maggiormente ai due isomeri in questione?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>sono agonisti sul medesimo recettore</div> <div>sono antagonisti sul medesimo recettore</div> <div>più di una indicazione è corretta</div> <div>sono isomeri ottici della stessa molecola</div> <div>sono isomeri geometrici della stessa molecola</div>	Risposta esatta	C
N°	2438	Domanda Quale dei seguenti è un ormone sintetizzato dall'ipotalamo?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>Ormone di rilascio della somatotropina (GHRH)</div> <div>Ormone di rilascio della tireotropina (TRH)</div> <div>Ormone di rilascio della corticotropina (CRH)</div> <div>tutti quelli indicati</div> <div>nessuno di quelli indicati</div>	Risposta esatta	D

N°	2441	Domanda	La tossicità degli idrocarburi aromatici policiclici è dovuta alla	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>grande liposolubilità</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>elevata delocalizzazione elettronica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>attivazione della molecola mediante epossidazione da parte degli enzimi metabolizzanti</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>facile formazione di radicali liberi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>insolubilità che ne favorisce la precipitazione nel citoplasma</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2442	Domanda	L'esercizio da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti dell'azione disciplinare si prescrive in:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un anno</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>due anni</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tre anni</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>quattro anni</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>cinque anni</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2443	Domanda	La neurotrasmissione implicata nell'azione centrale dei barbiturici è:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>adrenergica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>istaminergica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>dopaminergica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>GABAergica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>serotoninergica</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2444	Domanda	La doxazosina e la prazosina:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>attivano i recettori dopaminergici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sono indicati nella terapia dell'enuresi notturna</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sono antagonisti dei recettori alfa1 adrenergici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>vengono utilizzati nella terapia dell'ulcera gastrica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>hanno azione immunosoppressiva</div></div></div></div>	Risposta esatta	C

N°	2445	Domanda E' consentito al farmacista spedire una ricetta magistrale che prescrive una preparazione a base di principi attivi contenuti in medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata?	<div><div><div><div><div>A</div><div>solo nel caso in cui la revoca non sia stata disposta per motivi di sicurezza</div></div><div><div>B</div><div>soltanto per preparazioni per uso topico</div></div><div><div>C</div><div>l'ipotesi considerata non è disciplinata dalla normativa in vigore</div></div><div><div>D</div><div>soltanto nei casi in cui il medico indica sulla ricetta l'assunzione di responsabilità</div></div><div><div>E</div><div>nei casi in cui i principi attivi sono descritti nella Farmacopea Ufficiale</div></div></div></div></div>			
				Risposta esatta	A	
N°	2446	Domanda La F.U. definisce un contenitore con chiusura inviolabile quando:	<div><div><div><div><div>A</div><div>è chiuso con un dispositivo che rivela in modo irreversibile se il recipiente è stato aperto</div></div><div><div>B</div><div>è chiuso per fusione del materiale che lo costituisce</div></div><div><div>C</div><div>e' impermeabile a solidi, liquidi e gas in condizioni normali di manipolazione, conservazione e trasporto</div></div><div><div>D</div><div>due indicazioni sono corrette</div></div><div><div>E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div></div></div>			
				Risposta esatta	A	
N°	2447	Domanda I farmaci che possono essere considerati "isoterici classici" sono quelli in cui una porzione (o un gruppo) della molecola del primo è stata sostituita nel secondo	<div><div><div><div><div>A</div><div>con un gruppo diverso avente la stessa distribuzione elettronica</div></div><div><div>B</div><div>con un gruppo diverso avente diversa idrofobicità</div></div><div><div>C</div><div>con un gruppo diverso avente identico ingombro sterico</div></div><div><div>D</div><div>con una porzione ciclica avente un numero di termini inferiore</div></div><div><div>E</div><div>con un sostituyente che non cambia il carattere dipolare della molecola</div></div></div></div></div>			
				Risposta esatta	A	
N°	2448	Domanda Quali medicinali iniettabili possono essere consegnati dal farmacista senza presentazione di ricetta medica in caso di patologia cronica, se ricorrano le condizioni previste dalla normativa per la consegna di medicinali in caso di necessità e urgenza?	<div><div><div><div><div>A</div><div>tutti gli antibiotici monodose</div></div><div><div>B</div><div>solo l'insulina</div></div><div><div>C</div><div>tutti gli antibiotici</div></div><div><div>D</div><div>i farmaci per patologie cardiovascolari</div></div><div><div>E</div><div>gli antidolorifici</div></div></div></div></div>			
				Risposta esatta	B	



N°	2449	Domanda	L'efedrina esplica il suo effetto simpaticomimetico mediante.
A			inibizione degli enzimi MAO (monoammino ossidasi)
B			inibizione del meccanismo di reuptake della noradrenalina rilasciata nello spazio sinaptico
C			aumento della biosintesi di noradrenalina presso la terminazione sinaptica
D			liberazione della noradrenalina dalle vescicole sinaptiche
E			blocco dell'autorecettore alfa2 presinaptico
Risposta esatta			D

The chemical structure of Ephedrine is shown. It consists of a benzene ring attached to a chiral carbon atom. This carbon atom is also bonded to a hydroxyl group (-OH), a hydrogen atom (-H), and a methylamino group (-N(CH₃)₂). The stereochemistry at the chiral center is indicated with wedges and dashes.

N°	2450	Domanda	In quale classe di farmaci potrebbe essere collocata la scopolamina avente la struttura indicata
A			antagonisti beta-adrenergici
B			cortisonico orale
C			benzodiazepine orali
D			ipoglicemizzanti
E			nessuno tra quelli indicati
Risposta esatta			E

The chemical structure of Scopolamine is shown. It features a tropane bicyclic core (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane) with a phenylethoxy side chain at the 3-position. The stereochemistry at the bridgehead carbons is indicated with wedges and dashes.

N°	2451	Domanda	E' possibile per un farmacista allestire un preparato galenico contenente un principio attivo prescritto per un'indicazione terapeutica diversa da quella registrata in sede di autorizzazione all'immissione in commercio?
A			e' possibile se il medico specifica sulla ricetta le esigenze particolari che ne giustificano la prescrizione
B			e' sempre possibile dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile
C			e' possibile solo se la ricetta proviene da centro ospedaliero
D			e' possibile solo se il medico se ne assume esplicitamente e per iscritto la responsabilit�
E			non e' possibile
Risposta esatta			A
N°	2452	Domanda	Indicare il valore del pH di una soluzione acquosa 10⁻² M di etanolo:
A			nessuna delle indicazioni � corretta
B			7,5
C			6,5
D			6,0
E			7,9
Risposta esatta			A

N°	2453	Domanda	Le antracicline agiscono quali:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2455	Domanda	Se un farmaco molto legato alle proteine plasmatiche (>90%) è spiazzato da un altro farmaco somministrato, accade che:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2454	Domanda	Su quale dei seguenti recettori agisce direttamente la adrenalina (struttura indicata) per contrarre la muscolatura liscia arteriale?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><chem>CN(C)[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1</chem></div>	Risposta esatta	A
N°	2456	Domanda	In molte preparazioni farmaceutiche è necessaria la presenza di composti antibatterici. Gli antibatterici presentano un optimum di attività antibatterica all'interno di un intervallo di pH. Degli accoppiamenti seguenti [antibatterico - (valori di pH)] quale può essere ritenuto compatibile	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	Risposta esatta	A



N°	2457	Domanda	Il tè verde rispetto al tè nero:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>contiene una maggiore quantità di catechine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>contiene una quantità maggiore di xantine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>contiene una quantità minore di catechine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è più ricco di teoflavine e teubigine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>non contiene xantine</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2459	Domanda	L'acido valproico nel paziente pediatrico può causare:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>epatotossicità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>otolossicità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>emicrania</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dolori articolari</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ipertensione</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2458	Domanda	Il titolare di farmacia può essere un dipendente pubblico di ruolo?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si, senza limitazioni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, ma solo nell'ipotesi che svolga attività di insegnamento nell'università</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, purché non sia un dipendente dell'amministrazione regionale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si, purché non svolga attività di vigilanza sulle farmacie come dipendente dell'A.S.L.</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2460	Domanda	Il crack è	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>una miscela di allucinogeni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la base libera della cocaina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>uno dei principi attivi della Cannabis sativa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>una droga sedativo-ipnotica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>un adulterante dell'eroina</div></div>	Risposta esatta	B

N°2461

Domanda

I messaggeri chimici dell'organismo si formano da sostanze che vengono immesse nell'organismo con la dieta. Da quale precursore deriva l'acetilcolina

A

tirosina

B

triptofano

C

istidina

D

acido glutammico

E

serina

Risposta esattaE

N°2463

Domanda

I messaggeri chimici che agiscono nell'organismo vengono demoliti metabolicamente. Da quale di essi deriva il composto avente la formula rappresentata a lato e che corrisponde all'acido 5-idrossindolacetico

A

adrenalina

B

noradrenalina

C

serotonina

D

istamina

E

dopamina

Oc1ccc2c(c1)c(c[nH]2)CC(=O)O

Risposta esattaC

N°2462

Domanda

L'utilizzo di preparati a base di aglio (*Allium sativum* L.) può esporre al rischio di interazione farmacologica con farmaci:

A

anticoagulanti

B

antinfiammatori non steroidei

C

analgesici

D

più di una indicazione è corretta

E

antiaggreganti

Risposta esattaD

N°2464

Domanda

Il piroxicam, la cui struttura è mostrata in figura, è usato in terapia come farmaco

A

diuretico

B

sulfamidico ritardo

C

ipoglicemizzante orale

D

antinfiammatorio

E

avente uso terapeutico diverso da quelli indicati

CN1C(=O)N(C1c2ccccc2C(=O)Nc3ccccc3)S(=O)(=O)C

Risposta esattaD



N

2465

Domanda Una delle classificazioni dei principi attivi dei farmaci più utilizzata in Europa è quella che viene indicata come ATC (Anatomico-Terapeutico-Chimica). In armonia con la classificazione citata, quale delle coppie sottoriportate comprende farmaci più simili tra loro per quanto riguarda il meccanismo d'azione e la struttura?

- | | |
|---|----------------------------|
| A | nessuna di quelle indicate |
| B | M01AB e M01AC |
| C | M01 e M01A |
| D | M e M02 |
| E | M01AB05 e M01AB02 |

Risposta esatta E

N

2466

Domanda Un antagonista NON competitivo è un composto chimico che legandosi al recettore in un sito di legame


- A** diverso da quello dell'agonista, impedisce all'agonista di produrre l'effetto massimo
- B** diverso da quello dell'agonista, non esplica alcuna attività biologica
- C** identico a quello dell'agonista, è incapace di produrre un effetto
- D** identico a quello dell'agonista, può essere facilmente eliminato dall'organismo
- E** identico a quello dell'agonista evoca un effetto massimale

Risposta esatta A

 \dot{N}

2467

Domanda La difendramina ha la struttura indicata. Quale delle affermazioni seguenti che la riguardano è ERRATA?



- A** presenta spiccate attività sedative
- B** presenta scarsa attività antimuscarinica a livello gastrointestinale
- C** in alcuni Paesi fa parte di medicinali utilizzati come ipnotici
- D** appartiene alla classe degli antistaminici
- E** è un derivato della propanolamina

Risposta esatta E



 \dot{N}

2468

Domanda E' necessaria una specifica autorizzazione per detenere in farmacia medicinali a base di costituenti del sangue?


- si, sempre ☐ A
- no, mai ☐ B
- no, ma la detenzione è consentita soltanto nelle farmacie ospedaliere ☐ C
- no, se i quantitativi detenuti non superano i limiti di volta in volta fissati dal ministero ☐ D
- no, è necessaria solo per la detenzione di sangue intero ☐ E

Risposta esatta




N°	2469	Domanda	Quale delle considerazioni seguenti, riguardanti i principi attivi antimicrobici che agiscono sulla parete batterica è errata? Essi	<div> <input type="radio"/> A sono attivi esclusivamente nella fase proliferativa della cellula batterica </div> <div> <input type="radio"/> B sono attivi esclusivamente sulle cellule batteriche </div> <div> <input type="radio"/> C sono generalmente utilizzati in associazione con altri antibiotici </div> <div> <input type="radio"/> D non sono attivi sulle cellule dei mammiferi </div> <div> <input type="radio"/> E non sono attivi nella fase in cui la crescita della parete batterica è inibita da altri farmaci </div>	Risposta esatta	C
N°	2471	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce l'antimicrobico cefonid, avente la struttura indicata?	<div> <input type="radio"/> A sintesi proteica ribosomiale </div> <div> <input type="radio"/> B membrana citoplasmatica </div> <div> <input type="radio"/> C metabolismo energetico della cellula batterica </div> <div> <input type="radio"/> D acidi nucleici della cellula batterica </div> <div> <input type="radio"/> E parete cellulare batterica </div>	Risposta esatta	E
N°	2472	Domanda	I composti sotto elencati hanno la DL50 (mg/Kg) indicata per ciascuno di essi. Quale composto presenta la tossicità maggiore?	<div> <input type="radio"/> A dlossina = 1×10^{-3} </div> <div> <input type="radio"/> B nicotina = 1 </div> <div> <input type="radio"/> C tossina botulinica = 1×10^{-8} </div> <div> <input type="radio"/> D morfina solfato = 9×10^2 </div> <div> <input type="radio"/> E stricnina solfato = 2 </div>	Risposta esatta	C
N°	2470	Domanda	I farmaci bloccanti dei recettori alfa1 adrenergici possono essere impiegati nel controllo di crisi ipertensive da:	<div> <input type="radio"/> A iperdosaggio di ammine simpatomimetiche </div> <div> <input type="radio"/> B feocromocitoma </div> <div> <input type="radio"/> C cibi ricchi in tiramina in pazienti trattati con inibitori della MAO </div> <div> <input type="radio"/> D sospensione brusca del trattamento con clonidina </div> <div> <input type="radio"/> E tutte le cause indicate </div>	Risposta esatta	E

N°	2473	Domanda	Tenendo presente la principale utilizzazione terapeutica del fencobarbital, indicare, tra quelle sotto riportate, la forma farmaceutica del principio attivo che ottempera all'obbligo della sua reperibilità in farmacia, imposto dalla F.U.	<div><div><div>A</div></div><div>compresse</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>supposte</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>fiale</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>pomata</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>più di una risposta è corretta</div></div>
----	------	---------	---	---

N°	2477	Domanda	Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti che vengono aggiunti alle polveri allo scopo di far raggiungere alla compressa un peso congruo prendono il nome di "diluenti". Quale tra le sostanze sotto indicate rientra in tale gruppo	<div><div><input type="radio"/></div><div>A</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>B</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>C</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>D</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>E</div></div> <div><div>caolino</div><div>mannitolo</div><div>fosfato di calcio bibasico</div><div>silice colloidale</div><div>più di una delle sostanze indicate</div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	2479	Domanda	Gli isomeri configurazionali di tipo "ottico"	<div><div><input type="radio"/></div><div>A</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>B</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>C</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>D</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>E</div></div> <div><div>sono separati tra loro da barriere energetiche facilmente superabili</div><div>si trasformano l'uno nell'altro a temperatura ambiente</div><div>possono modificare la loro "geometria" per favorire l'interazione con il recettore</div><div>tutte le indicazioni fornite sono errate</div><div>non sono sovrapponibili</div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	2480	Domanda	Molte specialità medicinali correntemente usate per l'automedicazione, come analgesici e sintomatici nelle forme influenzali e da raffreddamento, contengono caffeina. Qual è l'azione di tale principio attivo in queste specialità?	<div><div><input type="radio"/></div><div>A</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>B</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>C</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>D</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>E</div></div> <div><div></div><div>diuretico</div><div>mucolitico</div><div>decongestionante nasale</div><div>più di una di quelle indicate</div><div>potenzia l'effetto analgesico dei FANS</div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	2478	Domanda	Quale delle seguenti classi di farmaci viene utilizzata come ipoglicemizzante?	<div><div><input type="radio"/></div><div>A</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>B</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>C</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>D</div></div> <div><div><input type="radio"/></div><div>E</div></div> <div><div>biguanidi</div><div>solfoniluree</div><div>tiazolidindioni</div><div>tutte quelle indicate</div><div>solo una di quelle indicate</div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>D</div>

N°	2481	Domanda	La paralisi muscolare indotta dai farmaci bloccanti la placca motrice è antagonizzata dalla somministrazione di:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>atropina</div><div>vancomicina</div><div>eserina</div><div>verapamil</div><div>clindamicina</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2483	Domanda	Quale dei seguenti farmaci NON è in grado di penetrare nel S.N.C.?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>N-butilscopolamina</div><div>dionidina</div><div>propranololo</div><div>atropina</div><div>metildopa</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2482	Domanda	Il procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto all'Ordine dei Farmacisti e' promosso	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>su richiesta del Ministero della Salute</div><div>su richiesta del Prefetto</div><div>d'ufficio o su richiesta del Ministro della Salute o del Procuratore della Repubblica</div><div>d'ufficio o su richiesta del Presidente della FOFI o del Ministro della Salute</div><div>d'ufficio o su richiesta del Ministro della Salute</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2484	Domanda	Riguardo all'insulina detemir si può dire che:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>mostra una minore variabilità intra-individuale rispetto ad altre insuline con caratteristiche di durata d'azione simile</div><div>la sua durata d'azione la pone tra le insuline rapide</div><div>ha minore rischio di dare ipoglicemia, specie notturna</div><div>ha minore tendenza a provocare un aumento di peso rispetto all'insulina NPH (Neutral Protamin Hagedom)</div><div>tutte le indicazioni sono corrette tranne una</div></div>	Risposta esatta	E



N°	2485	Domanda	Quale dei metodi seguenti è riportato in F.U. per la determinazione dell'acqua	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>distillazione azeotropica</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>perdita di peso per essiccamento in stufa</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>gascromatografia</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>cromatografia liquida</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>perdita di peso per essiccamento sotto vuoto</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2487	Domanda	Il blocco dei recettori beta adrenergici determina	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>diminuzione della sintesi di cAMP</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>aumentato della degradazione di cAMP</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>stimolazione delle proteinchinasi cAMP-dipendenti</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>aumentato della sintesi di cGMP</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>stimolazione delle proteinchinasi cGMP-dipendenti</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2486	Domanda	Quale, tra i farmaci antagonisti dei canali del Ca ²⁺ qui indicati, viene impiegato come antiaritmico	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>amlodipina</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>lacidipina</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>nifedipina</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>verapamil</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>nimodipina</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2488	Domanda	Utilizzare un farmaco off-label vuol dire utilizzarlo:	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div>per indicazioni non previste nel foglio illustrativo</div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div>con posologia diversa da quella riportata nel foglio illustrativo</div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div>attraverso una via di somministrazione diversa da quella autorizzata</div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div>per una fascia d'età diversa da quella indicata nel foglio illustrativo</div></div></div></div>	Risposta esatta	D

N°	2489	Domanda	Quale tra quelle elencate è un'indicazione d'uso dell'oximetazolina	<div><div><div>A</div></div><div>rinite</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>ipertensione</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>spasmi della muscolatura liscia</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>glaucoma</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2491	Domanda	Quale, tra gli effetti tossici elencati, può provocare il trattamento cronico con sulfoniluree nei pazienti diabetici?	<div><div><div>A</div></div><div>ipernatriemia</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>infarto renale</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>emicranie</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>acidosi metabolica</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>coma ipoglicemico e complicanze cardiovascolari</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2492	Domanda	L'olio di vaselina è costituito da:	<div><div><div>A</div></div><div>una miscela di mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi saturi a lunga catena di atomi di carbonio di origine naturale minerale</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>una miscela di idrocarburi a corta catena di atomi di carbonio di origine naturale vegetale</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>una miscela di idrocarburi a corta catena di atomi di carbonio di origine naturale minerale</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>una miscela di mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi saturi a lunga catena di atomi di carbonio di origine naturale vegetale</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>due indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2490	Domanda	I principali contaminanti di un biofarmaco sono:	<div><div><div>A</div></div><div>solventi</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>frammenti di degradazione</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>nullimeri</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>coloranti</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>brodo di collura</div></div>	Risposta esatta	B

N°	2493	Domanda	I radicali liberi:	<div><div><div>A</div></div><div>agiscono con meccanismo selettivo e specifico</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>possono colpire molteplici bersagli cellulari</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>agiscono principalmente inibendo la produzione di ATP</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>agiscono inibendo la trascrizione genica</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>sono chimicamente poco reattivi</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2495	Domanda	Quando deve essere chiuso il registro entrata e uscita stupefacenti per le farmacie ?	<div><div><div>A</div></div><div>mai</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>al 31 gennaio di ogni anno</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>dopo ogni ispezione</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>al 31 dicembre di ogni anno</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>ogni due anni</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2494	Domanda	I principali effetti collaterali della chinidina sono: <div><chem>COc1ccc2c(c1)cnc2C(O)C3=CCN(C3)C=C</chem></div>	<div><div><div>A</div></div><div>insonnia</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>ipertensione</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>ipertensione</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>tachicardia ventricolare</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>tinnito, offuscamento visivo</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2496	Domanda	Indicare quale classe di farmaci, tra quelle sotto elencate, necessita del controllo più rigoroso della dieta dei soggetti in terapia	<div><div><div>A</div></div><div>anti-MAO</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>antidepressivi tricyclici</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>antipertensivi</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>antiaritmici</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>purganti salini</div></div>	Risposta esatta	A






N°	2497	Domanda	Tra i conservanti antimicrobici più comunemente impiegati si annoverano le seguenti sostanze, eccetto:	N°	2499	Domanda	La biotrasformazione può rendere un farmaco:
		<div><div><div>A</div></div><div>metile p-idrossibenzoato</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>più attivo</div></div>	
		<div><div><div>B</div></div><div>benzalcolio cloruro</div></div>				<div><div><div>B</div></div><div>meno attivo</div></div>	
		<div><div><div>C</div></div><div>polisorbato 80</div></div>				<div><div><div>C</div></div><div>più tossico</div></div>	
		<div><div><div>D</div></div><div>propile p-idrossibenzoato</div></div>				<div><div><div>D</div></div><div>meno tossico</div></div>	
		<div><div><div>E</div></div><div>acido benzoico</div></div>				<div><div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	
			Risposta esatta C				Risposta esatta E
N°	2498	Domanda	In un'intossicazione accidentale da <i>Amanita muscaria</i> , avvenuta entro le 2 ore precedenti, quale dei seguenti interventi potrebbe essere appropriato?	N°	2500	Domanda	Il saggio di uniformità di massa delle forme farmaceutiche a dose unica si basa sulla determinazione della massa media di un numero di unità prelevate a caso da un lotto, pari a:
		<div><div><div>A</div></div><div>emoperfusione</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>20</div></div>	
		<div><div><div>B</div></div><div>infusione endovenosa di destrano</div></div>				<div><div><div>B</div></div><div>il 20% delle unità totali del lotto</div></div>	
		<div><div><div>C</div></div><div>soluzione fisiologica per via endovenosa</div></div>				<div><div><div>C</div></div><div>30</div></div>	
		<div><div><div>D</div></div><div>somministrazione di sciroppo di Ipecacuana</div></div>				<div><div><div>D</div></div><div>il 30% delle unità totali del lotto</div></div>	
		<div><div><div>E</div></div><div>dialisi peritoneale</div></div>				<div><div><div>E</div></div><div>10</div></div>	
			Risposta esatta D				Risposta esatta A

N°	2501	Domanda	Quale delle seguenti indicazioni riguardanti le tetracicline è errata?	N°	2503	Domanda	Quale tra le seguenti lerne è vera
		<div><div><div>A</div></div><div>alcune tetracicline subiscono disidratazione, dando anidrotetracicline, più tossiche e che presentano colorazione più marcata</div><div><div>B</div></div><div>le tetracicline possono dare chelazione con ioni metallici polivalenti</div><div><div>C</div></div><div>alcune tetracicline presentano fototossicità</div><div><div>D</div></div><div>le tetracicline esplicano attività antibatterica e batteriostatica</div><div><div>E</div></div><div>la minociclina è una tetraciclina naturale prodotta per fermentazione dallo <i>Streptomyces aureofaciens</i></div></div>					<div><div><div>A</div></div><div>norfloxacina – antibatterico – tetraciclina</div><div><div>B</div></div><div>levofloxacina – antibatterico – penicillina</div><div><div>C</div></div><div>moxifloxacina – antifungino – triazolo</div><div><div>D</div></div><div>enoxacina – antibatterico – chinolone</div><div><div>E</div></div><div>lomefloxacina – antitumorale – antrachinone</div></div>
			Risposta esatta E				Risposta esatta D


N°	2502	Domanda	Quale dei seguenti antibiotici è un macrolide?	N°	2504	Domanda	Lo stiboglucuronato sale di sodio è un farmaco che contiene
		<div><div><div>A</div></div><div>lincomicina</div><div><div>B</div></div><div>claritromicina</div><div><div>C</div></div><div>mezlocillina</div><div><div>D</div></div><div>colistimetato di sodio</div><div><div>E</div></div><div>kanamicina</div></div>					<div><div><div>A</div></div><div>mercurio</div><div><div>B</div></div><div>arsenico</div><div><div>C</div></div><div>argento</div><div><div>D</div></div><div>rame</div><div><div>E</div></div><div>antimonio</div></div>
			Risposta esatta B				Risposta esatta E



N°	2505	Domanda	Gli effetti collaterali più severi della bupivacaina sono di tipo
			
			<div><div>A</div>antimuscarinico</div> <div><div>B</div>mielotossico</div> <div><div>C</div>cardiotossico</div> <div><div>D</div>analgesico</div> <div><div>E</div>extrapiramidale</div>
		Risposta esatta	C
N°	2506	Domanda	Quale è l'attività farmacologica più rilevante della carbanazepina, avente la struttura indicata
			
			<div><div>A</div>antidepressiva</div> <div><div>B</div>neuroletica</div> <div><div>C</div>anticonvulsivante</div> <div><div>D</div>anestetica locale</div> <div><div>E</div>antimuscarinica</div>
		Risposta esatta	C
N°	2507	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni relative al principio attivo zibrasone è corretta?
			<div><div>A</div>e' un antipsicotico atipico</div> <div><div>B</div>è approvato sia per il trattamento della schizofrenia che per forme maniacali e disordine bipolare</div> <div><div>C</div>può essere somministrato sia per via orale che iniettiva</div> <div><div>D</div>ha alta affinità per recettori dopaminergici, serotoninergici ed alfa-adrenergici</div> <div><div>E</div>tutte le affermazioni sono corrette</div>
		Risposta esatta	E
N°	2508	Domanda	Il glicerolo d'amido è
			<div><div>A</div>un idrogel</div> <div><div>B</div>un unguento</div> <div><div>C</div>una pasta</div> <div><div>D</div>una crema</div> <div><div>E</div>un lipogel</div>
		Risposta esatta	A

N°	2509	Domanda	Quale delle seguenti NON è una caratteristica dell'imipenem?	<input type="radio"/> A e' resistente alle beta-lattamasi <input type="radio"/> B possiede ampia attività antibatterica <input type="radio"/> C viene inattivato dalle deidropeptidasi renali <input type="radio"/> D e' associato al sulbactam <input type="radio"/> E viene eliminato per via renale	Risposta esatta	D
N°	2510	Domanda	Quale dei seguenti effetti farmacologici è proprio dell'iperico (<i>Hypericum perforatum</i> L.)?	<input type="radio"/> A blocco selettivo della ricaptazione neuronale della serotonina <input type="radio"/> B blocco selettivo della ricaptazione neuronale della dopamina <input type="radio"/> C blocco della ricaptazione neuronale di serotonina e dopamina <input type="radio"/> D blocco della ricaptazione neuronale di noradrenalina, serotonina, dopamina e GABA <input type="radio"/> E blocco della ricaptazione neuronale dell'acetilcolina	Risposta esatta	D
N°	2511	Domanda	Un medicinale, oltre alle sostanze comunemente utilizzate per la terapia dell'acidità gastrica, contiene anche diclofenam. Questo composto, avente la struttura chimica indicata, svolge azione adiuvante di natura	 <input type="radio"/> A nessuna di quelle indicate <input type="radio"/> B parasimpaticomimetica <input type="radio"/> C analgesica <input type="radio"/> D simpaticomimetica <input type="radio"/> E simpaticollica	Risposta esatta	A
N°	2512	Domanda	Qual è la validità temporale di una ricetta magistrale non ripetibile?	<input type="radio"/> A 30 giorni <input type="radio"/> B sei mesi <input type="radio"/> C tre mesi <input type="radio"/> D 10 giorni escluso quello di emissione <input type="radio"/> E un anno	Risposta esatta	A

N°	2513	Domanda La Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali prevede un diritto addizionale quando nella preparazione magistrale allestita in farmacia è presente	<div><div><div>A</div><div>eosina</div></div><div><div>B</div><div>mercurio dicloruro</div></div><div><div>C</div><div>argento nitrato</div></div><div><div>D</div><div>in nessuno dei casi indicati</div></div><div><div>E</div><div>in più di uno dei casi indicati</div></div></div>	Risposta esatta E	
N°	2515	Domanda Quale delle caratteristiche strutturali sotto riportate è essenziale per l'attività degli antibiotici che bloccano la D-alanina transpeptidasi:	<div><div><div>A</div><div>una struttura tetradica</div></div><div><div>B</div><div>una funzione carbossilica</div></div><div><div>C</div><div>un raggruppamento acilammidico</div></div><div><div>D</div><div>un ciclo beta-lattamico</div></div><div><div>E</div><div>una struttura biciclica</div></div></div>	Risposta esatta D	
N°	2516	Domanda Un preparato magistrale è:	<div><div><div>A</div><div>un medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica destinato ad un determinato paziente</div></div><div><div>B</div><div>un medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una Farmacopea</div></div><div><div>C</div><div>un medicinale ottenuto secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla Farmacopea Europea</div></div><div><div>D</div><div>più di una delle indicazioni è corretta</div></div><div><div>E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div>	Risposta esatta A	



N°	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
2517	A quale dei valori di pH riportati un farmaco basico si può considerare maggiormente protonato	2519	I curari sono		
	<div><div>A</div>9</div>		<div><div>A</div>antagonisti muscarinici M3</div>		
	<div><div>B</div>7</div>		<div><div>B</div>antagonisti del recettore nicotinico di tipo muscolare</div>		
	<div><div>C</div>5</div>		<div><div>C</div>antagonisti dopaminergici D2</div>		
	<div><div>D</div>8</div>		<div><div>D</div>antagonisti istaminergici H1</div>		
	<div><div>E</div>10</div>		<div><div>E</div>agonisti nicotinici N2</div>		

N°	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
2518	Per quante volte un farmacista può cedere le proprie quote di una società in accomandita semplice per la gestione di una farmacia privata?	2520	Negli integratori alimentari è ammesso l'impiego come ingrediente:		
	<div><div>A</div>una sola volta</div>		<div><div>A</div>di qualsiasi pianta purché ne sia dimostrata la sicurezza d'uso</div>		
	<div><div>B</div>tre volte al massimo se aveva una quota minoritaria e una sola volta se aveva una quota maggioritaria</div>		<div><div>B</div>solo delle piante inserite in un apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute</div>		
	<div><div>C</div>senza limitazioni</div>		<div><div>C</div>solo delle piante inserite in un elenco pubblicato dalla Commissione europea</div>		
	<div><div>D</div>senza limitazioni se aveva una quota minoritaria e non più di tre volte se aveva una quota maggioritaria</div>		<div><div>D</div>di qualsiasi pianta inserita in farmacopea</div>		
	<div><div>E</div>senza limitazioni se era socio accomandante e non più di tre volte se era socio accomandatario</div>		<div><div>E</div>di piante considerate come novel food</div>		




N°	2521	Domanda	Sull'etichetta degli integratori alimentari:		N°	2523	Domanda	Nel trattamento delle infezioni da <i>Treponema pallidum</i> il farmaco d'elezione è	
			<input type="checkbox"/> A deve essere riportata l'avvertenza di non superare le quantità di assunzione consigliate					<input type="checkbox"/> A la ciprofloxacina	
			<input type="checkbox"/> B non bisogna riportare alcuna avvertenza					<input type="checkbox"/> B una eritromicina	
			<input type="checkbox"/> C va indicato che per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico					<input type="checkbox"/> C il cloramfenicolo	
			<input type="checkbox"/> D deve essere riportata l'etichettatura nutrizionale					<input type="checkbox"/> D la penicillina G	
			<input type="checkbox"/> E occorre indicare che il prodotto va usato su prescrizione del medico					<input type="checkbox"/> E la rifampicina	
				Risposta esatta A				Risposta esatta D	

N°	2522	Domanda	L'alcalinizzazione delle urine diminuisce l'eliminazione dei farmaci basici		N°	2524	Domanda	Dalla data di prescrizione, quali è il numero massimo di giorni utili entro i quali la ricetta del SSN può essere spedita da una farmacia (D.P.R. 8.7.1998 n. 371)?	
			<input type="checkbox"/> A inibendone la secrezione tubulare attiva					<input type="checkbox"/> A 60	
			<input type="checkbox"/> B aumentandone il riassorbimento tubulare attivo					<input type="checkbox"/> B 10	
			<input type="checkbox"/> C diminuendone la ionizzazione					<input type="checkbox"/> C 7	
			<input type="checkbox"/> D favorendone la ionizzazione					<input type="checkbox"/> D 15	
			<input type="checkbox"/> E diminuendone il flusso urinario					<input type="checkbox"/> E 30	
				Risposta esatta C				Risposta esatta E	




N°	2525	Domanda	La somministrazione prolungata di benzodiazepine può indurre		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>convulsioni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ipertensione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>disturbi motori</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tolleranza e dipendenza</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>solo tolleranza</div></div>		Risposta esatta D
N°	2527	Domanda	La vaccinazione antinfluenzale è indicata in soggetti di età superiore a 6 mesi con:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>malattie respiratorie croniche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>malattie cardiache croniche e/o epatopatie croniche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>insufficienza renale cronica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>immunodepressione, diabete mellito, infezione da HIV</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>		Risposta esatta E


N°	2526	Domanda	La decozione si esegue mettendo a contatto la droga contusa con acqua		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>fredda per un'ora</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>fredda per sei ore</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>a 70 °C per mezz'ora</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>bollente per 5 minuti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>fredda e facendo bollire per 15-30 minuti</div></div>		Risposta esatta E
N°	2528	Domanda	La F.U. prevede il saggio dei metalli pesanti in alcune monografie. Tra i metalli sotto elencati quale NON viene determinato con tale saggio:		
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Piombo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Rame</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Argento</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Mercurio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Zinco</div></div>		Risposta esatta E



N°	2533	Domanda	Il fluocortolone è	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>un principio attivo antilucera</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>uno sterode ad attività antinfiammatoria</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>un principio attivo usato per uso topico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>un eccipiente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2535	Domanda	Quale vitamina, aumentando la distribuzione periferica della L-DOPA, ne riduce l'efficacia?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>vitamina A</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>vitamina B₆</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>vitamina C</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>vitamina D</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>vitamina E</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2536	Domanda	In quale forma fisica una sostanza è più rapidamente assorbibile a livello polmonare?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>gas</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>liquida</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>solida</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	A

N°	2534	Domanda	<div></div> <div>Il meccanismo di azione delle 8-amminoquinoline ad attività antiprotozoaria, come la primaquina indicata nella struttura seguente,</div>	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è identico a quello della 4-amminoquinolina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si basa sulla inibizione dell'enzima tetraidrofolato reduttasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si fonda sulla inibizione della pterato sintetasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>consiste in una amplificazione dello stress ossidativo mitocondriale plasmoidale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>dipende dalla inibizione selettiva di enzimi localizzati nei lisosomi del plasmodio</div></div>	Risposta esatta	D
----	------	---------	--	--	-----------------	---

N°	2537	Domanda	Quale delle affermazioni sotto riportate e riguardanti la forza del legame idrogeno NON corrisponde alla realtà?	N°	2539	Domanda	Il margine percentuale può essere definito come:	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>aumenta con la temperatura</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>dipende dal mezzo in cui si trova la molecola</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>dipende dalla elettronegatività degli atomi coinvolti nel legame</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dipende dalla distanza degli atomi coinvolti nel legame</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>dipende fortemente dalla direzione di legame</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il rapporto tra il margine netto unitario e il prezzo di vendita al pubblico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>il rapporto tra interessi attivi e passivi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>il rapporto tra costi del personale e ricavi aziendali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>il rapporto tra tasse e imposte pagate e l'utile aziendale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2538	Domanda	Dei farmaci sottoelencati, per quale NON sono documentate interazioni farmacologiche con la cimetidina?	N°	2540	Domanda	A quale classe farmacologica appartiene la terazosina?	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>teofilina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>benzodiazepine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>chimidina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sali di litio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>lidocaina</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antipertensivi alfa1 bloccanti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ipocolesterolemizzanti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>inibitori della pompa protonica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antiaritmici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>coronarodilatatori</div></div>	Risposta esatta	A




N°	2541	Domanda	NON volendo modificare il contenuto qualitativo dei cationi presenti in un preparato anticidico, con quale dei prodotti sotto indicati si potrebbe sostituire il magnainato?	<div><div><div>A</div><div>Al₂O₃</div></div><div><div>B</div><div>Sucralfato</div></div><div><div>C</div><div>Glucaltriato</div></div><div><div>D</div><div>Mg(OH)₂</div></div><div><div>E</div><div>nessuno dei composti indicati</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>
N°	2543	Domanda	Su quale dei punti elencati agisce il ceftriaxone, avente la struttura indicata?	<div><div><div>A</div><div>acidi nucleici della cellula batterica</div></div><div><div>B</div><div>parete cellulare batterica</div></div><div><div>C</div><div>metabolismo energetico della cellula batterica</div></div><div><div>D</div><div>sintesi proteica ribosomiale</div></div><div><div>E</div><div>membrana citoplasmatica</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>
N°	2544	Domanda	I messaggeri chimici si formano da sostanze che vengono immesse nell'organismo con la dieta. Quale neurotrasmettore si forma dal triptofano avente la struttura indicata?	<div><div><div>A</div><div>acetilcolina</div></div><div><div>B</div><div>serotonina</div></div><div><div>C</div><div>dopamina</div></div><div><div>D</div><div>GABA</div></div><div><div>E</div><div>istamina</div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>

N°	2545	Domanda	Un paziente trattato con anticoagulanti orali può andare incontro al rischio di:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>ipertensione</div></div><div><div>emorragie</div></div><div><div>pneumotorace</div></div><div><div>ipodensione</div></div><div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2547	Domanda	I glicosidi digitali inducono:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>diminuzione della concentrazione di Mg2+</div></div><div><div>aumentata estrusione di Ca2+ attraverso lo scambiatore Na+, Ca2+</div></div><div><div>stimolazione della Na+, K+-ATPasi di membrana</div></div><div><div>inibizione della Na+, K+-ATPasi di membrana</div></div><div><div>apertura dei canali del K+</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2546	Domanda	I polimeri acrilici aventi gruppi carbossilici impiegati nelle formulazioni di forme per il rilascio controllato del farmaco, in generale, sono solubili in mezzi acquosi a:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>pH acido</div></div><div><div>pH basico</div></div><div><div>pH neutro</div></div><div><div>a qualsiasi pH</div></div><div><div>più di una indicazione è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2548	Domanda	Quale delle affermazioni sotto riportate e riguardanti gli agenti emulsionanti è corretta?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div><div>il valore di HLB non rappresenta un indice della polarità del tensioattivo</div></div><div><div>i composti aventi HLB nel range 3-6 si utilizzano per le emulsioni olio in acqua</div></div><div><div>i composti aventi HLB nel range 8-18 si utilizzano per le emulsioni acqua in olio</div></div><div><div>gli emulsionanti sono molecole che posseggono una porzione idrofila ed una lipofila</div></div><div><div>più di una delle affermazioni riportate è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	D

N°	2549	Domanda	La F.U. definisce un contenitore sigillato quando:		N°	2551	Domanda	I criteri di accettazione per la qualità microbiologica di una preparazione non obbligatoriamente sterile sono stabiliti dalla F.U. in base:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è chiuso per fusione del materiale che lo costituisce</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è chiuso con un dispositivo che rivela in modo irreversibile se il recipiente è stato aperto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è impermeabile a solidi, liquidi e gas in condizioni normali di manipolazione, conservazione e trasporto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>contiene una quantità di preparazione destinata ad essere usata tutta in una sola volta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>all'impiego e alla via di somministrazione del prodotto (applicazione cutanea, via orale, via rettale, alte vie respiratorie, ecc.)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>alla categoria di pazienti a cui è destinata (età neonatale, pediatrica, adulta, geriatrica, ecc.)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alla provenienza delle materie prime impiegate (di origine naturale, di sintesi, ecc.)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>alla presenza di patologie, sanguinamento, danno d'organo e/o trattamenti concomitanti con immunosoppressori</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	
				Risposta esatta A					Risposta esatta E

N°	2550	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "cana" nella Denominazione Comune?		N°	2552	Domanda	Prendono il nome di sostanze "diluenti" quelle che	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>carbammati usati come sedativi e miorelassanti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>anestetici locali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>antistaminici H2</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>solfonammidi ipoglicemizzanti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>inibitori delle beta-lattamasi</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>mantengono unita la polvere delle compresse durante la granulazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>mantengono unita la polvere delle compresse durante la compattazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>evitano alla polvere di aderire ai punzoni e alle matrici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si mescolano con le polveri per far raggiungere alle compresse peso e volumi opportuni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>permettono alle compresse di disgregarsi in ambiente acquoso</div></div>	
				Risposta esatta B					Risposta esatta D




N°	Domanda	2553	Domanda	2555	N°	Domanda	2555	Risposta esatta
		<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Quale, tra le seguenti classi di farmaci antimicrobici, agisce sulla parete cellulare batterica?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>				
		<div>una suddivisione in categorie omogenee dei dispositivi medici</div> <div>il codice attribuito al dispositivo medico dal fabbricante</div> <div>il codice attribuito al dispositivo medico dal mandatario</div> <div>il codice attribuito al dispositivo medico dalla struttura sanitaria acquirente</div> <div>il codice attribuito in base al nomenclatore GMDN (Global Medical Device Nomenclature)</div>		<div>chinoloni</div> <div>tetraciline</div> <div>monobattami</div> <div>sulfonamidi</div> <div>rifampicine</div>				

N°	Domanda	2554	Domanda	2556	Domanda	Risposta esatta
N°	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "idina" nella Denominazione Comune?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	La combinazione delle due molecole aventi la struttura sotto indicata prende il nome di benzatina-benzilpenicillina. Essa costituisce una penicillina	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	B	
		<div>alchilanti antitumorali</div> <div>derivati del 5-nitrofurano</div> <div>solfonamidi antibatteriche</div> <div>antistaminici H1</div> <div>antistaminici H2</div>	<div><chem>CC1(C)SC(=O)N(C1Cc2ccccc2)C(=O)O</chem> <chem>CC1(C)SC(=O)N(C1Cc2ccccc2)C(=O)O</chem></div>	<div>utilizzabile come profarmaco</div> <div>che produce tassi ematici utili per tempi più lunghi rispetto alla benzilpenicillina potassica</div> <div>che produce tassi ematici utili per tempi maggiori di dieci giorni</div> <div>acido-resistente</div> <div>assumibile per via orale</div>		



N°	2557	Domanda	Il passaggio dei farmaci attraverso le membrane cellulari è influenzato da tutti i seguenti fattori tranne:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il meccanismo di azione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la lipofilia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>il legame alle proteine plasmatiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>il peso molecolare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>la concentrazione</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2559	Domanda	Chi deve vidimare il registro dei galenici iniettabili?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il Sindaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la A.S.L.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>l'Ordine professionale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>l'AIFA</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>non è previsto registro dei galenici iniettabili</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2560	Domanda	La clorpromazina, di cui si riporta la struttura, è un	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antidepressivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antipsicotico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>anticonvulsivante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antistaminico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>antivirale</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2558	Domanda	La cloxacillina appartiene al gruppo delle penicilline	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ritardo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>acido resistenti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>attive per os</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>più di una delle indicazioni fornite è corretta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>resistenti alla penicillinasi</div></div>	Risposta esatta	D


N°	2561	Domanda Quale delle affermazioni riportate è maggiormente corrispondente alla realtà: un farmaco "me too" è un farmaco che, confrontato con un altro farmaco in commercio, presenta	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>azione farmacologica diversa</div> <div>la stessa azione farmacologica ed un meccanismo di azione diverso</div> <div>la stessa azione farmacologica e struttura chimica analoga</div> <div>una diversa azione farmacologica ed una struttura chimica diversa</div> <div>una stessa azione farmacologica ed una struttura chimica diversa</div>
----	------	--	--




N°	2569	Domanda	Tra i farmaci antipertensivi indicati, quale presenta come effetto collaterale l'ipertrofia	<div><div><input type="checkbox"/> A</div> più di uno tra quelli riportati</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> metoprololo</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> nifedipina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> doxazosina</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> minoxidil</div>
----	------	---------	---	--

Risposta esatta

E





N°	2573	Domanda	I beta-lattamici agiscono da:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>inibitori allostERICI</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>parziali agonisti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>substrati suicidi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>antagonisti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>agonisti</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2575	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni relative al principio attivo ziprasidone NON è CORRETTA?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si tratta di un antipsicotico tipico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è indicato nel trattamento di pazienti anziani psicotici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è un antidepressivo ad attività timolettica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>inibisce la ricaptazione della acetilcolina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le affermazioni non sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2574	Domanda	È obbligatorio, per la Farmacia, avere in dotazione almeno un'incapsulatrice?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>solo cinque anni dopo l'apertura della farmacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sì</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>qualora si allestiscano capsule</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>no</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>solo nella Regioni a statuto speciale</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2576	Domanda	I medicinali in crema a base di ketoconazolo sono usati per trattare	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>infezioni cutanee da Candida</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>micosi sistemiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>coccidiomicosi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>infezioni delle mucose</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Tinea cruris</div></div>	Risposta esatta	A




N°	2577	Domanda In caso di una sospetta congiuntivite batterica le preparazioni in gocce o pomate oculari possono contenere:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>Cloramfenicolo</div><div>Neomicina</div><div>Gentamicina</div><div>Acido fusidico</div><div>Tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2579	Domanda Un medicinale contiene "destrano 40" in soluzione acquosa. L'indicazione numerica data definisce le caratteristiche della macromolecola di destrano utilizzata nel medicinale. Il suo significato è che il destrano presente	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>è costituito da 40 molecole di glucosio</div><div>è costituito da 40.000 molecole di glucosio</div><div>ha un peso molecolare pari a 40</div><div>ha un peso molecolare pari a 4.000</div><div>ha un peso molecolare pari a 40.000</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2580	Domanda Trastuzumab è un anticorpo monoclonale di tipo:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>chimerico</div><div>umanizzato</div><div>murino</div><div>nessuna indicazione è corretta</div><div>umano ottenuto con topi trasgenici</div></div>	Risposta esatta	B

2581	N°	Domanda	L'ormone della crescita è	<div><div>A</div>uno steroide</div> <div><div>B</div>un polipeptide</div> <div><div>C</div>costituito da un unico amminoacido</div> <div><div>D</div>una glicoproteina</div> <div><div>E</div>una lipoproteina</div>	Risposta esatta	B
2583	N°	Domanda	Gli atomi che possono essere indicati come isotopi classici hanno	<div><div>A</div>la stessa valenza</div> <div><div>B</div>lo stesso numero di elettroni nel guscio periferico</div> <div><div>C</div>le stesse proprietà magnetiche</div> <div><div>D</div>lo stesso potenziale di ionizzazione</div> <div><div>E</div>la stessa polarizzabilità</div>	Risposta esatta	B

2582	N°	Domanda	I glucosidi cardiotattivi determinano nel cuore in scompenso	<div><div><div>A</div><div>aumento della frequenza sinusale</div></div><div><div>B</div><div>aumento della velocità di conduzione atrioventricolare</div></div><div><div>C</div><div>aumento del vol/min</div></div><div><div>D</div><div>diminuzione del periodo refrattario del nodo del seno</div></div><div><div>E</div><div>diminuzione dell'indice cardiaco</div></div></div>	Risposta esatta	C
2584	N°	Domanda	La barriera ematoencefalica è costituita prevalentemente da:	<div><div><div>A</div><div>cellule gliali</div></div><div><div>B</div><div>membrana basale dei capillari</div></div><div><div>C</div><div>plexi corioidei</div></div><div><div>D</div><div>cellule endoteliali</div></div><div><div>E</div><div>cellule neuronali</div></div></div>	Risposta esatta	D


N°	2585	Domanda	Un medicinale contiene il principio attivo simvastatina, avente la struttura indicata. Quale delle affermazioni riportate è corretta?
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>agisce come inibitore dei sistemi enzimatici che presiedono alla sintesi del colesterolo</div><div>forma direttamente legami con il carbossile degli acidi biliari</div><div>forma direttamente legami con l'ossidrilie in posizione 3 del colesterolo</div><div>forma direttamente legami con l'ossidrilie libero dei digliceridi</div><div>agisce come inibitore dei sistemi enzimatici che presiedono alla sintesi dei trigliceridi</div></div>
			Risposta esatta A
N°	2587	Domanda	La piridostigmina, avente la struttura indicata, è impiegata nella miastenia gravis. Quale, tra quelli elencati, rappresenta un possibile effetto collaterale?
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>diminuzione della frequenza cardiaca</div><div>diarrea</div><div>stimolo alla minzione</div><div>scioglieria</div><div>tutti</div></div>
			Risposta esatta E
N°	2586	Domanda	L'efficacia di un conservante antimicrobico utilizzato in una preparazione galenica magistrale può essere influenzato:
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>dal principio attivo</div><div>dagli eccipienti adottati</div><div>dal contenitore</div><div>dalla chiusura del contenitore</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta E
N°	2588	Domanda	Qual'è l'importo del diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali per la preparazione che contenga sia veleno che stupefacente?
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>euro 2,58</div><div>euro 1,55</div><div>euro 2,58 per le farmacie rurali e euro 1,55 per le farmacie urbane</div><div>lo fissa il farmacista</div><div>euro 3,10</div></div>	Risposta esatta B

N°	2589	Domanda	I polimeri acrilici aventi gruppi acidi forti o basici forti impiegati nelle formulazioni di forme per il rilascio controllato del farmaco, in generale, sono:		N°	2591	Domanda	La LOEL (Lowest Observed Effect Level) rappresenta:	
			<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div>	<div><div>solubili a tutti i valori di pH</div><div>solo a pH acidi</div><div>solo a pH basici</div><div>solo a pH 7</div><div>insolubili a qualsiasi pH</div></div>				<div><div>A</div></div> <div><div>B</div></div> <div><div>C</div></div> <div><div>D</div></div> <div><div>E</div></div>	<div><div>il più basso livello di dose al quale è stato possibile evidenziare un effetto</div><div>il più alto livello di dose al quale è stato possibile evidenziare un effetto</div><div>il fattore arbitrario nell'estrapolazione del NOEL (No Observed Effect Level)</div><div>il più basso livello di dose al quale non si manifesta alcun effetto</div><div>il più alto livello di dose al quale non si manifesta alcun effetto</div></div>
				Risposta esatta A					Risposta esatta A
N°	2590	Domanda	La terapia con T4 si inizia con bassi dosaggi per evitare:		N°	2592	Domanda	I diuretici inibitori dell'anidrasi carbonica determinano	
			<div><div>A</div></div> <div><div>B</div></div> <div><div>C</div></div> <div><div>D</div></div> <div><div>E</div></div>	<div><div>l'insufficienza renale acuta</div><div>l'emolisi</div><div>l'eccessiva stimolazione cardiaca</div><div>l'eccessiva riduzione del peso corporeo</div><div>l'eccessiva bradicardia</div></div>				<div><div>A</div></div> <div><div>B</div></div> <div><div>C</div></div> <div><div>D</div></div> <div><div>E</div></div>	<div><div>alcalosi sistemica</div><div>aumento del riassorbimento tubulare di HCO_3^-</div><div>kaliuresi</div><div>aumento dell'eliminazione di cloruri</div><div>iperkaliemia</div></div>
				Risposta esatta C					Risposta esatta C




N°	2593	Domanda	Per quali dei seguenti farmaci non sono note interazioni farmacodinamiche con l'iperico (<i>Hypericum perforatum</i> L)?
		<input type="radio"/> A Tacrolimus <input type="radio"/> B Ampicillina <input type="radio"/> C Warfarin <input type="radio"/> D Contraccettivi orali <input type="radio"/> E Ciclospolina	Risposta esatta B
<hr/>			
N°	2594	Domanda	Quale dei seguenti è definito "acido grasso essenziale".
		<input type="radio"/> A acido palmitico <input type="radio"/> B acido linoleico <input type="radio"/> C acido alfa-linolenico <input type="radio"/> D tutti quelli elencati <input type="radio"/> E tutti quelli elencati tranne uno	Risposta esatta E
N°	2595	Domanda	Quale delle azioni elencate è propria del diazepam?
		<div style="text-align: center;"> <p>X = Alogeno</p> </div> <input type="radio"/> A antiemetica <input type="radio"/> B rilasciante la muscolatura liscia <input type="radio"/> C stimolante i centri vasomotori <input type="radio"/> D analgesica <input type="radio"/> E rilasciante la muscolatura scheletrica con meccanismo centrale	Risposta esatta E
N°	2596	Domanda	La paradorofenilalanina:
		<input type="radio"/> A inibisce la sintesi di serotonina <input type="radio"/> B è un epatoprotettore <input type="radio"/> C e' un antipertensivo biodisponibile per via orale <input type="radio"/> D aumenta l'escrezione urinaria di fenilalanina <input type="radio"/> E è un antidepressivo	Risposta esatta A

N°	2597	Domanda	Nel caso di movimento in entrata, devono essere indicati nel registro entrata e uscita stupefacenti gli estremi del buono acquisto emesso dal farmacista?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no, è sufficiente indicare gli estremi della fattura</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si, ma solo quando vengano acquistate sostanze e non preparazioni</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, ma solo quando vengano acquistate preparazioni e non sostanze</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, sempre</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si, ma solo per gli stupefacenti della Tabella I</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2599	Domanda	La somministrazione per via sublinguale di tinitrogllicerina ne evita principalmente:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>l'azione irritante gastrica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la degradazione al pH gastrico</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>l'eliminazione presistemica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>lo scarso assorbimento</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>l'azione costipante</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2600	Domanda	La pentazocina induce:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>potenziamento dell'effetto della morfina</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>analgesia</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>stimolazione del centro del respiro</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>diarrea</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ipensione e bradicardia</div></div></div></div>	Risposta esatta	B




N°	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
2601	Quale dei seguenti polimeri non è ammesso dalla F.U. per la costruzione di contenitori e chiusure in plastica per uso farmaceutico?	2603	La vaselina idrofila si definisce come:	<div><div>A</div>una base idrosolubile</div> <div><div>B</div>una base lipofila</div> <div><div>C</div>una base emulsionante acqua</div> <div><div>D</div>nessuna risposta è corretta</div> <div><div>E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>	C

N°	Domanda	N°	Domanda	Risposta esatta	Risposta esatta
2602	Quali sono le forme farmaceutiche specifiche dei medicinali oncopatici ?	2604	L'effetto antiaggregante piastrinico dell'acido acetilsalilico è dovuto all'interazione con	<div><div>A</div>il DNA piastrinico</div> <div><div>B</div>l'RNA piastrinico</div> <div><div>C</div>la lipossigenasi</div> <div><div>D</div>la ciclossigenasi</div> <div><div>E</div>una chinasi</div>	D




N°	2605	Domanda	Quale dei seguenti antagonisti beta-adrenergici NON è dotato di attività anestetica locale	<div><div><div>A</div><div>proprianololo</div></div><div><div>B</div><div>acebutololo</div></div><div><div>C</div><div>pindololo</div></div><div><div>D</div><div>oxprenololo</div></div><div><div>E</div><div>sotalolo</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2607	Domanda	L'isotretinoina viene utilizzata contro l'acne. Quale delle affermazioni che la riguardano è corretta	<div><div><div>A</div><div>il principio attivo è strutturalmente correlato alla vitamina B</div></div><div><div>B</div><div>il principio attivo è strutturalmente correlato all'acido azelaico</div></div><div><div>C</div><div>la specialità medicinale viene utilizzata per uso topico</div></div><div><div>D</div><div>si può spedire con ricetta ripetibile</div></div><div><div>E</div><div>è controindicata per le donne nel periodo fertile</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2606	Domanda	Il SSN, nel rimborsare alle farmacie aperte al pubblico le notule di spesa dei farmaci spediti in regime di assistenza pubblica, defalca lo 0,9% dell'importo. Tale cifra viene versata	<div><div><div>A</div><div>all'ENPAF</div></div><div><div>B</div><div>alla FOI</div></div><div><div>C</div><div>alla SIFO</div></div><div><div>D</div><div>all'UTFAR</div></div><div><div>E</div><div>al SINAFO</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2608	Domanda	In quale caso la tariffa nazionale dei medicinali prevede onorari per la somministrazione dei medicinali da parte del farmacista?	<div><div><div>A</div><div>per tutti i medicinali</div></div><div><div>B</div><div>per i soli medicinali per uso umano</div></div><div><div>C</div><div>per i soli medicinali contenenti stupefacenti</div></div><div><div>D</div><div>per i soli medicinali contenenti veleni</div></div><div><div>E</div><div>per nessun medicinale</div></div></div>	Risposta esatta	E



N°	2609	Domanda	L'aloiperidolo è un farmaco a struttura:	<div><div><div>A</div><div>fendolazina</div></div><div><div>B</div><div>difenilbutilpiperidinica</div></div><div><div>C</div><div>butirrofenonica</div></div><div><div>D</div><div>dibenzazepinica</div></div><div><div>E</div><div>benzamidica</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2611	Domanda	Il clopogreli è un farmaco dotato di attività:	<div><div><div>A</div><div>antipertensiva</div></div><div><div>B</div><div>coronarodilatatrice e ipotensiva</div></div><div><div>C</div><div>antiaggregante piastrinica</div></div><div><div>D</div><div>anticoagulante</div></div><div><div>E</div><div>fibrinolitica</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2610	Domanda	Da chi deve essere vidimato il registro di entrata e uscita dei radiofarmaci per le farmacie?	<div><div><div>A</div><div>da nessuno, in quanto non è previsto alcun registro</div></div><div><div>B</div><div>dai Sindaci</div></div><div><div>C</div><div>dall'Azienda Sanitaria Locale</div></div><div><div>D</div><div>dai Prefetti</div></div><div><div>E</div><div>dall'Ordine dei Farmacisti</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2612	Domanda	Lo sciroppo semplice (saccarosio sciroppo) riportato in F.U. contiene il 66,5% in peso di saccarosio in acqua. Per preparare sperimentalmente tale sciroppo è conveniente operare	<div><div><div>A</div><div>in bagno a ghiaccio</div></div><div><div>B</div><div>a temperatura ambiente</div></div><div><div>C</div><div>a temperatura ambiente aggiungendo alla soluzione cinque parti di etanolo</div></div><div><div>D</div><div>a caldo</div></div><div><div>E</div><div>in autoclave</div></div></div>	Risposta esatta	D


N°	2613	Domanda	Domase alfa (rDNase) è un enzima che si utilizza per:	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>diminuire i trigliceridi</div><div>diminuire la viscosità del muco</div><div>diminuire il colesterolo</div><div>diminuire la pressione</div><div>diminuire l'uricemia</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2615	Domanda	E' necessaria l'autorizzazione per detenere in farmacia gas medicinali?	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>si, della Regione o Provincia Autonoma</div><div>no</div><div>si, del Ministero della Salute</div><div>no, purché siano detenuti in locali separati da quelli in cui avviene la vendita al pubblico</div><div>si, dal Prefetto</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2614	Domanda	Di quale dei recettori elencati è antagonista il flumazenil avente la struttura indicata? <div><chem>CN1C(=O)c2ccc(cc2N1C(=O)OCC)C3=NC(=O)N3</chem></div>	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>delle benzodiazepine</div><div>degli oppioidi</div><div>muscarinici</div><div>dell'adenosina</div><div>della Sostanza P</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2616	Domanda	La tachifilassi è	<div><div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div><div><div>sinonimo di indice terapeutico</div><div>sinonimo di idiosincrasia</div><div>sinonimo di iperreattività</div><div>la tolleranza che si sviluppa rapidamente nei confronti di un farmaco</div><div>sinonimo di tachicardia</div></div></div>	Risposta esatta	D

N°	2617	Domanda	Le Tinture madri per preparazione omeopatica sono ottenute utilizzando:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>proporzioni fisse tra materie prime e solvente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>proporzioni fisse tra materie prime e solvente, tenendo conto del tenore in acqua delle materie prime</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>proporzioni variabili tra materie prime utilizzate e Tintura Madre finale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>proporzioni fisse tra ceppo omeopatico e materie prime</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle proporzioni indicate</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2619	Domanda	Per quale delle seguenti droghe vegetali NON ha senso l'indice di gonfiamento:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>altea radice</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>aloe del capo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>malva foglie</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>psillio seme</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tiglio infiorescenza</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2620	Domanda	La formazione di un precipitato insolubile quando si uniscono un sale di calcio ed un fosfato sono esempi di incompatibilità:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>chimica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>farmacologica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>terapeutica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>fisica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	A




N°	2621	Domanda	Quale dei parametri indicati permette di valutare, dopo dose singola, la biodisponibilità relativa di un farmaco presente in una forma farmaceutica somministrata per os	N°	2623	Domanda	Una protesi d'anca è:
		<div><div><div>A</div></div><div>Imax (tempo di raggiungimento del picco di concentrazione plasmatico)</div><div><div>B</div></div><div>Cmax (picco di concentrazione plasmatica)</div><div><div>C</div></div><div>area sottesa dalla curva concentrazione - tempo</div><div><div>D</div></div><div>nessuno</div><div><div>E</div></div><div>tutti</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>un dispositivo medico impiantabile</div><div><div>B</div></div><div>un dispositivo medico in vitro</div><div><div>C</div></div><div>un dispositivo medico impiantabile attivo</div><div><div>D</div></div><div>un dispositivo per indagini cliniche</div><div><div>E</div></div><div>un dispositivo su misura</div></div>	
		Risposta esatta	E			Risposta esatta	A

N°	2622	Domanda	Il suffisso “-piri” viene usato nella denominazione comune per farmaci	N°	2624	Domanda	In quali quantitativi le farmacie sono obbligate a detenere i medicinali di cui alla tabella n.4 della Farmacopea Ufficiale
		<div><div><div>A</div></div><div>antidepressivi</div><div><div>B</div></div><div>diuretici</div><div><div>C</div></div><div>ACE-inibitori</div><div><div>D</div></div><div>inibitori della sintesi della renina</div><div><div>E</div></div><div>antiasmatici</div></div>				<div><div><div>A</div></div><div>nei quantitativi individuati dal Ministro della Salute con proprio decreto</div><div><div>B</div></div><div>nei quantitativi indicati nella stessa tabella n.4</div><div><div>C</div></div><div>nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio</div><div><div>D</div></div><div>nei quantitativi indicati nella tabella n.5</div><div><div>E</div></div><div>nella tabella n.4 non sono indicati i medicinali obbligatori</div></div>	
		Risposta esatta	C			Risposta esatta	E




N°	2625	Domanda	Gli effetti collaterali legati al blocco dei recettori dopaminergici D2 nigrostriatali sono frequenti nel corso di terapia neurolettica. Quale, tra i farmaci elencati, presenta la minima attività extrapiramidale?		
			<div><div>A</div> Sulpiride</div> <div><div>B</div> Aripiprazolo</div> <div><div>C</div> Flufenazina</div> <div><div>D</div> Risperidone</div> <div><div>E</div> Pimozide</div>		Risposta esatta D
N°	2627	Domanda	Il meccanismo d'azione che è alla base della tossicità del mercurio è dovuto alla facilità con la quale esso si lega:	<div><div>A</div> al citoscheletro</div> <div><div>B</div> al DNA</div> <div><div>C</div> ad enzimi sulfonilici</div> <div><div>D</div> ai fosfolipidi di membrana</div> <div><div>E</div> all'RNA messaggero</div>	Risposta esatta C

N°	2626	Domanda	Gli antistaminici anti-H2 agiscono:	<div><div>A</div> come antagonisti competitivi a livello recettoriale</div> <div><div>B</div> riducendo i livelli di AMPc</div> <div><div>C</div> inibendo la secrezione acida gastrica</div> <div><div>D</div> tutte le indicazioni sono corrette</div> <div><div>E</div> nessuna indicazione è corretta</div>	Risposta esatta D
N°	2628	Domanda	Che cosa indica la tabella n.5 della Farmacopea Ufficiale?	<div><div>A</div> i pesi atomici relativi</div> <div><div>B</div> le sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave</div> <div><div>C</div> gli stupefacenti</div> <div><div>D</div> gli apparecchi e gli utensili obbligatori in farmacia</div> <div><div>E</div> i medicinali da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile</div>	Risposta esatta E




N°	2629	Domanda	Alcuni farmaci agiscono come antagonisti indiretti di neurotrasmettitori in quanto inibiscono gli enzimi che, nell'organismo, intervengono nei processi di sintesi dei trasmettitori stessi. Quale, tra le coppie farmaco - enzima sotto elencate, rappresenta l'enzima ed il corrispondente inibitore?		N°	2631	Domanda	Quale farmaco, tra quelli elencati, è induttore enzimatico:	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>(p-clorofenilalanina) - (tirosina idrossilasi)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>(p-cloramfetamina) - (triptofano 5-idrossilasi)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>(selegilina) - (aldeide deidrogenasi mitocondriale)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>(acido fusarico) - (dopamina beta-idrossilasi)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>(selegilina) - (MAO-A)</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>protossido d'azoto</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>carbamazepina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>digossina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>omeprazolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>colestiramina</div></div>			
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	B

N°	2630	Domanda	Quale, tra quelli sotto indicati, è il meccanismo d'azione delle ammine simpaticomimetiche ad azione indiretta:		N°	2632	Domanda	La dopamina influenza il sistema cardiocircolatorio attraverso una serie di effetti. Quale, tra quelli sotto elencati, NON rientra in essi	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>l'inibizione delle MAO</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>l'inibizione del reuptake neuronale della noradrenalina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>il potenziamento delle COMT</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la liberazione di noradrenalina dalle vescicole sinaptiche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>la facilitazione del reuptake neuronale della noradrenalina</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>bradicardia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>aumento dell'indotropismo cardiaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>aumento della gittata cardiaca</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dilatazione dei vasi renali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>aumento della diuresi</div></div>			
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	A




N°	2633	Domanda	Nei costi del conto economico del bilancio di una farmacia sono presenti:		Domanda	L'IIVA che viene pagata al fornitore rappresenta:		N°	2635	Domanda		Risposta esatta	B
			<div><div>A</div>acquisto merci</div>			<div><div>A</div>una ulteriore spesa</div>							
			<div><div>B</div>interessi passivi</div>			<div><div>B</div>una partita di giro che viene compensata</div>							
			<div><div>C</div>costi del personale</div>			<div><div>C</div>un guadagno ulteriore per il fornitore</div>							
			<div><div>D</div>tasse e imposte</div>			<div><div>D</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>							
			<div><div>E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>			<div><div>E</div>nessuna indicazione è corretta</div>							

N°	2634	Domanda	Per quante volte nella sua vita ad un titolare di farmacia è concesso vendere la propria farmacia e acquistarne un'altra?		Domanda	L'acido 6-APA è costituito dalla fusione di due anelli, uno è tiazolidinico, l'altro è:		N°	2636	Domanda		Risposta esatta	C
			<div><div>A</div>non è concesso che, una volta venduta la propria farmacia, un titolare possa acquistarne un'altra</div>			<div><div>A</div>piridinico</div>							
			<div><div>B</div>solo per una volta</div>			<div><div>B</div>piperidinico</div>							
			<div><div>C</div>solo per due volte purché tra la vendita e l'acquisto intercorrano cinque anni</div>			<div><div>C</div>beta-lattamico</div>							
			<div><div>D</div>per tre volte</div>			<div><div>D</div>ossazolico</div>							
			<div><div>E</div>per un numero illimitato di volte purché il farmacista abbia il requisito d'idoneità</div>			<div><div>E</div>pirrolidinico</div>							




N°	2637	Domanda	L'adenilato ciclico è:		N°	2639	Domanda	Gli induttori, quali le diossine, degli enzimi metabolizzanti gli xenobiotici (tra cui farmaci)	
			<input type="checkbox"/> A l'enzima che idrolizza il cAMP a 5'-AMP					<input type="checkbox"/> A possono aumentare la tossicità di altri xenobiotici	
			<input type="checkbox"/> B un enzima ubiquitario che converte l'ATP in cAMP					<input type="checkbox"/> B tendono a diminuire l'efficacia dei farmaci metabolizzati dagli enzimi indotti	
			<input type="checkbox"/> C un secondo messaggero utilizzato da molti recettori					<input type="checkbox"/> C hanno in genere un effetto che persiste a lungo	
			<input type="checkbox"/> D l'enzima che idrolizza il fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato (PIP2)					<input type="checkbox"/> D inducono in genere più enzimi	
			<input type="checkbox"/> E un particolare tipo di fosfodiesterasi					<input type="checkbox"/> E tutte le indicazioni sono corrette	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	E

N°	2638	Domanda	I diuretici furosemide e piritanide contengono un gruppo solfonammidico; l'acido etacrinico è un derivato dell'acido ferrossiacetico; la torasemide è una sulfonilurea. Essi agiscono in quanto sono		N°	2640	Domanda	L'esposizione ripetuta ad uno xenobiotico può provocare:	
			<input type="checkbox"/> A inibitori dell'anidrasi carbonica nel tubulo contorto prossimale					<input type="checkbox"/> A tolleranza farmacocinetica	
			<input type="checkbox"/> B inibitori del simporto Na ⁺ , K ⁺ , 2Cl ⁻ nel tratto ascendente dell'ansa di Henle					<input type="checkbox"/> B tolleranza farmacodinamica	
			<input type="checkbox"/> C inibitori del simporto Na ⁺ , Cl ⁻ nel tubulo contorto distale					<input type="checkbox"/> C tachifilassi	
			<input type="checkbox"/> D bloccanti dei canali del Na ⁺ dell'epitelio renale					<input type="checkbox"/> D due delle indicazioni sono corrette	
			<input type="checkbox"/> E antagonisti dell'aldosterone					<input type="checkbox"/> E tutte le indicazioni sono corrette	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	E




N°	2641	Domanda	Quale dei seguenti farmaci è una mostarda azotata?	<div><div><div>A</div></div><div>cisplatino</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>fluorouracile</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>melfalan</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>mercaptopurina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>metotrexato</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2642	Domanda	Quale delle indicazioni terapeutiche sotto riportate riguardanti i medicinali contenenti Gentamicina solfato sono corrette?	<div><div><div>A</div></div><div>infezioni delle vie urinarie</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>tachicardia giunzionale</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>infezioni da germi Gram negativi e Gram positivi</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>infezioni batteriche oculari</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>più di una</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2643	Domanda	Quale tra i seguenti farmaci si impiega nella tripanosomiasi:	<div><div><div>A</div></div><div>Pentamidina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>Cloroquina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>Emetina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>Paromomicina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>Nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2644	Domanda	Quale dei seguenti rappresenta un possibile meccanismo d'azione dello Ione Li+?	<div><div><div>A</div></div><div>inibizione delle ciclossigenasi</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>attivazione dei recettori per le integrine</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>induzione del citocromo P-450</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>inibizione dell'enzima L-amminoacido aromatico decarbossilasi</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>inibizione dell'enzima inositolo monofosfatasi</div></div>	Risposta esatta	E



N°	2645	Domanda	In una elencazione di farmaci antidepressivi, quale delle seguenti classi di farmaci risulterebbe ANOMALA?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>anti-MAO</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>inibitori dell'anidrasi carbonica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sali di litio associati ad un antidepressivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>bloccanti del reuptake della serotonina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>analoghi dell'amitriptilina</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2646	Domanda	Relativamente al problema principale dei vaccini attenuati quale delle indicazioni riportate NON è corretta?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>riattivazione della forma virulenta del germe</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>marcata inattivazione completa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>minore risposta anticorpale rispetto ai vaccini inattivati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>due indicazioni NON sono corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2647	Domanda	Con il termine saturnismo si intende:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>intossicazione da piombo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>intossicazione da mercurio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>intossicazione da arsenico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>intossicazione da benzene</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>intossicazione da alcool</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2648	Domanda	Su quale dei bersagli elencati agisce la norfloxacina, avente la struttura indicata?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>inibizione della DNA girasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>membrana citoplasmatica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>metabolismo energetico della cellula batterica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>più di uno</div></div>	Risposta esatta	A


N°	2649	Domanda	I liposomi sono comunemente definiti come	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>organelli cellulari</div><div>sistemi vescicolari chiusi costituiti da fosfolipidi disposti in doppi strati</div><div>farmaci ottenibili con tecniche di bioingegneria</div><div>cellulose modificate industrialmente</div><div>copolimeri ottenuti da vinilacetato e etilene</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2651	Domanda	L'assunzione dei medicinali oncopatici deve avvenire:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>lontano dai pasti</div><div>dopo i pasti</div><div>durante i pasti</div><div>preferibilmente al risveglio</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2650	Domanda	Dovendo valutare le indagini diagnostiche TAC e RMN dal punto di vista dell'eventuale danno che possono provocare all'organismo, si può affermare che	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>la prima tecnica comporta più rischi della seconda</div><div>la prima tecnica comporta meno rischi della seconda</div><div>le due tecniche presentano all'incirca il medesimo grado di pericolosità</div><div>le due tecniche non presentano alcuna pericolosità</div><div>le due tecniche presentano analogo grado di elevata pericolosità</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2652	Domanda	L'amfetamina agisce come	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>ammina simpaticomimetica diretta</div><div>ammina simpaticomimetica indiretta</div><div>antagonista competitivo dei recettori a adrenergici</div><div>inibitore delle MAO-B</div><div>bloccante del reuptake delle monoamine</div></div>	Risposta esatta	B



N°	2653	Domanda	L'iperico (<i>Hypericum perforatum</i> L.) può dare interazioni farmacologiche mediante:		N°	2655	Domanda	Secondo la Farmacopea Ufficiale le "piante per tisane" sono costituite da:	
			<div><div>A</div>inibizione della nitrossido sintetasi</div>					<div><div>A</div>una o più droghe vegetali destinate a preparazioni acquose orali ottenute per decozione, infusione o macerazione</div>	
			<div><div>B</div>inibizione delle catecol-o-metil transferasi (COMT)</div>					<div><div>B</div>una o più droghe vegetali destinate a preparazioni acquose orali ottenute esclusivamente per infusione</div>	
			<div><div>C</div>induzione delle monoaminoossidasi (MAO)</div>					<div><div>C</div>una miscela di piante appartenenti alla stessa famiglia destinate a preparazioni acquose orali.</div>	
			<div><div>D</div>induzione degli enzimi microsomiali epatici (CYP)</div>					<div><div>D</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>	
			<div><div>E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>					<div><div>E</div>una miscela di almeno due droghe vegetali destinate a preparazioni orali ottenute esclusivamente per infusione o macerazione.</div>	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	A

N°	2654	Domanda	Un farmaco presenta maggiore tossicità quando si lega al suo recettore con legame covalente		N°	2656	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi non è classificabile tra i FANS antilinfocitici o antipruritici	
			<div><div>A</div>P-O</div>					<div><div>A</div>ibuprofen</div>	
			<div><div>B</div>N-C</div>					<div><div>B</div>nimesulide</div>	
			<div><div>C</div>O-C</div>					<div><div>C</div>flurbiprofen</div>	
			<div><div>D</div>S-S</div>					<div><div>D</div>ketoprofen</div>	
			<div><div>E</div>C-C</div>					<div><div>E</div>diclofenac</div>	
			Risposta esatta	E				Risposta esatta	B

N°	2657	Domanda	La clozapina, avente la struttura indicata, è classificata come un neurolettico "atipico". Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?		
			<div><chem>Clc1ccc2c(c1)n(c3ccccc23)N4CCN(CC4)C5=CN=C2C6=CC=CC=C65</chem></div>		
			<div><div><div>A</div><div>e' un antagonista selettivo per il recettore dopaminergico D4</div></div><div><div>B</div><div>può comportare rischio di agranulocitosi</div></div><div><div>C</div><div>e' una dibenzodiazepina</div></div><div><div>D</div><div>la sua assunzione comporta grave rischio di effetti extrapiramidali</div></div><div><div>E</div><div>presenta effetti ipotensivi</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2658	Domanda	L'HPLC è una sigla usata per caratterizzare una tecnica		
			<div><div><div>A</div><div>spettroscopica</div></div><div><div>B</div><div>radiologica</div></div><div><div>C</div><div>cromatografica</div></div><div><div>D</div><div>sintetica</div></div><div><div>E</div><div>microbiologica</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2659	Domanda	Il trasferimento della titolarità di una farmacia privata è consentito:		
			<div><div><div>A</div><div>decorso due anni dall'acquisto della titolarità</div></div><div><div>B</div><div>decorso tre anni dall'acquisto della titolarità</div></div><div><div>C</div><div>decorso cinque anni dall'acquisto della titolarità</div></div><div><div>D</div><div>non prima di dieci anni dall'acquisto della titolarità</div></div><div><div>E</div><div>in qualunque momento</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2660	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "calina" nella Denominazione Comune?		
			<div><div><div>A</div><div>anestetici locali</div></div><div><div>B</div><div>beta-bloccanti</div></div><div><div>C</div><div>antagonisti nicotinici</div></div><div><div>D</div><div>agonisti muscarinici</div></div><div><div>E</div><div>a nessuna di quelle indicate</div></div></div>	Risposta esatta	A



N°	2661	Domanda	L'insulina glargine presenta, rispetto all'insulina umana regolare :	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div></div> <div><div>minore durata d'azione</div><div>maggior durata d'azione</div><div>uguale durata d'azione</div><div>minore emivita plasmatica</div><div>maggior assorbimento dal sito di iniezione</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2662	Domanda	L'ezetimibe, un farmaco indicato per la ipercolesterolemia primaria, agisce	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div></div> <div><div>inibendo la sintesi del colesterolo</div><div>aumentando la degradazione metabolica del colesterolo</div><div>diminuendo l'assorbimento del colesterolo nell'intestino tenue</div><div>abbassando la velocità di metabolizzazione delle statine</div><div>nessun meccanismo indicato è corretto</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2663	Domanda	La fluoxetina è un farmaco	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div></div> <div><div>inibitore reversibile delle monoammino ossidasi</div><div>di prima scelta nella terapia dell'ipertermia maligna</div><div>che non ha nessuna delle caratteristiche indicate</div><div>che inibisce la trasmissione gangliare</div><div>antileintintico</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2664	Domanda	Si devono preparare 100 ml di una soluzione di HCl 0,1 M disponendo di HCl 12 M. Entro quale intervallo ricade la quantità di acido 12 M da prelevare?	<div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div></div></div> <div><div>5 - 15 ml</div><div>100 - 120 ml</div><div>80 - 100 ml</div><div>0,5 - 1,5 ml</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	D

N°	2665	Domanda	Quale dei farmaci elencati è un inibitore della fibrinolisi	<div><div><div>A</div><div>eparina</div></div><div><div>B</div><div>attivatore tissutale del plasminogeno</div></div><div><div>C</div><div>alteplasi</div></div><div><div>D</div><div>acido tranexamico</div></div><div><div>E</div><div>urochinasi</div></div></div>			Risposta esatta	D
N°	2667	Domanda	Se ricorrono le condizioni previste dalla normativa per la consegna da parte del farmacista di medicinali assoggettati a prescrizione medica, in caso di necessità e urgenza, senza presentazione di ricetta medica, è consentito al farmacista di dispensare medicinali stupefacenti?	<div><div><div>A</div><div>si, sempre</div></div><div><div>B</div><div>no, mai</div></div><div><div>C</div><div>si, ma solo per gli stupefacenti della tabella II, sezioni D ed E</div></div><div><div>D</div><div>si, ma solo per gli oppiacei utilizzati per la terapia del dolore</div></div><div><div>E</div><div>si, ma solo per i medicinali stupefacenti prescrivibili in regime di SSN</div></div></div>			Risposta esatta	B
N°	2666	Domanda	Gli enzimi svolgono il ruolo di catalizzatori in specifiche reazioni chimiche. Quale delle affermazioni seguenti riguardanti le reazioni enzimatiche è corretta: gli enzimi	<div><div><div>A</div><div>innalzano il valore della costante di equilibrio della reazione</div></div><div><div>B</div><div>abbassano il valore della costante di equilibrio della reazione</div></div><div><div>C</div><div>innalzano l'energia di attivazione della reazione</div></div><div><div>D</div><div>abbassano l'energia di attivazione della reazione</div></div><div><div>E</div><div>mantengono costante l'energia di attivazione della reazione</div></div></div>			Risposta esatta	D
N°	2668	Domanda	Quale tra i seguenti farmaci antiasma è un inibitore dei recettori del leucotriene D ₄ (LTD ₄)?	<div><div><div>A</div><div>Ipratropio</div></div><div><div>B</div><div>Cromoglicato di sodio</div></div><div><div>C</div><div>Prednisone</div></div><div><div>D</div><div>Adrenalina</div></div><div><div>E</div><div>Zafirlukast</div></div></div>			Risposta esatta	E


N°	2669	Domanda	Quale delle indicazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di antisettico? Sostanza	<div><div><div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>battericida sistemica</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>B</div></div></div><div>microbicida topica</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>C</div></div></div><div>battericostatica sistemica</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>D</div></div></div><div>antimicrobica topica e sistemica</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>E</div></div></div><div>che impedisce lo sviluppo di microorganismi</div></div></div> <td>Risposta esatta</td> <td>E</td>	Risposta esatta	E
N°	2670	Domanda	Gli agonisti beta2 adrenergici hanno attività	<div><div><div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>broncodilatatrice</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>B</div></div></div><div>vasodilatatrice</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>C</div></div></div><div>rilassante del miometrio</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>D</div></div></div><div>tutte le attività riportate</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>E</div></div></div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div> <td>Risposta esatta</td> <td>D</td>	Risposta esatta	D
N°	2671	Domanda	Per quali medicinali vi è l'obbligo di prescrizione medica in triplice copia a ricalco?	<div><div><div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>I veleni</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>B</div></div></div><div>gli stupefacenti della tabella II Sez. A del DPR n. 309/1990</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>C</div></div></div><div>gli stupefacenti della tabella I, II Sez. A e C del DPR n. 309/1990</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>D</div></div></div><div>solo per i medicinali utilizzati nella disassuefazione degli stati di tossicodipendenza</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>E</div></div></div><div>tutti i medicinali stupefacenti assoggettati al DPR 309/1990</div></div></div> <td>Risposta esatta</td> <td>B</td>	Risposta esatta	B
N°	2672	Domanda	In quale classe, tra quelle sotto riportate, può essere catalogato in maniera più precisa possibile il principio attivo avente la struttura indicata	<div><div><div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>acidi carbossilici</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>B</div></div></div><div>pirazolidindioni</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>C</div></div></div><div>anilidi</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>D</div></div></div><div>sofonammidi</div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>E</div></div></div><div>acidi pirrobacetici</div></div></div> <div><chem>Cc1ccc(cc1)C(=O)N(C)C(=O)CO</chem></div> <td>Risposta esatta</td> <td>E</td>	Risposta esatta	E

2673	N°	Domanda	Quale dei seguenti farmaci è utilizzato sia nella terapia del grande male epilettico che in quella delle aritmie cardiache?	<div><div><input type="radio"/> A</div> difenildantoina</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> primidone</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> carbamazepina</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> fenobarbital</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> procainamide</div>	Risposta esatta	A
2674	N°	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le acque minerali naturali è corretta?	<div><div><input type="radio"/> A</div> non possono essere utilizzate per la preparazione di bevande analcoliche</div> <div><div><input type="radio"/> B</div> devono essere sottoposte a trattamento di potabilizzazione</div> <div><div><input type="radio"/> C</div> non possono essere addizionate di CO₂ senza apposita dichiarazione in merito</div> <div><div><input type="radio"/> D</div> non devono riportare sul contenitore la data di scadenza</div> <div><div><input type="radio"/> E</div> devono riportare sul contenitore la data di imbottigliamento</div>	Risposta esatta	C
2675	N°	2675	Domanda	<div><div><p>Nelle tecniche utilizzate per ottenere il controllo del rilascio dei farmaci si utilizzano reazioni che permettono di legare il farmaco (Farm) ad una resina (Res) in modo tale che, successivamente, il farmaco possa poi essere rilasciato nei distretti opportuni. Quale delle affermazioni, sotto elencate e riguardanti questa applicazione tecnologica è ERRATA</p><div><div>$\begin{array}{c} \text{Res} - \text{N}^+ - \text{H} \\ \\ \text{Farm} - \text{COO}^- \end{array} \quad (I)$</div><div><div>$\begin{array}{c} \text{Res} - \text{COO}^- \\ \\ \text{Farm} - \text{N}^+ - \text{H} \\ \\ (II) \end{array}$</div></div></div><div><div><input type="radio"/> A</div> da (I) si formano il sale sodico del farmaco e la resina cloridrato a livello dell'intestino</div><div><div><input type="radio"/> B</div> da (I) si formano il farmaco carbossilico e la resina cloridrato a livello dello stomaco</div><div><div><input type="radio"/> C</div> da (II) si formano il farmaco cloridrato e la resina carbossilica a livello dello stomaco</div><div><div><input type="radio"/> D</div> da (II) si ripristina il carbossile libero della resina a livello dello stomaco</div><div><div><input type="radio"/> E</div> la resina nello stomaco è sempre protonata</div></div></div>	Risposta esatta	A
2676	N°	2676	Domanda	<div><div><p>Gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare comprendono:</p><div><div><input type="radio"/> A</div> i prodotti dietetici e gli alimenti per la prima infanzia</div><div><div><input type="radio"/> B</div> i prodotti dietetici e gli integratori alimentari</div><div><div><input type="radio"/> C</div> i prodotti dietetici e gli alimenti addizionati di vitamine e minerali</div><div><div><input type="radio"/> D</div> gli alimenti funzionali</div><div><div><input type="radio"/> E</div> i nutraceutici</div></div></div>	Risposta esatta	A

N°	2677	Domanda	La consegna di stupefacenti acquistati dal farmacista in farmacia può essere effettuata a mezzo di pacco postale assicurato?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si, è l'unica modalità prevista</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si, è una delle modalità previste</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>no, mai</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, ma solo per gli stupefacenti della Tabella II Sez. 5,C e D</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si, ma solo per gli stupefacenti della Tabella II Sez. D</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>
N°	2679	Domanda	In quale caso è obbligatorio mostrare al pubblico in farmacia la tariffa nazionale dei medicinali?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>quando la farmacia è aperta</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>nel caso in cui venga richiesta</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>soltanto nei giorni in cui la farmacia esegue le preparazioni magistrali</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>esclusivamente quando sorgono contestazioni sul prezzo praticato</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>mai in quanto la tariffa è coperta dal segreto professionale</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>
N°	2680	Domanda	In quale caso è obbligatorio l'uso di un particolare modulo di prescrizione per l'acquisto di mangimi medicinali?	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>in tutti i casi</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>in nessun caso</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>esclusivamente quando sono destinati agli animali da compagnia</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>esclusivamente quando sono destinati agli animali produttori di alimenti per l'uomo</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nei casi in cui la vendita viene effettuata da parte di grossisti e fabbricanti</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>A</div>

N°	2681	Domanda	Chi stabilisce i requisiti generali per il decentramento delle farmacie?	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	D
			<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>			
N°	2683	Domanda	L'azione dell'acido acetilsalicilico a livello della ciclossigenasi avviene	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	C
			<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>			

N°	2682	Domanda	Nei sistemi monolitici il farmaco nella matrice polimerica è:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	E
			<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>			
N°	2684	Domanda	Le benzodiazepine interferiscono con la trasmissione GABA-ergica in quanto	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	Risposta esatta	C
			<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div>			




N°	2685	Domanda	I prodotti cosmetici ai sensi della Legge 7/13/86		N°	2687	Domanda	La soluzione cutanea di iodio (tintura di iodio) riportata in F.U. è	
			<input type="checkbox"/> A non possono essere registrati come presidi medico chirurgici					<input type="checkbox"/> A un alcoolita salino	
			<input type="checkbox"/> B possono essere sempre registrati anche come presidio medico chirurgico					<input type="checkbox"/> B un alcooliaturo	
			<input type="checkbox"/> C possono essere registrati anche come presidio medico chirurgico, previa autorizzazione del Ministero della Salute					<input type="checkbox"/> C un alcoolato	
			<input type="checkbox"/> D rientrano nel campo di applicazione del DPR 392/98 e non necessitano di registrazione					<input type="checkbox"/> D un idrolita	
			<input type="checkbox"/> E rientrano nel campo dei presidi medico chirurgici e non necessitano di registrazione					<input type="checkbox"/> E un alcoolita ammoniacale	
			Risposta esatta	A				Risposta esatta	A


N°	2686	Domanda	La porzione strutturale di molecola più direttamente responsabile dei processi farmacodinamici correlati al meccanismo d'azione degli antibiotici beta-lattamici è rappresentata		N°	2688	Domanda	Il polisorbato è:	
			<input type="checkbox"/> A dalla porzione ciclica contenente l'atomo di zolfo					<input type="checkbox"/> A un polisaccaride	
			<input type="checkbox"/> B dalla funzione carbossilica libera					<input type="checkbox"/> B un grasso idrogenato	
			<input type="checkbox"/> C dalla funzione ammidica esociclica					<input type="checkbox"/> C una miscela di esteri del sorbitolo con acidi grassi	
			<input type="checkbox"/> D dalla funzione ammidica ciclica					<input type="checkbox"/> D un copolimero del sorbitolo con ossido di etilene	
			<input type="checkbox"/> E da nessuna delle funzioni sopra indicate					<input type="checkbox"/> E un copolimero (sorbitolo e ossido di etilene) esterificato con acidi grassi	
			Risposta esatta	D				Risposta esatta	E




N°	2689	Domanda	L'induzione farmacometabolica è prevenuta da:	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div>inibizione della sintesi di DNA</div></div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div><div>inibizione della trascrizione del DNA</div></div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div><div>inibizione della traduzione dell'mRNA</div></div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2690	Domanda	L'indice terapeutico dei digitali è circa:	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div>2</div></div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div><div>10</div></div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div><div>20</div></div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div><div>100</div></div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div><div>> 100</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2691	Domanda	Il dimeticone, avente la struttura chimica indicata, svolge azione adiuvante di natura	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div>lassativa</div></div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div><div>anestetica locale</div></div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div><div>prochinetica</div></div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div><div>spasmolitica</div></div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div><div>antimeteorica</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2692	Domanda	Nell'annotare il prezzo in etichetta apposta sul recipiente dei medicinali galenici magistrali allestiti in farmacia, il farmacista è tenuto a specificare l'importo complessivo delle sostanze?	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div>si, sempre</div></div></div><div><div><div></div><div>B</div></div><div><div>no, solo sull'etichetta che appone sull'involucro</div></div></div><div><div><div></div><div>C</div></div><div><div>no, è obbligato ad indicare solo il prezzo complessivo del medicinale</div></div></div><div><div><div></div><div>D</div></div><div><div>no, se il tariffario è esposto al pubblico</div></div></div><div><div><div></div><div>E</div></div><div><div>si, ma solo se il prezzo si discosti da quello di tariffa</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	A



N°	2693	Domanda	Tutte le beta lattamine indicate sono resistenti alle eta lattamasi TRANNE	<div><div><div>A</div><div>oxacillina</div></div><div><div>B</div><div>flucloxacillina</div></div><div><div>C</div><div>penicillina V</div></div><div><div>D</div><div>imipenem</div></div><div><div>E</div><div>naftollina</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2695	Domanda	Una paziente riferisce episodi di tachicardia a seguito dell'assunzione di un integratore vegetale per ridurre il peso corporeo. Quale delle droghe vegetali presenti nell'integratore e di seguito elencate potrebbe aver causato l'effetto avverso riferito?	<div><div><div>A</div><div>alga bruna (lallo di <i>Fucus vesiculosus</i> L.)</div></div><div><div>B</div><div>arancio amaro (epicarpo di <i>Citrus aurantium</i> L.)</div></div><div><div>C</div><div>gomma guar (endosperma del seme di <i>Cyamopsis tetragonolobus</i> L.)</div></div><div><div>D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div><div><div>E</div><div>tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2696	Domanda	Nelle attività della situazione patrimoniale del bilancio di una farmacia sono presenti:	<div><div><div>A</div><div>immobili ed arredi</div></div><div><div>B</div><div>merci e attrezzature</div></div><div><div>C</div><div>crediti verso terzi</div></div><div><div>D</div><div>più di una indicazione è corretta</div></div><div><div>E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2694	Domanda	Quale delle affermazioni sottoriportate non è riferibile alla litotrina sale sodico?	<div><div><div>A</div><div>può esporre a maggiori rischi cardiaci</div></div><div><div>B</div><div>può potenziare l'effetto degli antidepressivi triciidici</div></div><div><div>C</div><div>più di una delle affermazioni riportate è corretta</div></div><div><div>D</div><div>non pone problemi di sovradosaggio</div></div><div><div>E</div><div>deve essere usata con particolare cautela per la sua potenza e rapidità nell'inizio dell'azione</div></div></div>	Risposta esatta	D



N°	2699	Domanda	Quale delle seguenti condizioni NON rientra tra le indicazioni riferite alla carbamazepina, riportata in figura?
			
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>grande male epilettico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>nevralgia del trigemino</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>disturbi bipolari del tono dell'umore</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>aritmie sopraventricolari</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nevralgie del glosso faringeo</div></div>	Risposta esatta D
N°	2698	Domanda	Le informazioni sui dispositivi medici rivolte esclusivamente agli operatori sanitari devono essere sottoposte ad autorizzazione del Ministero della Salute.
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si sempre</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no mai</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, se riguardanti determinate tipologie di dispositivi medici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, se riguardanti la classe III</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>si, se riguardanti i dispositivi impiantabili attivi</div></div>	Risposta esatta B
N°	2698	Domanda	La Farmacopea Ufficiale riporta una serie di metodiche analitiche per giudicare sulla identità di due sostanze. Dovendo decidere sull'identità di due campioni dei quali non si conosce la struttura, quale dei metodi elencati presenta maggiore affidabilità
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il punto di fusione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>lo spettro UV</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>la misura della densità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la risonanza magnetica nucleare</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>l'indice di rifrazione</div></div>	Risposta esatta D
N°	2700	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni sulla tossicità acuta e tossicità cronica è FALSA ?
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>la tossicità cronica si manifesta a dosi più basse delle dosi che danno tossicità acuta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la tossicità cronica si manifesta a dosi più alte delle dosi che danno tossicità acuta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>la tossicità cronica è più difficilmente individuabile di quella acuta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>la tossicità acuta è più facilmente individuabile rispetto a quella cronica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>gli effetti cronici sono dovuti ad accumulo del tossico e/o del danno</div></div>	Risposta esatta B

N°	2701	Domanda Sono tenuti a comunicare al Ministero della Salute il verificarsi di un incidente con un dispositivo medico:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>I fabbricanti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>gli operatori sanitari pubblici e/o privati ed i fabbricanti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>I referenti per la vigilanza</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>gli assicuratori di qualità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	B
----	------	---	---	-----------------	---


N°	2703	Domanda In quale delle seguenti classi di farmaci rientra la ciclofosfamide avente la struttura indicata?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antimetaboliti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>complessi del platino</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>antagonisti degli estrogeni</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>mostarde azotate</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>antibiotici</div></div>	<div><chem>ClCCN(CCCl)P(=O)(O)O</chem></div>	Risposta esatta	D
----	------	--	--	--	-----------------	---

N°	2702	Domanda Due soluzioni acquose presentano lo stesso punto di gelo. In base a questa constatazione si può affermare che la prima soluzione rispetto alla seconda è	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>le indicazioni riportate sono tutte corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>tra le indicazioni riportate due sono corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ipertonica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>isotonica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>isotonica</div></div>	Risposta esatta	B
----	------	---	---	-----------------	---

N°	2704	Domanda E' richiesta una specifica autorizzazione per poter produrre in farmacia i medicinali del Formulario Nazionale?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si da parte della Regione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>si da parte dell'AIFA</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si da parte del Ministero della Salute</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Si da parte della A.S.L.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>non è necessaria alcuna specifica autorizzazione</div></div>	Risposta esatta	E
----	------	--	---	-----------------	---


N°	2705	Domanda Da chi deve essere vidimato il registro di entrata e uscita del plasma e degli eritropiasti di origine umana per le farmacie?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>da nessuno, in quanto non ne è consentita la detenzione in farmacia</div><div>dal Sindaco</div><div>dal Prefetto</div><div>dall'A.S.L.</div><div>dall'AVIS o da altra associazione di donatori di sangue legalmente riconosciuta</div></div></div></div>	2707	Domanda Qual è la durata di validità della ricetta SSN non ripetibile che prescrive medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di medici specialisti?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>dieci giorni compreso quello di rilascio</div><div>dieci giorni escluso quello di rilascio</div><div>trenta giorni escluso il giorno di rilascio</div><div>tre mesi</div><div>centoventi giorni</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
----	------	--	---	------	---	--	-----------------	---

N°	2706	Domanda Individuare tra le seguenti affermazioni relative al Piano Terapeutico quella corretta:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>le strutture non autorizzate alla formulazione del PT per un determinato medicinale possono effettuare la prescrizione a carico del SSN</div><div>la durata massima del Piano Terapeutico è di 2 anni</div><div>il Piano Terapeutico deve essere redatto per tutti i farmaci del PHT (Prontuario Ospedale Territorio)</div><div>con l'introduzione del Piano Terapeutico è stato superato l'obbligo di prescrizione per determinati farmaci solo da parte dello specialista a cui è invece sempre riservata la predisposizione del PT</div><div>il Piano Terapeutico è necessario solo nell'ambito della disassunzione</div></div></div></div>	2708	Domanda Nei ricavi del conto economico del bilancio di una farmacia sono presenti:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>quota vendite per il SSN</div><div>gli interessi attivi</div><div>le rimanenze finali</div><div>la quota vendite per contanti</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div></div>	Risposta esatta	E
----	------	--	---	------	---	---	-----------------	---



N°	2709	Domanda	I farmaci agonisti ed antagonisti adrenergici trovano applicazione nella terapia cardiovascolare. In quale dei seguenti settori terapeutici sono utilizzati gli antagonisti	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>antianginosi</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div>ipolipidizzanti</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div>diuretici dell'ansa</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div>in tutti i settori indicati</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div>soltanto in due dei settori indicati</div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2711	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di "farmacovigilanza"	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>cautele nell'adeguato stoccaggio dei farmaci in farmacia</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div>sorveglianza sull'abuso dei farmaci</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div>sorveglianza sulla spesa farmaceutica</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div>sorveglianza sugli effetti collaterali dei farmaci in fase IV</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div>sorveglianza sulla data di scadenza dei medicinali</div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2710	Domanda	Quale, tra gli aminoacidi elencati, appartiene alla categoria dei così detti "aminoacidi ramificati" (BCAA) ?	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>tirosina</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div>acido aspartico</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div>acido glutammico</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div>leucina</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div>tutti quelli indicati</div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2712	Domanda	Il propfenazone, di cui è riportata la struttura, è un farmaco FANS appartenente alla famiglia:	<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><div>dei pirazoli</div></div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div>dei salicilati</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div>degli acidi arilacetici</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div>degli acidi eteroarilacetici</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div><div><div>degli acidi fenamici</div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Risposta esatta	A


N°	Domanda	2715	Domanda	Risposta esatta
2713	Quale, tra le seguenti classi di farmaci antimicrobici, agisce sul metabolismo energetico della cellula batterica?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	I diuretici risparmiatori di K ⁺ provocano	A
		<div>Chinoloni</div> <div>Tetraciline</div> <div>Monobattami</div> <div>Sulfonamidi</div> <div>Rifamicine</div>		
			<div><input type="checkbox"/> A</div> <div><input type="checkbox"/> B</div> <div><input type="checkbox"/> C</div> <div><input type="checkbox"/> D</div> <div><input type="checkbox"/> E</div>	<div>iperkalemia e acidosi metabolica</div> <div>iperkalemia e alcalosi metabolica</div> <div>aumento della secrezione urinaria di H⁺</div> <div>natriuresi più marcata rispetto ai tiazidici</div> <div>potenziamento dei corticosteroidi mineralattivi</div>


N°	Domanda	2716	Domanda	Risposta esatta
2714	L'acido clavulanico, avente la struttura indicata, è in grado di	<div><input type="checkbox"/> A</div> <div><input type="checkbox"/> B</div> <div><input type="checkbox"/> C</div> <div><input type="checkbox"/> D</div> <div><input type="checkbox"/> E</div>	La nitrofurantoina è usata come	C
		<div></div>		
		<div>ritardare l'eliminazione della benzilpenicillina sale di sodio</div> <div>potenziare l'azione degli antibiotici a struttura glicosidica</div> <div>inibire le acetilasi batteriche</div> <div>inibire le beta-lattamasi</div> <div>inibire le adenilasi e le fosfatasi batteriche</div>	<div><input type="checkbox"/> A</div> <div><input type="checkbox"/> B</div> <div><input type="checkbox"/> C</div> <div><input type="checkbox"/> D</div> <div><input type="checkbox"/> E</div>	<div>antibatterico intestinale</div> <div>antibatterico sistemico</div> <div>antibatterico urinario</div> <div>antiprotozoiario</div> <div>antelmintico</div>



N°	2717	Domanda	In quale delle situazioni indicate trovano applicazione terapeutica i miorelassanti ad azione centrale:		N°	2719	Domanda	Nell'etichettatura dei dispositivi medici attivi:	
		<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>blefarospasmo</div><div>spasmi della muscolatura liscia</div><div>per rilasciare la muscolatura striata in chirurgia</div><div>spasticità da danni neurologici</div><div>ipertermia maligna</div></div></div>		<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>deve essere sempre indicato l'anno di fabbricazione</div><div>deve essere sempre indicata la data di scadenza</div><div>l'indicazione dell'anno di fabbricazione è facoltativa</div><div>deve essere riportato il marchio CE, seguito dal numero di identificazione dell'Organismo Notificato quando previsto</div><div>l'indicazione della data di scadenza è facoltativa</div></div></div>		Risposta esatta	D		
N°	2718	Domanda	Un medicinale regolarmente autorizzato al commercio in Italia ma temporaneamente indisponibile nel circuito commerciale		N°	2720	Domanda	Con quale dei seguenti farmaci potrebbe dare interazioni farmacodinamiche l'olio di pesce, contenente acidi grassi omega-3?	
		<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>non può essere importato</div><div>può essere importato su autorizzazione del Ministero della Salute</div><div>può essere importato in base a una specifica autorizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco</div><div>è necessaria una successiva autorizzazione AIFA alla commercializzazione</div><div>può essere importato su autorizzazione della A.S.L.</div></div></div>		<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>E</div></div></div><div><div>Omeprazolo</div><div>Ticlopidina</div><div>Nicardipina</div><div>Cetirizina</div><div>Pilocarpina</div></div></div>		Risposta esatta	C		
		Risposta esatta	C				Risposta esatta	B	

N°	2721	Domanda	L'acido domoico, potenziale inquinante di molluschi, induce:	<div><div>A</div>ipoglicemia</div> <div><div>B</div>epatossicità</div> <div><div>C</div>neurotossicità</div> <div><div>D</div>cardiossicità</div> <div><div>E</div>nefro tossicità</div>	Risposta esatta	C
N°	2723	Domanda	Quale tra i seguenti effetti tossici può essere provocato dall'esposizione dell'embrione a sostanze chimiche durante il periodo organogenetico:	<div><div>A</div>embriofetaliità</div> <div><div>B</div>anomalie morfologiche</div> <div><div>C</div>ritardo dello sviluppo</div> <div><div>D</div>tutte le indicazioni sono corrette</div> <div><div>E</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div>	Risposta esatta	D
N°	2724	Domanda	L'iscrizione all'albo tenuto dall'Ordine dei farmacisti dà diritto ad esercitare la professione:	<div><div>A</div>nella sola Provincia cui l'Albo si riferisce</div> <div><div>B</div>in tutto il territorio nazionale</div> <div><div>C</div>nella sola Regione di appartenenza della Provincia dell'Ordine</div> <div><div>D</div>nel Comune presso il quale il farmacista è residente</div> <div><div>E</div>in tutto il mondo</div>	Risposta esatta	B
N°	2722	Domanda	Gli anestetici locali di impiego clinico devono la loro azione	<div><div>A</div>al blocco dei canali del K⁺</div> <div><div>B</div>al blocco dei canali del Na⁺ dall'esterno della fibra nervosa</div> <div><div>C</div>al blocco dei canali del Ca²⁺</div> <div><div>D</div>all'inibizione dell'ATPasi Na⁺, K⁺-dipendente</div> <div><div>E</div>al blocco dei canali del Na⁺ dall'interno della fibra nervosa</div>	Risposta esatta	E




N°	2725	Domanda	Quale delle seguenti forme di droghe vegetali contengono alcaloidi di tipo tropanico (scheletro generale indicato) ad azione anticolinergica?		N°	2727	Domanda	La "polverizzazione per intermedio" consiste in una	
									
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Stramonio - Giusquiamo - Belladonna</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Stramonio - Efedra - Belladonna</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Giusquiamo - Ipecacuana - Efedra</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Belladonna - Giusquiamo - Efedra</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Belladonna - Efedra - Ipecacuana</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>tritrazione in presenza di materiale abrasivo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>tritrazione spinta utilizzando una lastra di materiale duro con un'apposita "mola"</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>polverizzazione meccanica adottando tipi diversi di mulini meccanici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>frantumazione esercitata con un pestello in un mortaio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni fornite</div></div>	
				Risposta esatta A					Risposta esatta A
N°	2726	Domanda	Quale delle affermazioni riportate è corretta per l'ipeacuana (radice di <i>Uragoga ipecacuanha</i> Bail.)?		N°	2728	Domanda	La tossicità da farnaci:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>contiene alcaloidi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>i suoi preparati possono essere utilizzati come espelloranti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>uno dei suoi principi attivi, l'emetina, ha effetti antiamebici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>e' indipendente da fattori genetici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>può essere legata al meccanismo d'azione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>e' causata solo da ipersensibilità</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>tende a diminuire se diminuisce la clearance del farmaco</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tende ad aumentare se aumenta la clearance del farmaco</div></div>	
				Risposta esatta D					Risposta esatta B



N°	2733	Domanda	Il gemfibrozil è un farmaco usato normalmente per la cura	<div><div>A</div>di infezioni renali</div> <div><div>B</div>di ulcere gastriche</div> <div><div>C</div>di epatiti</div> <div><div>D</div>di congiuntiviti di origine batterica</div> <div><div>E</div>di dislipidemia e/o ipercolesterolemia</div>	Risposta esatta	E
N°	2735	Domanda	Molte specialità medicinali utilizzate per la terapia dell'iperacidità gastrica contengono idrossidi o sali complessi di alluminio. Quale delle affermazioni seguenti riguardanti l'alluminio è corretta?	<div><div>A</div>provoca stipsi</div> <div><div>B</div>i prodotti che si formano per reazione con l'acido gastrico sono solubili a pH minore di 4</div> <div><div>C</div>l'acido citrico ne aumenta la biodisponibilità</div> <div><div>D</div>malattia di Alzheimer e presenza di alluminio nel SNC sembrano essere correlati tra loro</div> <div><div>E</div>tutte le affermazioni riportate sono corrette</div>	Risposta esatta	E

N°	2734	Domanda	Nell'avvelenamento da organofosforici si ha	<div><div>A</div>ritenzione urinaria</div> <div><div>B</div>rilasciamento del muscolo sfintere della pupilla</div> <div><div>C</div>ileo paralitico</div> <div><div>D</div>bradicardia</div> <div><div>E</div>diminuzione delle secrezioni bronchiali</div>	Risposta esatta	D
N°	2736	Domanda	In quale tabella della F.U. sono elencati gli apparecchi e utensili di cui la farmacia deve essere provvista obbligatoriamente	<div><div>A</div>in Tabella 2</div> <div><div>B</div>in Tabella 4</div> <div><div>C</div>in Tabella 8</div> <div><div>D</div>in Tabella 5</div> <div><div>E</div>in Tabella 6</div>	Risposta esatta	E



N°	2737	Domanda	Quale, tra gli enzimi seguenti, partecipa alla demolizione dell'acetilcolina nell'organismo?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>più di uno di quelli indicati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>COMT</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Acetilcolinesterasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>DOPA decarbossilasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>O-acetiltransferasi</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2739	Domanda	Quale è l'attività farmacologica più rilevante della procaina, avente la struttura indicata	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antidepressiva</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>neurolettica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>anticonvulsivante</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>anestetica locale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>antimuscarinica</div></div>	Risposta esatta	D

CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1

N°	2740	Domanda	Quale tra i farmaci elencati contrae il muscolo sfintere della pupilla?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Fenilefrina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Clonidina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Pilocarpina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Scopolamina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Losciamina</div></div>	Risposta esatta	C
----	------	---------	---	---	-----------------	---

N°	2741	Domanda	Gli SPAN sono contraddistinti da numeri, ai quali corrisponde una o più catene di acido grasso ed il tipo di acido grasso. Nel caso del sorbitan trioleato quale nome è corretto?
		A	Span 65
		B	Span 30
		C	Span 85
		D	Span 20
		E	nessuna delle indicazioni fornite
		Risposta esatta	C

OCC1(COC(=O)C/C=C\CCCCCCCC)CCC(O)C1O


N°	2742	Domanda	La metacelina ha la struttura indicata. La notevole attività del suo isomero destro, rispetto a quello levorotatorio, è dovuta principalmente
		A	alla distanza interatomica tra i gruppi farmaccofori
		B	al grado di distribuzione nell'organismo
		C	alla maggiore capacità di raggiungere rapidamente il sito di azione
		D	alla selettività per il recettore
		E	alla emivita del farmaco
		Risposta esatta	D

C[N+]1CCCC1CCCCCCCCCCCCCCCC

N°	2743	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti riguardanti il ferobarbital è errata?
		A	si utilizza come antiepilettico
		B	è obbligatorio da detenere in farmacia
		C	ha marcata attività sedativa
		D	può avere uso veterinario
		E	può essere consegnato in farmacia ad un sedicenne
		Risposta esatta	E

N°	2744	Domanda	Quale delle seguenti caratteristiche degli antibiotici aminoglicosidici è FALSA?
		A	sono instabili alle basi
		B	sono instabili agli acidi
		C	sono rapidamente assorbiti per via orale
		D	hanno uno spettro di azione ampio
		E	hanno tossicità renale
		Risposta esatta	C


N°	2745	Domanda Si devono preparare 300 ml di una soluzione di HCl 2 M disponendo di HCl 6 M. Entro quale intervallo ricade la quantità di HCl 6 M da prelevare?	<div><div><div><div>A</div></div><div>5 - 15 ml</div></div><div><div>B</div><div>100 - 120 ml</div></div><div><div>C</div><div>80 - 95 ml</div></div><div><div>D</div><div>0,5 - 1,5 ml</div></div><div><div>E</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div></div>		Risposta esatta B
N°	2746	Domanda Quale tra i farmaci antimicrobici seguenti riesce a provocare modificazioni della sintesi o del metabolismo degli acidi nucleici della cellula batterica.	<div><div><div><div>A</div></div><div>trimetoprim</div></div><div><div>B</div><div>dapsone</div></div><div><div>C</div><div>metronidazolo</div></div><div><div>D</div><div>penicilline</div></div><div><div>E</div><div>più di uno tra quelli indicati</div></div></div>		Risposta esatta E
N°	2747	Domanda Ai sensi della Legge 713/86 e successive modifiche, i prodotti cosmetici	<div><div><div><div>A</div></div><div>non hanno finalità terapeutiche e non possono vantare attività terapeutica</div></div><div><div>B</div><div>non hanno finalità terapeutiche, ma possono vantare attività terapeutica</div></div><div><div>C</div><div>hanno finalità terapeutiche, ma non possono vantare attività terapeutica</div></div><div><div>D</div><div>possono vantare attività terapeutica nei soli casi previsti dall'Allegato II</div></div><div><div>E</div><div>hanno finalità terapeutiche e possono vantare attività terapeutica</div></div></div>		Risposta esatta A
N°	2748	Domanda Il farmacista al quale sia presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe C:	<div><div><div><div>A</div></div><div>deve obbligatoriamente consegnare il medicinale prescritto</div></div><div><div>B</div><div>può proporre la sostituzione con un medicinale equivalente, avente prezzo più basso</div></div><div><div>C</div><div>deve proporre la sostituzione con un medicinale equivalente, avente prezzo più basso</div></div><div><div>D</div><div>deve consegnare un medicinale equivalente</div></div><div><div>E</div><div>deve concordare la sostituzione con il medico prescrittore</div></div></div>		Risposta esatta C



N°	2749	Domanda	Gli antibiotici beta-lattamici agiscono per:	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div></div><div>B</div></div><div><div></div><div>C</div></div><div><div></div><div>D</div></div><div><div></div><div>E</div></div></div><div><div>inibizione della sintesi proteica</div><div>meccanismo di tipo competitivo</div><div>inibizione dell'attività transpeptidasi</div><div>inibizione della beta-lattamasi</div><div>inibizione della replicazione del DNA</div></div></div></div>	Risposta esatta	C	
N°	2750	Domanda	Le cefalosporine, come la ceftriaxone e la cefotaxime, che sono somministrabili i.m. o i.v., sono più frequentemente rappresentate nelle cefalosporine	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div></div><div>B</div></div><div><div></div><div>C</div></div><div><div></div><div>D</div></div><div><div></div><div>E</div></div></div><div><div>di prima generazione</div><div>di seconda generazione</div><div>di terza generazione</div><div>di prima e di seconda generazione</div><div>di seconda e di terza generazione</div></div></div></div>	Risposta esatta	E	
N°	2751	Domanda	L'efficacia di un farmaco esprime:	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div></div><div>B</div></div><div><div></div><div>C</div></div><div><div></div><div>D</div></div><div><div></div><div>E</div></div></div><div><div>la dose necessaria al raggiungimento dell'effetto massimo</div><div>l'intensità dell'effetto massimo raggiungibile</div><div>l'indice terapeutico</div><div>la potenza del farmaco</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div></div></div>	Risposta esatta	B	
N°	2752	Domanda	Il succo di pompelmo può modificare le concentrazioni plasmatiche di alcuni farmaci: indicare quale tra quelli elencati.	<div><div><div><div><div></div><div>A</div></div><div><div></div><div>B</div></div><div><div></div><div>C</div></div><div><div></div><div>D</div></div><div><div></div><div>E</div></div></div><div><div>Nifedipina</div><div>Ciclosporina</div><div>Lovastatina</div><div>Tutti quelli elencati</div><div>Tutti quelli indicati tranne uno</div></div></div></div>	Risposta esatta	D	

N°	2753	Domanda	I sulfamidici sono molecole	<div><div><div>A</div></div><div>neutre</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>aventi caratteristiche anfotere</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>acide</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>basiche</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div>
----	------	---------	-----------------------------	--

N°	2754	Domanda	L'uso cronico di lassativi antrachinonici in associazioni a farmaci depilatori di potassio può indurre:	<div><div><div>A</div></div><div>interazioni farmacocinetiche</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>aritmie</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>disturbi della coagulazione</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>disturbi neurologici</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>
----	------	---------	---	---




N°	2757	Domanda Quale delle informazioni sotto indicate è completamente FUORI LUOGO per utilizzare correttamente un antistaminico H1 di prima generazione?		
		<input type="checkbox"/> A seguire con attenzione le indicazioni del foglietto illustrativo		
		<input type="checkbox"/> B associare con antiacidi a causa dell'aumento dell'acidità gastrica		
		<input type="checkbox"/> C se possibile, assumere il farmaco prima di andare a letto		
		<input type="checkbox"/> D evitare attività, come la guida di un autoveicolo, che richiedono prontezza di riflessi ed attenzione		
		<input type="checkbox"/> E più di una delle informazioni elencate		
			Risposta esatta	D

N°	2759	Domanda Sono dovuti i diritti addizionali previsti dalla tariffa nazionale dei medicinali per la dispensazione di medicinali durante le ore notturne?		
		<input type="checkbox"/> A no, mai		
		<input type="checkbox"/> B no, sono dovuti solo per le preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia		
		<input type="checkbox"/> C sì		
		<input type="checkbox"/> D sì, ma solo per le farmacie rurali sussidiate		
		<input type="checkbox"/> E sì, tranne che per le ricette dichiarate urgenti dal medico		
			Risposta esatta	C

N°	2758	Domanda Un paziente ha fatto un prelievo di sangue a digiuno al mattino, dopo una cena abbondante e varia consumata la sera precedente. Quale dei parametri sotto indicati può risultare maggiormente alterato?		
		<input type="checkbox"/> A il valore del Colesterolo totale		
		<input type="checkbox"/> B il valore del Colesterolo HDL		
		<input type="checkbox"/> C il valore del Colesterolo LDL		
		<input type="checkbox"/> D il valore dei trigliceridi		
		<input type="checkbox"/> E il valore del glucosio		
			Risposta esatta	D

N°	2760	Domanda Come deve compiersi la chiusura annuale del registro entrata e uscita stupefacenti?		
		<input type="checkbox"/> A annullando tutti gli spazi vuoti		
		<input type="checkbox"/> B mediante apposita attestazione da parte dell'A.S.L.		
		<input type="checkbox"/> C in modo diverso da quelli indicati		
		<input type="checkbox"/> D annotando i dati riassuntivi di entrate, uscite e giacenze		
		<input type="checkbox"/> E annotando le sole giacenze		
			Risposta esatta	D





N°	2761	Domanda Quando è esclusa la ripetibilità di una ricetta ripetibile?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div> mai, essendo per definizione "ripetibile"</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div> ogni qual volta la prescrizione possa risultare pericolosa</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div> quando sono trascorsi trenta giorni dalla data della ricetta</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div> quando sia prescritto un numero di confezioni superiore all'unità</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div> quando il farmacista ritenga, per prudenza, di trattenere l'originale</div>
----	------	--	--

Risposta esatta D

N°	2765	Domanda	Gli SPAN e i TWEEN vengono utilizzati come eccipienti per stabilizzare preparazioni come le sospensioni e le emulsioni. Quale delle seguenti affermazioni su questi tensioattivi è ERRATA?	<div><div><div><div><div><input type="radio"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>E</div></div></div><div><div>vergono classificati entrambi con dei numeri</div><div>possono essere utilizzati in combinazione nella stessa preparazione</div><div>vengono usati entrambi per l'allestimento di preparazioni iniettive</div><div>contengono entrambi una o più catene di acidi grassi</div><div>sono entrambi dei derivati del sorbitano</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2766	Domanda	La dobutamina, avente la struttura indicata, agisce	<div><div><div><div><div><input type="radio"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>E</div></div></div><div><div>come antagonista dei recettori alfa e beta adrenergici</div><div>provocando la liberazione di acetilcolina</div><div>provocando la liberazione di dopamina</div><div>come agonista dei recettori beta¹ adrenergici</div><div>con meccanismo diverso da tutti quelli elencati</div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2767	Domanda	Il paracetamolo (1) può, analogamente all'acido acetilsalicilico (2), agire il gruppo amminico della lisina delle albumine plasmatiche per renderle meno disponibili a legarsi ad altri farmaci?	<div><div><div><div><div><input type="radio"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>E</div></div></div><div><div>no in quanto il gruppo acetilico di (1) si trova già impegnato in un legame ammidico</div><div>no in quanto la reazione di transacetilazione è sfavorita dal gruppo ossidrilico in para</div><div>si in quanto la reazione di transacetilazione è favorita dal gruppo ossidrilico in para</div><div>più di una delle indicazioni date è corretta</div><div>nessuna delle indicazioni date è corretta</div></div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2768	Domanda	L'impiego del dolcificante aspartame, avente la struttura indicata, è CONTROINDICATO per i pazienti affetti da	<div><div><div><div><div><input type="radio"/></div><div>A</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>B</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>C</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>D</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>E</div></div></div><div><div>piroglutammico-acidemia</div><div>diabete</div><div>nefriti</div><div>fenilketonuria</div><div>gastroenteriti</div></div></div></div>	Risposta esatta	D





N°	2769	Domanda	In quale di queste soluzioni l'acido feniltilbarbiturico (fenobarbitale) presenta la massima solubilità?		N°	2771	Domanda	Qual è l'effetto collaterale dei farmaci appartenenti alla classe delle biguanidi?			
				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>H₂O</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sol. 0,1 M di H₂SO₄ in H₂O</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sol. 2 M di H₂SO₄ in H₂O</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sol. 0,1 M di NaOH in H₂O</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sol. saturata di NaHCO₃ in H₂O</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>acidosi lattica sistemica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>disturbi gastrointestinali</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>tutti quelli indicati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>diminuito assorbimento di B₁₂</div></div>	Risposta esatta	D	Risposta esatta	C
N°	2770	Domanda	Che cosa indica la tabella n.3 della Farmacopea Ufficiale?		N°	2772	Domanda	In quale delle seguenti condizioni potrebbe trovare impiego in terapia il delta9-tetraidrocannabinolo?			
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>I medicinali di cui le farmacie devono essere provviste obbligatoriamente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>I pesi atomici relativi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>gli apparecchi e gli utensili obbligatori in farmacia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>I medicinali da vendere dietro presentazione di ricetta medica</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>le sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave</div></div>			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>parkinsonismo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>depressione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>vomito indotto da cisplatino</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>aritmie cardiache</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>obesità</div></div>	Risposta esatta	E	Risposta esatta	C	



\dot{N}

2773

Domanda Le figure 1 e 2 rappresentano l'andamento delle curve dose-effetto di un farmaco. Esse differiscono in quanto



- A** si riferiscono ad un agonista ed al corrispondente antagonista
- B** si riferiscono a due agonisti con pari potenza
- C** si riferiscono a due antagonisti con pari potenza
- D** i valori delle ascisse della Fig. 1 sono riportati in forma logaritmica
- E** i valori delle ordinate della Fig. 2 sono riportati in forma logaritmica

si riferiscono a due agonisti con pari potenza

si riferiscono a due antagonisti con pari potenza

I valori delle ascisse della Fig. 1 sono riportati in forma logaritmica

i valori delle ordinate della Fig. 2 sono riportati in forma logaritmica

Risposta esatta D

Risposta esatta A

 \dot{N}

2774

Domanda Gli analoghi dei farmaci oppioidi presentano, contemporaneamente, proprietà analgesico-narcotiche ed antitussive. La potenza relativa delle due attività farmacologiche varia al variare del principio attivo. Quale delle seguenti affermazioni è errata?

- A** il destrometorfano presenta solo proprietà antitussive
- B** il levometorfano non presenta proprietà analgesico-narcotiche
- C** i medicinali contenenti racemorfano sono spedibili con Ricetta Medica Speciale
- D** il levopropossifene presenta proprietà antitussive
- E** il destropropossifene presenta proprietà analgesico-narcotiche

Il levometorfano non presenta proprietà analgesico-narcotiche

i medicinali contenenti racemetorfano sono spedibili con Ricetta Medica Speciale

Il levopropossifene presenta proprietà antitussive

Il destropropossifene presenta proprietà analgesico-narcotiche

Risposta esatta B

N° 2776

2776

Domanda Tutti i seguenti composti vengono classificati come sostanze naturali ad ECCEZIONE di

- atropina ☐ A
- meperidina ☐ B
- ouabaina ☐ C
- benzilpenicilina ☐ D
- morfina ☐ E

P meperidina

☐ ouabaina

benzilpenicillina


E morfina

Risposta esatta **B**

N°	2777	Domanda	Quale dei farmaci sottelencati si comporta da antidiarroico in quanto svolge un'azione sulla muscolatura liscia intestinale	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>norfina</div><div>scopolamina</div><div>atropina</div><div>loperamide</div><div>tutti</div></div>
----	------	---------	---	--

Risposta esatta

E




N°	2781	Domanda	Quale classe di farmaci viene comunemente indicata con il termine di "glitazoni"? 	<div><div>A</div> solfoniluree (ipoglicemizzanti)</div> <div><div>B</div> tiazolidindioni</div> <div><div>C</div> biguanidi</div> <div><div>D</div> inibitori della pompa H⁺/K⁺ ATP-asi</div> <div><div>E</div> nessuna di quelle indicate</div>	Risposta esatta	B
N°	2783	Domanda	Il piroxicam è un sulfone che presenta il fenomeno del polimorfismo. Tale caratteristica può essere evidenziata da: 	<div><div>A</div> spettro UV</div> <div><div>B</div> spettro IR in soluzione</div> <div><div>C</div> cromatografia su strato sottile</div> <div><div>D</div> calorimetria</div> <div><div>E</div> nessuna delle metodiche indicate</div>	Risposta esatta	D
N°	2784	Domanda	Quale tra quelle elencate è una sostanza endogena derivata dai fosfolipidi di membrana e capace di causare contrazione uterina? 	<div><div>A</div> Angiotensina II</div> <div><div>B</div> Istamina</div> <div><div>C</div> Prostaciclina</div> <div><div>D</div> Prostaglandina E2</div> <div><div>E</div> Serotonina</div>	Risposta esatta	D


N°	2785	Domanda E' obbligatoria la ricetta medico-veterinaria in triplice copia per la vendita di medicinali per uso umano che debbano essere impropriamente impiegati in terapia veterinaria?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>si, ma per la terapia di animali produttori di alimenti per l'uomo</div><div>si, ma solo per la terapia di animali da compagnia</div><div>no, mai</div><div>si, ma solo per medicinali non erogabili in regime di S.S.N.</div><div>non possono essere prescritti</div></div>	N°	2787	Domanda Quali fra le seguenti condizioni consente al farmacista, in caso di necessità e urgenza, di consegnare un medicinale assoggettato a prescrizione medica senza presentazione della relativa ricetta?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>paziente con invalidità</div><div>più di uno dei casi indicati</div><div>paziente affetto da patologia acuta</div><div>paziente residente all'estero</div><div>paziente che necessita di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere</div></div>	Risposta esatta	A	Risposta esatta	E
----	------	---	---	----	------	--	---	-----------------	---	-----------------	---

N°	2786	Domanda La liofilizzazione è	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>un metodo di polverizzazione per intermedio</div><div>un metodo di essiccamento mediante sublimazione</div><div>un metodo di essiccamento per evaporazione sotto vuoto</div><div>un particolare processo di omogeneizzazione di emulsioni</div><div>un processo estrattivo</div></div>	N°	2788	Domanda In quale degli intervalli indicati si colloca il pH di una soluzione 2x10 ⁻⁶ N di HNO ₃ ?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>6,1 - 6,5</div><div>6,6 - 7,0</div><div>7,1 - 7,5</div><div>5,5 - 6,0</div><div>nessuno</div></div>	Risposta esatta	B	Risposta esatta	D
----	------	-------------------------------------	---	----	------	--	--	-----------------	---	-----------------	---


N°	2789	<div>Domanda</div> <div>In quale classe, tra quelle sotto riportate, può essere catalogato il principio attivo paracetamolo, avente la struttura indicata</div> <div><div><chem>CC(=O)Nc1ccc(O)cc1</chem></div><div><div><div><div>A</div><div>acidi carbossilici</div></div><div><div>B</div><div>pirazolidinioni</div></div><div><div>C</div><div>anilidi</div></div><div><div>D</div><div>idrossi acidi</div></div><div><div>E</div><div>chetosacidi</div></div></div></div></div>	N°	2791	<div>Domanda</div> <div>Quale dei valori elencati corrisponde all'incirca alla dose giornaliera di mantenimento della digossina?</div> <div><div><div><div>A</div><div>10 mg</div></div><div><div>B</div><div>0,25 mg</div></div><div><div>C</div><div>0,01 mg</div></div><div><div>D</div><div>5 mg</div></div><div><div>E</div><div>2 mg</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2790	<div>Domanda</div> <div>Quali dei seguenti eccipienti sono idonei per la stabilizzazione di una crema idrofila:</div> <div><div><div><div>A</div><div>esteri del sorbitano con acidi grassi</div></div><div><div>B</div><div>alcoli di lanolina</div></div><div><div>C</div><div>polossietilenderivati del sorbitano esterificati con acidi grassi</div></div><div><div>D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div><div><div>E</div><div>saponi di ioni bi- e trivalenti</div></div></div></div>	N°	2792	<div>Domanda</div> <div>Quale dei seguenti composti, utilizzabili come anestetici generali, è liquido a temperatura ambiente?</div> <div><div><div><div>A</div><div>cloroformio</div></div><div><div>B</div><div>midazolem</div></div><div><div>C</div><div>secobarbitale</div></div><div><div>D</div><div>tiopentale sodico</div></div><div><div>E</div><div>nessuno in quanto i composti indicati sono tutti solidi</div></div></div></div>	Risposta esatta	A



N°	2793	Domanda	Chi autorizza l'immissione in commercio di specialità medicinali?	<div><div><div>A</div></div>la Regione</div> <div><div><div>B</div></div>Il Ministero della Salute</div> <div><div><div>C</div></div>la A.S.L.</div> <div><div><div>D</div></div>il Ministero dello Sviluppo Economico</div> <div><div><div>E</div></div>l'AIFA</div>	Risposta esatta	E
N°	2795	Domanda	Quale delle affermazioni seguenti, riguardanti le sostanze utilizzate per impedire la crescita microbica nelle preparazioni farmaceutiche è corretta: molti composti aventi tale attività	<div><div><div>A</div></div>appartengono alla classe dei tensioattivi anionici</div> <div><div><div>B</div></div>appartengono alla classe dei tensioattivi cationici</div> <div><div><div>C</div></div>sono composti idrossilati aromatici</div> <div><div><div>D</div></div>sono costituiti da derivati mercuriali organici</div> <div><div><div>E</div></div>tutte le indicazioni date, con l'eccezione di una, sono corrette</div>	Risposta esatta	E
N°	2796	Domanda	Tra gli accoppiamenti di sigla e nome sotto riportati e riferiti agli emulsionanti più comuni qual è corretto?	<div><div><div>A</div></div>span 65 - gelatina</div> <div><div><div>B</div></div>tween 80 - metilcellulosa</div> <div><div><div>C</div></div>span 40 - acacia</div> <div><div><div>D</div></div>tween 80 - poliossietilen sorbitan monolaurato</div> <div><div><div>E</div></div>nessuna delle affermazioni riportate è corretta</div>	Risposta esatta	E
N°	2794	Domanda	La clonidina è usata come farmaco	<div><div><div>A</div></div>antianginoso</div> <div><div><div>B</div></div>estrogeno</div> <div><div><div>C</div></div>anticinetosico</div> <div><div><div>D</div></div>ipoglicemizzante</div> <div><div><div>E</div></div>antipertensivo</div>	Risposta esatta	E




N°	2797	Domanda	Prendono il nome di composti "glicidici" gli additivi che	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>mantengono unita la polvere delle compresse durante la granulazione e la compattazione</div><div>facilitano lo scorrimento delle polveri entro gli spazi delle matrici</div><div>evitano alla polvere di aderire ai punzoni e alle matrici</div><div>si mescolano con le polveri per far raggiungere alle compresse peso e volumi opportuni</div><div>permettono alle compresse di disgregarsi in ambiente acquoso</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2799	Domanda	A quale tipo di ricetta vengono assoggettate le prescrizioni magistrali a base di sostanze elencate nella Tab. 3 della F.U.	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>ripetibile</div><div>limitativa</div><div>speciale</div><div>redatta dallo specialista</div><div>da rinnovare volta per volta</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2800	Domanda	Tra gli stabilizzanti chimici di una preparazione semisolida per uso cutaneo a base lipofila si possono annoverare le seguenti sostanze, eccetto:	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>butil idrossianisolo</div><div>ascorbile palmitato</div><div>alfa-tocoferolo</div><div>metile p-idrossibenzoato</div><div>otile gallato</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2798	Domanda	Quale dei seguenti farmaci può indurre iperplasia gengivale?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>aloperidolo</div><div>fenobarbital</div><div>fenelzina</div><div>difenildantoina</div><div>enalapril</div></div>	Risposta esatta	D



N°	2801	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni relative al butilparaben NON è corretta:		N°	2803	Domanda	Può il socio di una società di gestione di una farmacia svolgere attività di informatore scientifico del farmaco?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è impiegato come conservante, efficace contro microbi e muffe</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no, mai</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la sua efficacia è migliorata dalla presenza di tensioattivi</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no, se socio direttore</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>la sua efficacia dipende dal pH</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>sì, sempre</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>in associazione con altri esteri dell'acido 4-idrossibenzoico si ha un effetto additivo</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sì, se socio non amministratore</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ha un coefficiente di ripartizione O/A maggiore di uno</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sì, purché tale attività rientri nell'oggetto sociale e sia indicata nell'atto costitutivo</div></div>	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	A


N°	2802	Domanda	La definizione "del punto di fusione con il "metodo al capillare" riportata nella F.U. è:		N°	2804	Domanda	Alcuni antagonisti muscarinici trovano impiego	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>la temperatura alla quale la prima particella di una sostanza solida passa in fase liquida</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>come decongestionanti oculari</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>la temperatura alla quale l'ultima particella di una sostanza solida passa in fase liquida</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>per il glaucoma</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>la temperatura alla quale la fase solida coesiste con la fase liquida</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>come midriatici</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>l'intervallo di temperatura tra il punto di fusione finale ed il punto di risolidificazione</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>in tutti i casi indicati</div></div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni fornite</div></div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>in nessuno dei casi indicati</div></div>	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	C



N°	2805	<div>Domanda</div> <div>Su quale dei seguenti recettori agisce direttamente la terbutalina, avente la struttura indicata, per rilasciare la muscolatura liscia bronchiale?</div> <div><chem>CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)cc1O</chem></div> <div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>alfa1 adrenergico</div></div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>beta1 adrenergico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>alfa2 adrenergico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>beta2 adrenergico</div></div>
----	------	--

☐ E

colinergico muscarinico



N°	2809	Domanda	Quale, tra quelli sotto indicati, costituisce adempimento di legge per il farmacista che abbia smarrito il registro di entrata e uscita degli stupefacenti?
A	dame comunicazione all'Ordine Professionale	B	dame comunicazione al Ministero della Salute (Ufficio Centrale Stupefacenti)
C	dame comunicazione alla A.S.L. di appartenenza	D	nessuno di quelli indicati
E	inoltrare denuncia scritta all'Autorità di Pubblica Sicurezza e dame comunicazione alla Autorità Sanitaria Locale	Risposta esatta	E


N°	2810	Domanda	La Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicamenti prevede un diritto addizionale quando nel medicamento è presente
A	in nessuno dei casi indicati	B	un colorante
C	una sostanza elencata in tab.3 della F.U.	D	una sostanza corrosiva o tossica
E	in più di uno dei casi indicati	Risposta esatta	E

(I) points to the iodine atom at position 3.
(II) points to the carboxylate group (-COONa).
(III) points to the sodium phenoxide group (-O-C6H5).

N°	2811	Domanda	Alcuni nitrati organici vengono usati come agenti antianginosi. Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?
A	l'isosorbide dinitrato dà origine a cataboliti attivi	B	l'isosorbide-5-mononitrato è catabolita attivo dell'isosorbide dinitrato
C	l'isosorbide-2-mononitrato è catabolita attivo dell'isosorbide dinitrato	D	isosorbide-2 e 5-mononitrato sono cataboliti dell'isosorbide dinitrato
E	nessuna indicazione è ERRATA	Risposta esatta	C


N°	2812	Domanda	Le curve dose-risposta il cui tratto "lineare" viene a costituire un insieme di rette parallele sul piano x-y sono maggiormente probabili quando i farmaci
A	hanno struttura di poco diversa ed uguale disponibilità farmaceutica	B	hanno diversa biodisponibilità
C	interagiscono con lo stesso recettore	D	hanno solubilità identica
E	hanno uguale biodisponibilità	Risposta esatta	C

N°	2817	Domanda	I farmaci beta-bloccanti sono controindicati:	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>nelle aritmie sopraventricolari</div></div><div><div><div>B</div></div><div>nelle aritmie ventricolari</div></div><div><div><div>C</div></div><div>nell'asma</div></div><div><div><div>D</div></div><div>nell'angina pectoris</div></div><div><div><div>E</div></div><div>nel feocromocitoma</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2819	Domanda	Quale l'indicazione clinica dei tiazolidindioni (glitazoni):	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>osteoporosi di grado elevato</div></div><div><div><div>B</div></div><div>diabete mellito di tipo 1</div></div><div><div><div>C</div></div><div>diabete mellito di tipo 2</div></div><div><div><div>D</div></div><div>anemia da diluizione</div></div><div><div><div>E</div></div><div>insufficienza cardiaca congestizia</div></div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2820	Domanda	Per i farmaci contenuti nella lista di monitoraggio intensivo di Farmacovigilanza dell'Agenzia Italiana del Farmaco che cosa bisogna segnalare?	<div><div><div><div><div>A</div></div><div>solo le reazioni avverse gravi</div></div><div><div><div>B</div></div><div>solo le reazioni avverse inattese</div></div><div><div><div>C</div></div><div>tutte le reazioni avverse</div></div><div><div><div>D</div></div><div>le reazioni avverse gravi e inattese</div></div><div><div><div>E</div></div><div>solo le reazioni avverse con esito fatale</div></div></div></div>	Risposta esatta	C




N°	2821	Domanda	Quale dei seguenti farmaci si può somministrare per facilitare il travaglio ed il parto?		N°	2823	Domanda	Gli enzimi polimerici (o polimerici) metabolizzanti gli xenobiotici sono:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>Dopamina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>enzimi per cui esistono più isoforme</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>Leuporelina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>enzimi inducibili</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>Oxibocina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>enzimi per cui esistono più varianti alleliche, con attività diversa</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>Protattina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>enzimi la cui attività varia in determinate condizioni fisiologiche</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>Desmopressina</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>enzimi presenti in più di un organo</div>	
				Risposta esatta C					Risposta esatta C

N°	2822	Domanda	Gli ormoni steroidei agiscono		N°	2824	Domanda	Chi rilascia l'autorizzazione per detenere in farmacia radiofarmaci?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>su specifici recettori di membrana</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>il Ministero della Salute</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> B</div>su specifici recettori citoplasmatici</div>					<div><div><input type="checkbox"/> B</div>la Regione</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> C</div>con meccanismo non recettoriale</div>					<div><div><input type="checkbox"/> C</div>non è prevista alcuna autorizzazione</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> D</div>inibendo specifici enzimi</div>					<div><div><input type="checkbox"/> D</div>la A.S.L.</div>	
			<div><div><input type="checkbox"/> E</div>attivando specifici enzimi</div>					<div><div><input type="checkbox"/> E</div>il Prefetto</div>	
				Risposta esatta B					Risposta esatta C



N°	2825	Domanda	Quale dei principi attivi sotto indicati conferisce ai medicinali che li contengono l'attività di antiacido	<div><div><div>A</div></div><div>solfato di bario</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>solfato di calcio</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>cloruro di magnesio</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>più di uno tra quelli indicati</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>nessuno di quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2827	Domanda	Le reazioni metaboliche tendono ad espellere le sostanze estranee (xenobiotici) introdotte nell'organismo. Quale delle affermazioni seguenti e riguardanti il metabolismo dei principi attivi indicati è corretta : la reazione più frequentemente coinvolta nella degradazione dei tre principi attivi (I), (II) e (III) è la reazione di	<div><div><div>A</div></div><div>decarbossilazione</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>idrolisi</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>ossidazione</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>racemizzazione</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>riduzione</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2828	Domanda	Nel trattamento delle epilessie possono trovare impiego	<div><div><div>A</div></div><div>agonisti dopaminergici</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>agonisti gabaergici</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>agonisti colinergici</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>antagonisti serotoninergici</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2826	Domanda	Le ciclodestrine sono costituite da:	<div><div><div>A</div></div><div>tensioattivi</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>amminoacidi</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>zuccheri</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>trigliceridi</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>fosfolipidi</div></div>	Risposta esatta	C




N°	2829	Domanda	I sulfamidici ad azione antibatterica inibiscono
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>le xantine ossidasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>le diidrofolato reductasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>le timidilato sintetasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>le diidropterato sintetasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>l'assorbimento dell'acido folico da parte della cellula</div></div>
			Risposta esatta D


N°	2831	Domanda	Il sumatriptan, avente la struttura indicata, interviene con la trasmissione serotoninergica in quanto
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>è agonista dei recettori 5-HT1D</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è antagonista ai recettori 5-HT1D</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>inibisce la captazione di serotonina nelle piastrine</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>inibisce la sintesi neuronale della serotonina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>inibisce le monoammino ossidasi</div></div>
			Risposta esatta A

N°	2830	Domanda	Nel caso di ricetta ripetibile è necessario che il medico indichi il nome e cognome del paziente ?
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>no, non è necessario</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>è assolutamente necessario</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>è indispensabile solo per alcune classi di farmaci</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>è necessario solo per prescrizioni rese valide per più di tre mesi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>è necessario solamente per pazienti che abbiano superato i 65 anni</div></div>
			Risposta esatta A


N°	2832	Domanda	Indicare in quale delle seguenti condizioni è utilizzato il metilfenidato:
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>morbo di Parkinson</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>depressione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>iperattività e deficit dell'attenzione nei bambini</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>schizofrenia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>spasticità muscolare</div></div>
			Risposta esatta C




N°	2833	<div>Domanda</div> <div>Nelle tecniche utilizzate per ottenere il controllo del rilascio dei farmaci si utilizzano reazioni che permettono di legare il farmaco (Farm) ad una resina (Res) in modo tale che, successivamente, il farmaco possa poi essere rilasciato nei distretti opportuni. Quale delle affermazioni, sotto elencate e riguardanti questa applicazione tecnologica è corretta</div>	N°	2835	<div>Domanda</div> <div>A quante preparazioni può essere intestata ciascuna pagina del registro entrata e uscita stupefacenti?</div>
	<div><div><div><div><div><div>Res</div><div>N⁺-H</div></div><div>Farm-COO⁻</div></div><div>(I)</div></div><div><div><div>Res-COO⁻</div><div>Farm-N⁺-H</div></div><div>(II)</div></div></div><div>da (I) si formano il farmaco carbossilico e la resina cloridrato a livello dello stomaco</div><div>da (II) si formano il farmaco carbossilico e la resina cloridrato a livello dello stomaco</div><div>da (II) si forma il sale sodico della resina a livello dello stomaco</div><div>il pH dell'intestino provoca la formazione del farmaco carbossilico sia da (I) che da (II)</div></div>			<div><div><div>A</div><div>non più di due purchè di identica forma farmaceutica</div></div><div><div>B</div><div>non più di due purchè di identico dosaggio</div></div><div><div>C</div><div>una per ogni singola forma e dosse di medicamento</div></div><div><div>D</div><div>una per ogni dose o due per ogni forma di medicamento</div></div><div><div>E</div><div>una per ogni forma farmaceutica o due per ogni dose di medicamento</div></div></div>	
		Risposta esatta B			Risposta esatta C
N°	2834	<div>Domanda</div> <div>Quale è l'effetto tossico della cloroquina nella profilassi antimalarica a lungo termine?</div>	N°	2836	<div>Domanda</div> <div>La miscela di sali indicata è reperibile in commercio. Quale delle funzioni sotto elencate svolge quando viene usata come additivo nella preparazione delle forme farmaceutiche?</div>
	<div><div><div>A</div><div>cheratopatia e retinopatia</div></div><div><div>B</div><div>neurotossicità</div></div><div><div>C</div><div>cefalea</div></div><div><div>D</div><div>dolori addominali</div></div><div><div>E</div><div>ipotensione</div></div></div>		<div><div><div><div><div><div><div>NaHSO₃</div><div>+</div><div>Na₂S₂O₅</div></div></div></div></div><div><div><div>A</div><div>antiossidante</div></div><div><div>B</div><div>acidificante</div></div><div><div>C</div><div>levigante</div></div><div><div>D</div><div>assorbente</div></div><div><div>E</div><div>alcalinizzante</div></div></div></div></div>		
		Risposta esatta A			Risposta esatta A




N°	2837	Domanda	Quali caratteristiche deve avere un medicinale per essere definito "medicinale omeopatico"?	<div><div><div>A</div></div><div><div>B</div></div><div><div>C</div></div><div><div>D</div></div><div><div>E</div></div></div> <div><div>essere diluito</div><div>essere diluito e dinamizzato</div><div>essere naturale</div><div>essere dinamizzato</div><div>tutte quelle indicate</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2839	Domanda	L'elossucimide è attiva nella terapia del piccolo male epilettico in virtù del meccanismo di	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>attivazione dei recettori beta adrenergici</div><div>incremento della sintesi di neuropeptidi</div><div>blocco transitorio delle sinapsi neuromuscolari</div><div>inibizione suicida della GABA transaminasi</div><div>inibizione dei canali T del Ca2+ nei nuclei talamici</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2840	Domanda	I farmaci biotecnologici sono caratterizzati da:	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div> <div><div>peso molecolare inferiore a 500</div><div>struttura policiclica condensata</div><div>costituenti peptidici</div><div>radioattività intrinseca</div><div>assenza di donatori di legami H</div></div>	Risposta esatta	C





N°	2841	Domanda	Quali, tra quelli indicati, sono i libri che il farmacista è obbligato a tenere in farmacia?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>nessuna indicazione è corretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>Farmacopea Europea</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>Classificazione ATC dei farmaci registrati in Italia</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>Formulario Nazionale</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>Martindale</div>	Risposta esatta	D
N°	2843	Domanda	Il passaggio di un farmaco dal sangue al SNC è favorito da:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>idrofilia</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>lipofilia</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>legame alle proteine plasmatiche</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>ionizzazione</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>natura polipeptidica</div>	Risposta esatta	B
N°	2844	Domanda	Il monossido d'azoto (NO) agisce:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>attivando la triglicerido lipasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>inibendo il rilascio di neurotrasmettitori</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>prevenendo l'autoossidazione della dopamina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>costringendo i vasi sanguigni</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>attivando la guanilato cicasi</div>	Risposta esatta	E
N°	2842	Domanda	La terbinafine è un farmaco ad azione	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>antiprotozoaria</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>antitumorale</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>antivirale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>antimicotica</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>antibatterica</div>	Risposta esatta	D




N°	2845	Domanda	Per quale motivo le compresse rivestite con un prodotto che presenta un gruppo funzionale dimetilamminico si solubilizzano facilmente a livello gastrico?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>il rivestimento ha carattere acido</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>il rivestimento ha carattere anfifilico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>il rivestimento ha carattere basico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>in ambiente acido il rivestimento si saponifica immediatamente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>il rivestimento ha carattere anionico.</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2847	Domanda	Quale tra i seguenti farmaci si impiega nell'amebiasi:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Pentamidina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Primetamina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Metronidazolo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Proguanil</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Azitromicina</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2848	Domanda	Il ceftriaxone, avente la struttura indicata, è prevalentemente attivo	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>nessuna delle affermazioni riportate è corretta</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>sui germi di tipo Pseudomonas</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>per via orale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>sui batteri Gram-positivi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>sui batteri Gram-negativi</div></div>	Risposta esatta	E



N°	2849	Domanda	Il farmacista è tenuto ad annotare sull'etichetta, che appone sul recipiente dei medicinali galenici che allestisce in farmacia, un adatto segno esterno, quando si tratti di sostanze velenose?	N°	2851	Domanda	L'eme è costituito da
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>si, sempre</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>no, soltanto sull'involucro</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>si, ma soltanto per dosaggi pericolosi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>si, ma soltanto per dosi non medicamentose</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>no, ma è comunque tenuto ad informare il cliente</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>Co e due nuclei pirrolici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>Mg e protoporfirina IX</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>Fe ed un nucleo pirrolico</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>Fe e due nuclei pirrolici</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>Fe e protoporfirina IX</div></div>	
Risposta esatta A				Risposta esatta E			
N°	2850	Domanda	Nella preparazione galenica in farmacia di minoxidil soluzione si impiegano come solventi etanolo, acqua e glicole propilenico. E' conveniente scegliere il farmaco, indicato in struttura,	N°	2852	Domanda	Il succo di pompelmo può provocare un aumento significativo della concentrazione plasmatica di alcuni calcio antagonisti in quanto:
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>inizialmente nel glicole propilenico aggiungendo poi gli altri solventi alla soluzione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>inizialmente nell'acqua aggiungendo poi gli altri solventi alla soluzione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>inizialmente nell'etanolo aggiungendo poi gli altri solventi alla soluzione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>direttamente nella miscela dei tre solventi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle soluzioni indicate offre dei vantaggi</div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>ne favorisce l'assorbimento</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ne riduce il metabolismo inibendo gli enzimi del citocromo P 450 (CYP3A4)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ne aumenta il catabolismo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ne modifica la distribuzione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>	
Risposta esatta A				Risposta esatta B			




N°	2853	Domanda	Quale, tra i seguenti sintomi, caratterizza la sindrome di astinenza da etanolo?	<div><div>A</div>minzione dolorosa</div> <div><div>B</div>diarrea incontrollabile</div> <div><div>C</div>convulsioni e allucinazioni</div> <div><div>D</div>tachicardia parossistica</div> <div><div>E</div>edema polmonare acuto</div>	Risposta esatta	C
N°	2855	Domanda	Gli inibitori delle beta-lattamasi agiscono come	<div><div>A</div>substrati suicidi</div> <div><div>B</div>inibitori multisubstrato</div> <div><div>C</div>analoghi dello stato di transizione</div> <div><div>D</div>inibitori reversibili competitivi</div> <div><div>E</div>inibitori stechiometrici</div>	Risposta esatta	A
N°	2854	Domanda	Quale delle seguenti specie vegetali è fonte di glicosidi cardioattivi?	<div><div>A</div><i>Hycoscyamus niger</i> L.</div> <div><div>B</div><i>Digitalis purpurea</i> L.</div> <div><div>C</div><i>Strophanthus Kombé</i> Ol.</div> <div><div>D</div><i>Strychnos nux vomica</i> L.</div> <div><div>E</div>più di una di quelle indicate</div>	Risposta esatta	E
N°	2856	Domanda	Nella dispensazione di un farmaco per il quale può essere opportuno rispettare la cadenza dei bioritmi nel periodo di cura, quale dei consigli sotto riportati è migliore? Da assumere	<div><div>A</div>"dopo i pasti"</div> <div><div>B</div>"a digiuno"</div> <div><div>C</div>"ad intervalli equidistanti"</div> <div><div>D</div>"ad intervalli prefissati"</div> <div><div>E</div>"dopo il pasto della sera"</div>	Risposta esatta	D





N°	2857	Domanda	La banca dati dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute censisce la raccolta delle informazioni relative:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>a parte dei dispositivi medici in commercio in Italia</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>ai dispositivi medici in commercio in Europa</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>ai dispositivi medici in commercio in Italia acquistati dal SSN</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>ai dispositivi medici in commercio in Italia che non hanno il codice identificativo ministeriale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ai dispositivi medici in commercio nei paesi extra-UE</div></div>	Risposta esatta A
N°	2859	Domanda	La ciclosporina è efficace nel trapianto d'organo. La sua azione immunosoppressiva è principalmente dovuta a:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>attivazione delle cellule natural killer (NK)</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>blocco delle risposte tessutali ai mediatori dell'infiammazione</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>aumento del catabolismo delle IgG</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>riduzione della proliferazione clonale delle cellule T</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>interferenza con il riconoscimento dell'antigene</div></div>	Risposta esatta D

N°	2858	Domanda	Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti che vengono aggiunti alle polveri allo scopo di far raggiungere alla compressa un peso congruo prendono il nome di "diluenti". Quale tra le sostanze sotto indicate rientra in questo gruppo di additivi:	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>biossido di titanio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>lattosio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>fosfato bibasico di calcio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>cellulosa microcristallina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le sostanze indicate, con l'eccezione di una</div></div>	Risposta esatta E
N°	2860	Domanda	Gli alcoolatari sono	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>preparati ottenuti per distillazione di droghe secche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>preparati ottenuti mediante diluizione di estratti</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>preparati estrattivi da droghe fresche</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>estratti alcoolici secchi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tinture</div></div>	Risposta esatta C




N°	2861	Domanda	Ondansetron e granisetron sono farmaci di prima scelta nel trattamento di:		N°	2863	Domanda	Un dispositivo su misura è:	
		<div><div><div>A</div></div><div>malattia di Parkinson</div></div>					<div><div><div>A</div></div><div>un dispositivo fabbricato secondo la prescrizione di un medico o da altra persona a ciò autorizzata per la sua qualificazione professionale, e destinato ad essere utilizzato da un determinato paziente</div></div>		
		<div><div><div>B</div></div><div>malattia di Alzheimer</div></div>					<div><div><div>B</div></div><div>un dispositivo medico fabbricato per un determinato paziente, anche senza prescrizione</div></div>		
		<div><div><div>C</div></div><div>vomito da chemioterapici</div></div>					<div><div><div>C</div></div><div>un dispositivo medico impiantabile</div></div>		
		<div><div><div>D</div></div><div>diabete mellito di tipo 2</div></div>					<div><div><div>D</div></div><div>un dispositivo per indagini cliniche</div></div>		
		<div><div><div>E</div></div><div>osteoporosi</div></div>					<div><div><div>E</div></div><div>un dispositivo fabbricato in serie secondo uno schizzo di un medico</div></div>		
			Risposta esatta C					Risposta esatta A	
N°	2862	Domanda	La titolarità di una farmacia è incompatibile con		N°	2864	Domanda	Quale, tra le seguenti classi di farmaci antimicrobici, agisce inibendo la sintesi degli acidi nucleici della cellula batterica?	
		<div><div><div>A</div></div><div>la direzione tecnica di officine farmaceutiche</div></div>					<div><div><div>A</div></div><div>chinoloni</div></div>		
		<div><div><div>B</div></div><div>l'esercizio di altra professione o arte sanitaria</div></div>					<div><div><div>B</div></div><div>tetracicline</div></div>		
		<div><div><div>C</div></div><div>l'attività di informatore medico-scientifico</div></div>					<div><div><div>C</div></div><div>monobattami</div></div>		
		<div><div><div>D</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>					<div><div><div>D</div></div><div>carbapenemi</div></div>		
		<div><div><div>E</div></div><div>nessuna delle indicazioni è corretta</div></div>					<div><div><div>E</div></div><div>rifamicine</div></div>		
			Risposta esatta D					Risposta esatta E	



N°	2865	Domanda	La struttura chimica sottoriportata corrisponde alla deferossamina, agente impiegato come coadiuvante nelle intossicazioni acute da ferro. Quale, tra i gruppi funzionali presenti nella molecola, è coinvolto nella chelazione degli ioni ferrici che così vengono rapidamente eliminati attraverso la via renale?		N°	2867	Domanda	Quale dei seguenti tensioattivi è un "tensioattivo non ionico"?	
			<div><div><input type="checkbox"/> A</div>il gruppo amminico e il residuo acetico terminali</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>il gruppo amminico terminale e le due funzioni amidiche</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>i tre gruppi idrossamici</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>i gruppi amminico e idrossamico terminali e l'ammidico adiacente a quest'ultimo</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>tutti i gruppi indicati sono contemporaneamente coinvolti</div>				<div><div><input type="checkbox"/> A</div>lecitina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>polietilenglicole 400 monostearato</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>cefirimide</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>sodio laurilsolfato</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>benzalconio cloruro</div>		
					Risposta esatta B				
N°	2866	Domanda	Domase alfa (hDNase) è approvata per il trattamento di:		N°	2868	Domanda	Un dipendente dello Stato può essere autorizzato all'esercizio della farmacia?	
		<div><div><input type="checkbox"/> A</div>epatite virale</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>fibrosi cistica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>morbo di Crohn</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>artrite reumatoide</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>enfilia</div>					<div><div><input type="checkbox"/> A</div>si, sempre</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>si, purché non sia un dipendente del Ministero della Salute</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>si, purché non sia un dipendente del Ministero dell'Interno</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>si, purché non sia un dipendente del Ministero della Difesa</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>no, in quanto l'autorizzazione può essere rilasciata dopo le sue dimissioni dall'impiego</div>		
					Risposta esatta B				




N°	2869	Domanda Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti che vengono aggiunti alle polveri allo scopo di far raggiungere alla compressa un peso congruo prendono il nome di "diluenti". Quale tra le sostanze sotto indicate è un "diluente"?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>biossido di titanio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>lattosio</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>magnesio stearato</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>gelatina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>tutte le sostanze indicate, con l'eccezione di una</div></div>	Risposta esatta B
N°	2870	Domanda La forma di resistenza nota come MDR (Multi Drug Resistance) è provocata da	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>una proteina di membrana che pompa il chemioterapico fuori dalla cellula</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>mutata capacità del farmaco di penetrare nella cellula tumorale</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>aumento del catabolismo</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>efficace riparazione dei danni del DNA</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>scarsa biodisponibilità del farmaco a livello di tumore</div></div>	Risposta esatta A
N°	2871	Domanda Il captopril, avente la struttura indicata, è un inibitore	<div><div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>delle NO sintasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>delle guanilato ciclasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>delle adenilato ciclasi</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>dell'enzima di conversione dell'angiotensina</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>del citocromo P-450</div></div>	Risposta esatta D
N°	2872	Domanda Un cittadino dell'Unione Europea chiede informazione in farmacia per conoscere quale specialità medicinale italiana è equivalente a quella in commercio nel suo Paese come contenente un principio attivo indicato nella classificazione ATC con B03CC02. Quale, tra i principi attivi sotto riportati, è più simile a quello richiesto?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>N01AB01</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>C05AX02</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>J01DA</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>S01AX02</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuno di quelli indicati</div></div>	Risposta esatta E




N°	2873	Domanda	L'azione farmacologica del paracetamolo è dovuta principalmente al fatto che tale principio attivo	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>inibisce selettivamente la COX2</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>inibisce irreversibilmente le ciclossigenasi</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>abbassa la concentrazione di trombassano</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>degrada le prostaglandine</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div><div><div></div></div><div>tutte le indicazioni fornite sono errate</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2875	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni relative al gel di aloe vera (<i>Aloe barbadensis</i> Mill.) è corretta?	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>non contiene antrachinoni</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>ha proprietà lenitive e accelera la guarigione delle ferite</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>i principali componenti sono rappresentati dalle mucillagini</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div><div><div></div></div><div>tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	D
N°	2876	Domanda	Quale, tra i seguenti farmaci, non appartiene alla categoria degli antidepressivi?	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>fluvoxamina (struttura indicata)</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>dorpromazina</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>nortriplina</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>trazodone</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div><div><div></div></div><div>clonipramina</div></div></div></div></div> <div><chem>Nc1ccccc1CN(CCN(C)C)OCCOC</chem></div>	Risposta esatta	B
N°	2874	Domanda	le penicilline possono dare allergia crociata con	<div><div><div><div><div><div></div></div><div>A</div></div><div><div><div></div></div><div>anticoagulanti orali</div></div><div><div><div></div></div><div>B</div></div><div><div><div></div></div><div>tetraciclina</div></div><div><div><div></div></div><div>C</div></div><div><div><div></div></div><div>cefalosporine</div></div><div><div><div></div></div><div>D</div></div><div><div><div></div></div><div>allopurinolo</div></div><div><div><div></div></div><div>E</div></div><div><div><div></div></div><div>fosfamicina</div></div></div></div></div>	Risposta esatta	C

N°	2877	Domanda	E' obbligatorio per il farmacista effettuare consegne a domicilio di medicinali per uso veterinario?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>si, sempre</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>no, se non ha aderito a specifiche iniziative che prevedano tale consegna</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>no, purché si tratti di medicinali destinati ad animali d'affezione</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>si, ma su richiesta scritta del medico-veterinario</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>si, limitatamente agli stupefacenti</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2879	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni su clobazam, avente la struttura indicata, è corretta? Tale principio attivo	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>ha indicazione terapeutica ansiolitica</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>ha indicazione terapeutica ipnotica</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>non può essere definito una benzodiazepina</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>rispetto alle benzodiazepine più diffuse differisce per la posizione di un atomo di azoto</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>tra le indicazioni fornite due sono corrette</div></div>	Risposta esatta	E



N°	2880	Domanda	Cimetidina e ranitidina, aventi le strutture indicate, vengono utilizzate nella terapia dell'ulcera gastrica in quanto	<div><div><input type="radio"/> A</div><div>bloccano la H⁺, K⁺-ATPasi a livello delle cellule parietali della mucosa gastrica</div></div> <div><div><input type="radio"/> B</div><div>sono antagonisti dei recettori istaminergici H2</div></div> <div><div><input type="radio"/> C</div><div>sono agonisti dei recettori istaminergici H2</div></div> <div><div><input type="radio"/> D</div><div>sono antagonisti dei recettori istaminergici H1</div></div> <div><div><input type="radio"/> E</div><div>stimolano la secrezione di muco</div></div>	Risposta esatta	B
----	------	---------	--	--	-----------------	---



N°	2881	Domanda	La bacitracina appartiene alla seguente classe di antibiotici:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>amminoglicosidici</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>penicilline</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>polipeptidici</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>macrolidici</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>tetracicline</div>	Risposta esatta	C
N°	2883	Domanda	Quale dei prodotti sotto elencati viene più comunemente usato come agente correttore di acidità nella preparazione delle forme farmaceutiche liquide che devono presentare valori di pH analoghi a quelli dei liquidi biologici	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>benzalcolio cloruro</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>diethylalato</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>sodio cloruro</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>nessuno di quelli indicati</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>clorobutanolo</div>	Risposta esatta	D
N°	2884	Domanda	Con quale numero si può contrassegnare la posizione evidenziata con una freccia nella struttura generale dell'acido barbiturico	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>1</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>3</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>5</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>7</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>9</div>	Risposta esatta	C
N°	2882	Domanda	L'effetto ipertensivo dell'adrenalina può essere bloccato dalla somministrazione di	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>prazosina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>propranololo</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>atropina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>reserpina</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>clonidina</div>	Risposta esatta	A




N°	2885	Domanda	La cocaina potenzia l'azione ipertensiva della noradrenalina perché:	
		<div><div><div>A</div></div><div>aumenta il contenuto di adrenalina nelle vescicole presinaptiche</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>aumenta la liberazione di noradrenalina</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>facilita il reuptake non neuronale di noradrenalina</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>inibisce il reuptake neuronale della noradrenalina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>stimola direttamente i recettori α adrenergici</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2886	Domanda	Quale tra questi farmaci è INCAPACE di indurre la biotrasformazione di altri farmaci:	
		<div><div><div>A</div></div><div>difenildantoina</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>primidone</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>acido valproico</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>rifampicina</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>fencarbital</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2887	Domanda	L'azione dell'idroclorotiazide termina in quanto il farmaco	
		<div><div><div>A</div></div><div>viene eliminato dall'apparato renale</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>si fissa stabilmente ai tessuti</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>viene eliminato attraverso il sistema epatobiliare</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>viene metabolizzato estesamente</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>si distribuisce nel tessuto adiposo</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2888	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "bamato" nella Denominazione Comune?	
		<div><div><div>A</div></div><div>derivati carbammici del propandiololo usati in terapia come sedativi centrali e miorilassanti</div></div> <div><div><div>B</div></div><div>antibiotici derivati dall'acido 6-aminopenicillanico (6-APA)</div></div> <div><div><div>C</div></div><div>antistaminici H₂</div></div> <div><div><div>D</div></div><div>ormoni estrogeni</div></div> <div><div><div>E</div></div><div>betabloccanti</div></div>	Risposta esatta	A

N°	2889	Domanda Quando un farmaco soggetto a metabolismo epatico viene somministrato per via rettale l'aliquota di farmaco che nell'organismo va incontro ai processi metabolici epatici corrisponde	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>all'intera dose somministrata</div> <div>a % equivalenti a quelle che si avrebbero con la somministrazione per os</div> <div>a quella assorbita nella parte alta del retto</div> <div>a quella assorbita nella parte bassa del retto</div> <div>a quantità non prevedibili a priori</div>		N°	2891	Domanda Tra gli effetti indesiderati e tossici dei diuretici dell'ansa si riscontrano ipokaliemia, iperuricemia e intolleranza ai carboidrati. Ciò può determinare	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>disturbi della vista</div> <div>diabete insipido</div> <div>insorgenza di attacchi di gotta</div> <div>peggioramento degli edemi delle gambe</div> <div>insufficienza renale</div>	
				Risposta esatta C				Risposta esatta C	
N°	2890	Domanda Quale degli effetti indesiderati indicati è comune a metossifurano, ciclosporina e disipatino?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>azione antiaggregante piastrinica</div> <div>induzione di cardiomiopatia dilatativa</div> <div>nefrotossicità</div> <div>induzione di gengivite iperplastica</div> <div>azione antiemetica</div>		N°	2892	Domanda Quale dei seguenti principi attivi può causare gravi retinopatie con danni irreversibili alla vista, per cui è necessario un accurato monitoraggio durante il trattamento?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div>terazosina</div> <div>taurina</div> <div>clorochina</div> <div>amoxicillina</div> <div>nessuno dei composti citati</div>	
				Risposta esatta C				Risposta esatta C	




N°	2893	Domanda	Per gli alimenti addizionati di vitamine e minerali:	<div><div><div>A</div></div><div>l'etichettatura non è disciplinata da normativa</div><div><div>B</div></div><div>l'etichettatura nutrizionale è obbligatoria</div><div><div>C</div></div><div>l'etichettatura nutrizionale non è obbligatoria</div><div><div>D</div></div><div>è prescritta solo l'indicazione del contenuto delle vitamine e dei minerali aggiunti</div><div><div>E</div></div><div>è obbligatorio indicare gli effetti sulla salute delle vitamine e dei minerali aggiunti</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2895	Domanda	Il saggio di uniformità di massa di capsule realizzate in farmacia in forma di preparazione galenica magistrale si esegue:	<div><div><div>A</div></div><div>sulle capsule piene chiuse</div><div><div>B</div></div><div>sulle capsule aperte</div><div><div>C</div></div><div>sul contenuto della capsula</div><div><div>D</div></div><div>sull'involucro</div><div><div>E</div></div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2894	Domanda	La variabilità inter-individuale nella suscettibilità alle sostanze tossiche:	<div><div><div>A</div></div><div>in genere è trascurabile</div><div><div>B</div></div><div>è dovuta solo a patologie che alterano l'eliminazione</div><div><div>C</div></div><div>è dovuta solo a differenze nel metabolismo legate all'età</div><div><div>D</div></div><div>può dipendere da fattori genetici</div><div><div>E</div></div><div>è indipendente da co-esposizioni</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2896	Domanda	Nella farmacia succursale la direzione professionale è affidata	<div><div><div>A</div></div><div>allo stesso titolare di farmacia assegnatario della farmacia succursale</div><div><div>B</div></div><div>a nessuno dal momento che la farmacia succursale non ha una propria autonomia</div><div><div>C</div></div><div>ad un direttore assunto a tempo pieno</div><div><div>D</div></div><div>ad un direttore assunto part time</div><div><div>E</div></div><div>ad un collaboratore</div></div>	Risposta esatta	C



N°	2897	Domanda	Le decisioni adottate in materia disciplinare dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti sono impugnabili?	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div>si, innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie</div><div>si, innanzi allo stesso Consiglio</div><div>si, innanzi alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani</div><div>si, innanzi al Ministro della Sanita'</div><div>no</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2899	Domanda	Quale dei farmaci elencati si comporta da ipnotico-sedativo	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div>omeprazolo</div><div>caffeina</div><div>clordiazepossido</div><div>amfetamina</div><div>diellammide dell'acido lisergico</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2900	Domanda	Tra le forme farmaceutiche a rilascio modificato, il sistema Oros si definisce come	<div><div><input type="radio"/> A</div><div><input type="radio"/> B</div><div><input type="radio"/> C</div><div><input type="radio"/> D</div><div><input type="radio"/> E</div></div>	<div><div>un sistema a scambio ionico</div><div>un sistema osmotico</div><div>un sistema erodibile</div><div>un impianto sottocutaneo</div><div>un sistema transdermico</div></div>	Risposta esatta	B

N°	2901	Domanda	Quale dei seguenti antiblastici è un agente alchilante?		N°	2903	Domanda	Quali potrebbero essere gli eventi esterni influenzanti una corretta gestione commerciale di un magazzino di una farmacia?	
			<div><div>A</div>Tioguanina</div>					<div><div>A</div>variazioni di prezzo del prontuario terapeutico</div>	
			<div><div>B</div>Busulfan</div>					<div><div>B</div>provvedimenti AIFA con ampliamento delle liste di riferimento</div>	
			<div><div>C</div>Bleomicina</div>					<div><div>C</div>provvedimenti d'autorità per la riduzione di prezzo</div>	
			<div><div>D</div>Vincristina</div>					<div><div>D</div>nessuna indicazione è corretta</div>	
			<div><div>E</div>Tamoxifene</div>					<div><div>E</div>più di una risposta è corretta</div>	
				Risposta esatta B					Risposta esatta E

N°	2902	Domanda	In una specialità medicinale contenente paracetamolo e clorfenamina è presente un principio attivo ad attività:		N°	2904	Domanda	A quale classe di farmaci appartengono i triptani, agonisti del recettore 5-HT1?	
			<div><div>A</div>antistaminica</div>					<div><div>A</div>antimalarici</div>	
			<div><div>B</div>antimuscarinica</div>					<div><div>B</div>antemicranici</div>	
			<div><div>C</div>antibatterica</div>					<div><div>C</div>anticinetosici</div>	
			<div><div>D</div>simpaticolitica</div>					<div><div>D</div>diuretici</div>	
			<div><div>E</div>spasmolitica midropa</div>					<div><div>E</div>antidolora</div>	
				Risposta esatta A					Risposta esatta B




N°	2905	Domanda	L'irindotecan è un farmaco	<div><div><div><div>A</div></div><div>ansiolitico</div></div><div><div>B</div></div><div>antispastico</div></div> <div><div>C</div></div> <div>antineoplastico</div>
----	------	---------	----------------------------	--

D


antipertensivo

E

nessuna indicazione è corretta




N°	2909	Domanda	Quale dei seguenti principi attivi è un profarmaco	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>clindamicina 2-fosfato</div><div>tetraciclina cloridrato</div><div>ampicillina sale di sodio</div><div>clindamicina cloridrato</div><div>più di uno di quelli indicati</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2911	Domanda	L'insulina glargine deve la sua lunga durata d'azione al fatto che:	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>a pH fisiologico precipita nel tessuto sottocutaneo, ritardando l'assorbimento</div><div>si lega più saldamente alle proteine dei tessuti</div><div>si lega più saldamente alle proteine plasmatiche</div><div>viene metabolizzata più lentamente</div><div>presenta ricircolo enteroepatico</div></div></div>	Risposta esatta	A
N°	2910	Domanda	Se un farmaco molto legato (>90%) alle proteine plasmatiche è spiazzato da un altro farmaco co-somministrato, accade che	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>il suo volume apparente di distribuzione diminuisce</div><div>la sua concentrazione plasmatica totale aumenta</div><div>la sua emivita di eliminazione aumenta</div><div>la sua clearance sistemica diminuisce</div><div>tutte le indicazioni sono errate</div></div></div>	Risposta esatta	E
N°	2912	Domanda	Sul contenitore a diretto contatto con il prodotto cosmetico, l'indicazione del numero di lotto o il riferimento che ne consenta l'identificazione è	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>obbligatoria, salvo impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico</div><div>a discrezione del direttore tecnico</div><div>obbligatoria in ogni caso</div><div>obbligatoria o facoltativa a seconda del tipo di cosmetico</div><div>obbligatoria o facoltativa a seconda della tipologia di ingredienti</div></div></div>	Risposta esatta	A





N°	2917	2919	2920
Domanda	Quale delle azioni elencate non è riferibile alla atropina	Quale tra i seguenti analgesici è il più potente.	Preparati a base di uva ursina (foglie di <i>Arctostaphylos uva ursi</i> L.) possono trovare impiego nel trattamento di:
	<div> <div><input type="checkbox"/> A</div> <div>aumento delle secrezioni bronchiali</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> B</div> <div>rilasciamento dello sfintere della pupilla</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> C</div> <div>inibizione del muscolo detrusore della vescica</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> D</div> <div>perdita dell'accomodazione per la visione da vicino</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> E</div> <div>aumento della frequenza cardiaca</div> </div>	<div> <div><input type="checkbox"/> A</div> <div>morfina</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> B</div> <div>fentanil</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> C</div> <div>acido acetilsalicilico</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> D</div> <div>piroxicam</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> E</div> <div>ossicodone</div> </div>	<div> <div><input type="checkbox"/> A</div> <div>insufficienza venosa</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> B</div> <div>infezioni delle prime vie aeree</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> C</div> <div>infezioni delle vie urinarie</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> D</div> <div>tutte le indicazioni sono corrette</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> E</div> <div>nessuna delle indicazioni è corretta</div> </div>
Risposta esatta	A	B	B

N°	2921	Domanda	Chi autorizza il farmacista a produrre medicinali galenici iniettabili?	<div><div><div>A</div>L'A.S.L.</div><div><div>B</div>la Regione</div><div><div>C</div>nessuno in quanto non occorre una specifica autorizzazione</div><div><div>D</div>il Ministero della Salute</div><div><div>E</div>il sindaco</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2922	Domanda	In quale degli intervalli di peso sotto indicati, espressi in g, si colloca la dose letale di caffeina per l'uomo?	<div><div><div>A</div>0,2 - 0,5</div><div><div>B</div>0,6 - 1</div><div><div>C</div>1 - 4</div><div><div>D</div>5 - 15</div><div><div>E</div>16 - 20</div></div>	Risposta esatta	D
N°	2923	Domanda	Quali dei seguenti farmaci può potenziare l'effetto antipertensivo del propranololo:	<div><div><div>A</div>barbiturici</div><div><div>B</div>fenitoina</div><div><div>C</div>rifampicina</div><div><div>D</div>tutte le indicazioni sono corrette</div><div><div>E</div>nessuno di quelli indicati</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2924	Domanda	I farmaci la cui Denominazione Comune ha come suffisso "profene" appartengono ad una medesima classe di composti aventi una funzione carbossilica. Indicare quale, tra le classi di acidi sotto indicati, ha il suffisso "profene"	<div><div><div>A</div>alfa-arilpropionici</div><div><div>B</div>alfa-ariltiopropionici</div><div><div>C</div>beta-arilpropionici</div><div><div>D</div>alfa-arilossipropionici</div><div><div>E</div>nessuna delle classi indicate</div></div>	Risposta esatta	A




N°	2925	Domanda	I medicinali ipocolesterolemizzanti contenenti inibitori dell'enzima HMG-CoA reduttasi hanno attività terapeutica più elevata se si assumono alla sera piuttosto che al mattino in quanto	<div><div>A</div>presentano un'attività collaterale sedativa</div> <div><div>B</div>riescono a raggiungere più facilmente l'intestino se il pH dello stomaco ha valori elevati</div> <div><div>C</div>provocano disturbi gastrici se assunti a digiuno</div> <div><div>D</div>provocano flatulenza che è meglio evitare nell'attività diurna</div> <div><div>E</div>l'assunzione risulta contemporanea al ritmo circadiano di biosintesi del colesterolo</div>	N°	2927	Domanda	Sono dovuti i diritti addizionali previsti dalla tariffa nazionale dei medicinali per la dispensazione di medicinali durante le ore notturne quando la farmacia presta servizio "a battenti chiusi"?	<div><div>A</div>no, mai</div> <div><div>B</div>sì, ma solo per le farmacie rurali sussidiate</div> <div><div>C</div>sì, sempre</div> <div><div>D</div>e' a discrezione del farmacista</div> <div><div>E</div>sì, tranne che per le ricette rilasciate dal servizio di guardia medica</div>	Risposta esatta	E	Risposta esatta	C
N°	2926	Domanda	Quale tra i seguenti farmaci non è di prima scelta nella terapia della tubercolosi?	<div><div>A</div>Rifampicina</div> <div><div>B</div>Etambutolo</div> <div><div>C</div>Streptomicina</div> <div><div>D</div>Amikacina</div> <div><div>E</div>Isoniazide</div>	N°	2928	Domanda	Un farmaco antagonista dei recettori beta adrenergici determina:	<div><div>A</div>tachicardia</div> <div><div>B</div>aumento della velocità di conduzione atrioventricolare</div> <div><div>C</div>diminuzione del periodo refrattario del nodo atrioventricolare</div> <div><div>D</div>indotropismo negativo</div> <div><div>E</div>aumento dell'automatismo</div>	Risposta esatta	D	Risposta esatta	D




[illegible]


N°	2933	Domanda	I due tipi di tè (foglie di <i>Camellia sinensis</i> L.), verde e nero si differenziano in quanto:
A			il tè verde è fermentato mentre quello nero è non fermentato
B			il tè verde è non fermentato mentre il tè nero è fermentato
C			si ottengono da varietà diverse di <i>Camellia sinensis</i>
D			si ottengono da chemidipi diversi di <i>Camellia sinensis</i>
E			provengono da aree geografiche diverse
Risposta esatta B			
N°	2934	Domanda	Gli antagonisti dei recettori 5-HT ₃ serotoninergici sono attualmente utilizzati come
A			antidepressivi
B			antipsicotici
C			antinausea
D			antistaminici
E			antiepilettici
Risposta esatta C			
N°	2935	Domanda	Nelle tecniche utilizzate per ottenere il controllo del rilascio dei farmaci si utilizzano reazioni che permettono di legare il farmaco (Farm) ad una resina (Res) in modo tale che, successivamente, il farmaco possa poi essere rilasciato nei distretti opportuni. Quale delle affermazioni, sotto elencate e riguardanti questa applicazione tecnologica è corretta
A			da (I) si formano il sale sodico del farmaco e la resina cloridrato a livello dell'intestino
B			da (II) si formano il farmaco carbossilico e la resina cloridrato a livello dello stomaco
C			da (II) si formano il farmaco carbossilico e la resina cloridrato a livello dello stomaco
D			da (II) si ripristina il carbossile libero della resina a livello dello stomaco
E			più di una delle affermazioni riportate è corretta
Risposta esatta E			



N°	2937	Domanda	In quale classe, tra quelle sotto riportate, può essere catalogato in maniera più precisa possibile il principio attivo fenibutazone avente la struttura indicata	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>acidi carbossilici</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>pirazolidindioni</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>anilidi</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>solfonammidi</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>carbossi chetoni</div>	Risposta esatta	B
----	------	---------	---	---	-----------------	---





N°	2938	Domanda	La pravastatina, avente la struttura indicata, è usata nella terapia della iperlipoproteinemia in quanto	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>inibisce l'HMG (3-idrossi-3-metilglutaril) CoA reduttasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>aumenta l'attività della lipoproteinlipasi</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>lega gli acidi biliari</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>riduce l'esterificazione di trigliceridi nel fegato</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>stimola il catabolismo della VLDL</div>	Risposta esatta	A
----	------	---------	--	--	-----------------	---



N°	2939	Domanda	Gli ormoni steroidei agiscono	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>su recettori citoplasmatici</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>a livello dei mitocondri</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>a livello ribosomiale</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>nessuna indicazione è corretta</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>gli steroidi non interagiscono con recettori</div>	Risposta esatta	A
----	------	---------	-------------------------------	--	-----------------	---


N°	2940	Domanda	Quale dei farmaci ricordati è metabolizzato anche dalle COMT:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>triamina</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>efedrina</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>amfetamina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>melossamina avente la struttura indicata</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>dopamina</div>	Risposta esatta	E
----	------	---------	---	--	-----------------	---





N°	2941	Domanda	In un cerotto transdermico, la matrice monostrato adesiva, può essere composta da:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>copolimeri acrilici</div><div>polimeri polisobutilenici</div><div>polimeri polisilossanici</div><div>polietilene a bassa densità</div><div>una indicazione è errata</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2943	Domanda	La bupivacaina, avente la struttura indicata, è un principio attivo utilizzato come	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>antimuscarinico</div><div>antipertensivo</div><div>anestetico locale</div><div>stimolante del SNC</div><div>deprimente del SNC</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2944	Domanda	La disponibilità farmaceutica di un principio attivo che si presenta in due o più forme polimorfe, può essere diversa nella forma farmaceutica di	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>tutte quelle indicate</div><div>compresse</div><div>tutte quelle indicate tranne una</div><div>supposte</div><div>spray nasali di dispersione liquido-gas</div></div>	Risposta esatta	C




N°	2949	Domanda	Quale fra i seguenti principi attivi ha lo stesso meccanismo d'azione della cimetidina, avente la struttura indicata
			
		<input type="radio"/> A tutti quelli indicati	
		<input type="radio"/> B famotidina	
		<input type="radio"/> C ranitidina	
		<input type="radio"/> D nizatidina	
		<input type="radio"/> E solo uno di quelli indicati	
		Risposta esatta	A

N°	2950	Domanda	In quale classe, tra quelle sotto riportate, può essere catalogato in maniera più precisa possibile la indometacina
		<input type="radio"/> A pirazolioli	
		<input type="radio"/> B acidi Eteroarilacetici	
		<input type="radio"/> C butilpirazolidine	
		<input type="radio"/> D anilidi	
		<input type="radio"/> E acidi anilpropionici	
		Risposta esatta	B

N°	2951	Domanda	Chi approva la Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana?
		<input type="radio"/> A la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale	
		<input type="radio"/> B l'Istituto Superiore di Sanità	
		<input type="radio"/> C il Presidente della Repubblica, con proprio decreto	
		<input type="radio"/> D il Ministro della Salute, con proprio decreto	
		<input type="radio"/> E il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto	
		Risposta esatta	D

N°	2952	Domanda	Le protein chinasi coinvolte nel processo di trasferimento del segnale sono:
		<input type="radio"/> A enzimi che catalizzano la reazione di formazione del secondo messaggero cAMP	
		<input type="radio"/> B proteine che regolano l'attività biologica di altre proteine idrolizzando il legame fosfoesterico e determinando il rilascio di fosfato	
		<input type="radio"/> C enzimi che catalizzano la reazione di formazione del secondo messaggero cGMP	
		<input type="radio"/> D recettori per i farmaci antiaritmici della classe chinidina	
		<input type="radio"/> E proteine che regolano l'attività biologica di altre proteine fosforilando	
		Risposta esatta	E

N°	2953	Domanda	Quale deve essere l'età minima del soggetto al quale il farmacista può consegnare sostanze velenose?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>non sono previsti particolari limiti di età</div><div>14 anni</div><div>16 anni</div><div>18 anni</div><div>non inferiore a 16 e non superiore ad 80 anni</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2955	Domanda	L'azione della maggior parte degli ACE-inibitori ha termine in quanto questi composti	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>vengono inattivati dall'ACE</div><div>vengono trasformati in metaboliti inattivi a livello del fegato</div><div>vengono eliminati in gran parte dai reni</div><div>si legano stabilmente alla carbossipeptidasi dei tessuti</div><div>si legano stabilmente alle proteine plasmatiche</div></div></div>	Risposta esatta	C
N°	2954	Domanda	Il farmacista può rifiutarsi di dispensare medicinali SOP e OTC durante il servizio notturno a chiamata?	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>sì, sempre</div><div>no, se col suo comportamento possa causare un danno alla salute del cittadino</div><div>no, se si tratta di principi attivi la cui detenzione in farmacia è obbligatoria in base alla tabella n. 2 della Farmacopea Ufficiale</div><div>no, mai</div><div>sì, se non conosce il cliente</div></div></div>	Risposta esatta	B
N°	2956	Domanda	Tutte le preparazioni iniettabili sono spedibili con ricetta medica. Le preparazioni che costituiscono ECCEZIONE per tale regola sono rappresentate da	<div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div></div><div><div>acqua per preparazioni iniettabili</div><div>Promelazina (antistaminico)</div><div>Flumazenil (antagonista delle benzodiazepine)</div><div>nessuna delle preparazioni indicate</div><div>più di una delle preparazioni indicate</div></div></div>	Risposta esatta	A




N°	2957	Domanda	Indicare quale dei seguenti farmaci NON interagisce con i recettori muscarinici per l'acetilcolina
		A	atropina
		B	metacolina
		C	pilocarpina
		D	nitroprusiato
		E	carbaciole
		Risposta esatta	D


N°	2958	Domanda	L'escina, contenuta nei semi di <i>Aesculus hippocastanum</i> L., ha effetti:
		A	ipocolesterolemizzanti
		B	antiedemigeni
		C	antiaritmici
		D	più di una indicazione è corretta
		E	vasoprotetori
		Risposta esatta	D

N°	2959	Domanda	La neostigmina, avente la struttura indicata, è
		A	inibitore della acetilcolinesterasi
		B	agonista diretto sui recettori muscarinici
		C	antagonista dei recettori nicotinici
		D	antagonista dei recettori muscarinici
		E	inibitore del rilascio di acetilcolina
		Risposta esatta	A


N°	2960	Domanda	Quale è l'attività farmacologica più rilevante che può essere ipotizzata per il principio attivo desipramina avente la struttura indicata
		A	antidepressiva
		B	neurolettica
		C	ipnotica
		D	anestetica generale
		E	anticongulsivante
		Risposta esatta	A


[illegible]

N°	2965	Domanda	La vendita della saccarina è limitata ai soli soggetti affetti da diabete?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>si, e può essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica</div><div>può essere effettuata solo in farmacia, ma senza obbligo di presentazione di ricetta medica</div><div>no</div><div>si, ma può essere effettuata solo in esercizi commerciali diversi dalla farmacia</div><div>no, è limitata ai soggetti affetti da diabete ed agli obesi</div></div>	Risposta esatta	C
N°	2967	Domanda	In quale caso è obbligatoria la ricetta medico-veterinaria per la vendita di medicinali omeopatici veterinari?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div>in tutti i casi</div><div>in nessun caso</div><div>esclusivamente per la terapia di animali da compagnia</div><div>esclusivamente per la terapia di animali produttori di alimenti per l'uomo</div><div>in nessuno in quanto non esistono i medicinali omeopatici veterinari</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2968	Domanda	Il diuretico acetazolamide (struttura indicata) contiene nella sua molecola un anello:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div> <div><div></div><div>tiodiazolico</div><div>tiazolico</div><div>piridinico</div><div>ossazolico</div><div>pirimidinico</div></div>	Risposta esatta	A




N°	2969	Domanda	Il meccanismo d'azione dei nitrati organici consiste in	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>vasocostrizione periferica per azione diretta sulla muscolatura liscia vasale</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>blocco dei canali del Ca²⁺</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>inibizione dell'enzima guanilato ciclas</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>aumento della concentrazione di GMP ciclico nelle cellule muscolari lisce</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>aumento della concentrazione di AMP ciclico nelle cellule muscolari lisce</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>D</div>	
N°	2971	Domanda	In veterinaria con il termine "Prescription diet" si indica:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>una particolare ricetta medica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>una nutrizione funzionale e terapeutica</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>un mangime ad elevato contenuto di farmaci</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>un dimagrante</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>nessuna indicazione è corretta</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>B</div>	
N°	2970	Domanda	L'acetilsa e le discinesie tardive sono effetti collaterali osservati in corso di terapia con:	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>morfin</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>clordiazepossido</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>neuroletici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>diuretici tiazidici</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>farmaci utilizzati nelle emergenze ipertensive</div></div></div></div> <div>Risposta esatta</div> <div>C</div>	
N°	2972	Domanda	Il composto rappresentato dalla struttura indicata corrisponde al nitrazepam. Il medicinale che lo contiene viene usato in terapia come	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> A</div><div>antidepressivo</div></div><div><div><input type="checkbox"/> B</div><div>antistaminico</div></div><div><div><input type="checkbox"/> C</div><div>antiasmatico</div></div><div><div><input type="checkbox"/> D</div><div>analgesico</div></div><div><div><input type="checkbox"/> E</div><div>ipnotico</div></div></div></div> <div><chem>N#Cc1ccc2c(c1)c(=O)n(c2)C3=CC=CC=C3</chem></div> <div>Risposta esatta</div> <div>E</div>	



N°	2973	Domanda	La 8-idrossichinolina, avente la formula riportata, è un composto utilizzabile come:
			
		<div><div>A</div>antimalarico</div> <div><div>B</div>Ca²⁺-antagonista</div> <div><div>C</div>alfa-bloccante</div> <div><div>D</div>chelante dei metalli</div> <div><div>E</div>conservante</div>	Risposta esatta D
N°	2975	Domanda	La buprenorfina può essere impiegata:
		<div><div>A</div>nella diaassuefazione dalle tossicodipendenze da oppioidi</div> <div><div>B</div>come analgesico</div> <div><div>C</div>nel controllo del coabuso di cocaina in soggetti eroïnomanî</div> <div><div>D</div>nessuna delle indicazioni è corretta</div> <div><div>E</div>tutte le indicazioni sono corrette</div>	Risposta esatta E
N°	2976	Domanda	Nel caso in cui la soluzione acquosa di un farmaco presenta modificazioni scarsamente significative del pH quando si aggiunge ad essa un'altra sostanza di natura acida, si può verosimilmente affermare che tale soluzione è
		<div><div>A</div>isotonica</div> <div><div>B</div>tamponata</div> <div><div>C</div>satura</div> <div><div>D</div>isosmotica</div> <div><div>E</div>sovrasatura</div>	Risposta esatta B

N°	2977	Domanda	Quali dei seguenti eccipienti sono idonei per la stabilizzazione di una crema lipofila:	N°	2979	Domanda	Gli estrogeni ed i progestinici, da soli o in associazione, con indicazione diversa da quella contraccettiva sono medicinali che			
		<div><div><div>A</div><div>esteri del sorbitano con acidi grassi</div></div><div><div>B</div><div>saponi alcalini</div></div><div><div>C</div><div>poliossietilendervati del sorbitano esterificati con acidi grassi</div></div><div><div>D</div><div>tutte le indicazioni sono corrette</div></div><div><div>E</div><div>alchilsolfati</div></div></div>				<div><div><div>A</div><div>necessitano di ricetta medica ripetibile</div></div><div><div>B</div><div>necessitano di ricetta medica da rinnovare volta per volta</div></div><div><div>C</div><div>necessitano di ricetta medica ripetibile limitativa</div></div><div><div>D</div><div>non necessitano di ricetta medica</div></div><div><div>E</div><div>necessitano di ricetta ministeriale in triplice copia</div></div></div>	Risposta esatta	A	Risposta esatta	B

N°	2978	Domanda	Qual è la via di somministrazione generalmente utilizzata per i medicinali oncopatici in tubo granuli e dose globuli?	N°	2980	Domanda	Il vaccino antitetanico è costituito da:			
		<div><div><div>A</div><div>la via sublinguale</div></div><div><div>B</div><div>la via orale per il tubo granuli</div></div><div><div>C</div><div>la via sublinguale solo per la dose globuli</div></div><div><div>D</div><div>nessuna di quelle indicate</div></div><div><div>E</div><div>tutte quelle indicate</div></div></div>				<div><div><div>A</div><div>batteri inattivati con mezzi fisici</div></div><div><div>B</div><div>batteri inattivati con mezzi chimici</div></div><div><div>C</div><div>DNA batterico</div></div><div><div>D</div><div>anatosina tetanica</div></div><div><div>E</div><div>frazioni purificate della parete batterica</div></div></div>	Risposta esatta	A	Risposta esatta	D



N°	2981	Domanda	I veicoli utilizzati per la preparazione delle diluizioni oncopatiche sono:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>acqua distillata e alcool</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>glicerina</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>vaselina</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>lattosio</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>tutti quelli indicati tranne uno</div>	Risposta esatta	A
N°	2983	Domanda	La deloroxamina può essere usata nel trattamento di pazienti affetti da	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>ipertensione</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>anemia cronica</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>morbo di Addison</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>morbo di Parkinson</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>nessuna delle patologie indicate</div>	Risposta esatta	E
N°	2982	Domanda	Quanti mesi devono essere conservate in originale le ricette magistrali non ripetibili, escluse le ricette contenenti sostanze stupefacenti o dopanti?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>non vanno conservate</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>30 giorni</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>tre mesi</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>un anno</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>sei mesi</div>	Risposta esatta	E
N°	2984	Domanda	I glucocorticoidi a dosi farmacologiche:	<div><div><input type="checkbox"/> A</div>riducono la massa muscolare</div> <div><div><input type="checkbox"/> B</div>provocano iperglicemia</div> <div><div><input type="checkbox"/> C</div>tutte le indicazioni sono corrette</div> <div><div><input type="checkbox"/> D</div>ritardano la guarigione delle ferite</div> <div><div><input type="checkbox"/> E</div>tutte le indicazioni tranne una sono corrette</div>	Risposta esatta	C



N°	2985	Domanda	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la eparina NON è CORRETTA?		N°	2987	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "badam"?	
			<div><div>A</div>e' un mucopolisaccaride</div>					<div><div>A</div>derivati del 5-nitrofurano</div>	
			<div><div>B</div>ha caratteristiche spiccatamente acide</div>					<div><div>B</div>antibiotici derivati dal 6-APA</div>	
			<div><div>C</div>dà legami ionici con protrombina e trombina</div>					<div><div>C</div>antistaminici H2</div>	
			<div><div>D</div>è somministrata sotto forma di sale sodico o calcico</div>					<div><div>D</div>inibitori delle beta-dattamasi</div>	
			<div><div>E</div>è somministrata anche per via orale</div>					<div><div>E</div>ormoni estrogeni</div>	
				Risposta esatta	E				Risposta esatta
					D				
N°	2986	Domanda	Il meccanismo d'azione dei diuretici tiazidici consiste nel:		N°	2988	Domanda	La dichiarazione di accettazione o di rinunzia della sede farmaceutica assegnata a seguito dell'approvazione definitiva della graduatoria di concorso deve essere effettuata:	
			<div><div>A</div>inibire il riassorbimento di Na+ e Cl- nella parte ascendente dell'ansa di Henle</div>					<div><div>A</div>entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione</div>	
			<div><div>B</div>stimolare il riassorbimento di Na+ nel tubulo distale e aumentare la secrezione di K+ e H+</div>					<div><div>B</div>entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione</div>	
			<div><div>C</div>diminuire la permeabilità al Na+ della membrana luminale nella parte distale del nefrone</div>					<div><div>C</div>entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione</div>	
			<div><div>D</div>aumentare il riassorbimento di Ca2+ e Mg2+ nella parte discendente dell'ansa di Henle</div>					<div><div>D</div>entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria del concorso</div>	
			<div><div>E</div>inibire il riassorbimento di Na+ e Cl- a livello della parte iniziale del tubulo distale</div>					<div><div>E</div>entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria del concorso</div>	
				Risposta esatta	E				Risposta esatta
					A				



N°	2989	Domanda	Il meccanismo d'azione dell'acido acetilsalicilico consiste principalmente nella:		N°	2991	Domanda	Le concentrazioni plasmatiche di digossina sono aumentate dalla cosomministrazione di	
			<div><div><div>A</div></div><div>inibizione della liberazione di acido arachidonico dai fosfolipidi di membrana</div></div>					<div><div><div>A</div></div><div>penicillina G</div></div>	
			<div><div><div>B</div></div><div>inibizione i della conversione dell'acido arachidonico in prostanoidi</div></div>					<div><div><div>B</div></div><div>verapamil</div></div>	
			<div><div><div>C</div></div><div>inibizione della sintesi di leucotrieni</div></div>					<div><div><div>C</div></div><div>chindina</div></div>	
			<div><div><div>D</div></div><div>attivazione dell'enzima inducibile ciclossigenasi 2</div></div>					<div><div><div>D</div></div><div>rifampicina</div></div>	
			<div><div><div>E</div></div><div>blocco dei recettori tissutali delle prostaglandine</div></div>					<div><div><div>E</div></div><div>più di uno dei principi attivi indicati</div></div>	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	C

N°	2990	Domanda	A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "mab" nella Denominazione Comune?		N°	2992	Domanda	Prendono il nome di sostanze "leganti" le sostanze che	
			<div><div><div>A</div></div><div>inibitori della trascrittasi inversa</div></div>					<div><div><div>A</div></div><div>mantengono unita la polvere delle compresse durante la granulazione e la compattazione</div></div>	
			<div><div><div>B</div></div><div>anticorpi monoclonali</div></div>					<div><div><div>B</div></div><div>corrispondono a più di una delle proprietà indicate</div></div>	
			<div><div><div>C</div></div><div>oligonucleotidi antisenso</div></div>					<div><div><div>C</div></div><div>evitano alla polvere di aderire ai punzoni e alle matrici</div></div>	
			<div><div><div>D</div></div><div>vaccini ricombinanti</div></div>					<div><div><div>D</div></div><div>si mescolano con le polveri per far raggiungere alle compresse peso e volumi opportuni</div></div>	
			<div><div><div>E</div></div><div>inibitori delle proteasi</div></div>					<div><div><div>E</div></div><div>permettono alle compresse di disgregarsi in ambiente acquoso</div></div>	
			Risposta esatta	B				Risposta esatta	A



N°	2993	Domanda	In farmacia è ammesso il libero e diretto accesso dei clienti ai medicinali senza obbligo di prescrizione?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>e' ammesso solo per gli OTC</div><div>no, mai</div><div>si, sempre</div><div>si, purché non si tratti di oncoepatici</div><div>si, purché non rimborsati dal SSN</div></div>	Risposta esatta	A
N°	2995	Domanda	Quali tra le proprietà descritte sono tipiche dei flavonoidi?	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>antiossidante</div><div>vasoprotettrice</div><div>antinfiammatoria</div><div>miolassante</div><div>tutte quelle indicate</div></div>	Risposta esatta	E
N°	2996	Domanda	Quale dei seguenti non costituisce un possibile effetto legato all'uso prolungato di dosi farmacologiche di ormoni glucocorticoidi	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>osteoporosi</div><div>ipoglicemia</div><div>immunosoppressione</div><div>ipofonia corticosurrenalica</div><div>cataratta</div></div>	Risposta esatta	B
N°	2994	Domanda	Il legame con l'antitrombina III è alla base dell'azione anticoagulante di	<div><div><input type="checkbox"/> A</div><div><input type="checkbox"/> B</div><div><input type="checkbox"/> C</div><div><input type="checkbox"/> D</div><div><input type="checkbox"/> E</div></div>	<div><div>eparina</div><div>warfarin</div><div>lepirudina</div><div>dicumarolo</div><div>bivalirudina</div></div>	Risposta esatta	A




11A10883

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SST-002) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

N°	2997	Domanda Sono dovuti i diritti addizionali previsti dalla tariffa nazionale dei medicinali per la dispensazione di medicinali durante le ore notturne quando la farmacia presta servizio con modalità che escludono, esclusivamente per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali?	<div><div>A</div>si, sempre</div> <div><div>B</div>no, mai</div> <div><div>C</div>è a discrezione del farmacista</div> <div><div>D</div>si, ma solo per le farmacie urbane</div> <div><div>E</div>si, tranne che per le ricette dichiarate urgenti dal medico</div>	Risposta esatta B
N°	2999	Domanda Un dispositivo medico attivo è:	<div><div>A</div>un dispositivo medico collegato per il suo funzionamento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia diversa da quella prodotta direttamente dal corpo umano o dalla gravità</div> <div><div>B</div>un dispositivo medico che agisce sul corpo in maniera pericolosa</div> <div><div>C</div>un dispositivo medico impiantabile</div> <div><div>D</div>un dispositivo per indagini cliniche</div> <div><div>E</div>un dispositivo su misura</div>	Risposta esatta A
N°	3000	Domanda Quale tra i metodi indicati può essere impiegato per la preparazione di microcapsule	<div><div>A</div>coacervazione</div> <div><div>B</div>liofilizzazione</div> <div><div>C</div>polverizzazione</div> <div><div>D</div>granulazione</div> <div><div>E</div>atomizzazione</div>	Risposta esatta A





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*

(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*

(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 190,00
€ **180,50**
€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 48,00

